

Úvod do komplexní analýzy — cvičení 4

1) Spočtete následující mocniny:

- a) $(-1)^\pi$, $m_\pi(-1)$.
- b) 2^i , $m_i(2)$.
- c) $((1-i)/\sqrt{2})^{1+i}$, $m_{1+i}((1-i)/\sqrt{2})$.
- d) $(3+4i)^{1+i}$, $m_{1+i}(3+4i)$.

2) Spočtete následující integrály podél cest

a)

$$\int_{\varphi} \frac{1}{z^{1/2}} dz,$$

kde φ je kladně orientovaná jednotková kružnice počínající bodem -1 .

b) $\int_{\varphi} l(z) dz$, kde φ je kladně orientovaná jednotková kružnice počínající bodem 1 , a funkce l je spojitá (vyjma koncového bodu) funkce taková, že $l(1) = 0$ a $l(z) \in \log(z)$.

c) $\int_{\varphi} \bar{z} dz$, podél čtverce $0, 1, 1+i, i$.

d) $\int_{\varphi} z \bar{z} dz$ podél trojúhelníka $1, 2, 1+i$.

e) $\int z e^z dz$ podél paraboly $\varphi(t) = t + t^2 i$; $t \in [0, 2]$. (Využijte vhodnou větu.)

f)

$$\int_{\varphi} \frac{1}{z(z^2 - 1)} dz,$$

je-li φ kladně orientovaná kružnice o poloměru $1/2$ a středu $\alpha) 1 \beta) 0 \gamma) -1$.

g)

$$\int_{\varphi} \frac{1}{z(z^4 - 1)} dz,$$

$\varphi(t) = 1 + \frac{e^{2\pi i t}}{2}$, $t \in [0, 1]$.

3) Délkou křivky $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ rozumíme

$$V(\varphi) = \sup \left\{ \sum_{n=1}^N |\varphi(t_n) - \varphi(t_{n-1})| : N \in \mathbb{N}; a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b \right\}.$$

Ukažte, že pokud je φ cesta, je $L(\varphi) = V(\varphi)$. ($L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt$.)

4) Uvažujme funkci $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, kde $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| < \infty$. Necht $\varphi(t) = e^{it}$; $t \in [0, 2\pi]$. Ukažte, že pro $z \in \mathbb{C}$, $|z| < 1$ platí

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

(Cauchův vzorec pro kruh)

5*) Uvažujme funkci $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$, kde $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| < \infty$. Necht $\varphi(t) = e^{it}$; $t \in [0, 2\pi]$. Ukažte, že pro $z \in \mathbb{C}$, $|z| < 1$ platí

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad (= P^+ f(z))$$

a pro $z \in \mathbb{C}$, $|z| > 1$ ukažte, že platí

$$-\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n z^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad (= P^- f(z)).$$

(Pokud znáte Abelovu větu, dokažte také Plemeljův vzorec pro $|z| = 1$

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} P^+ f(z) - \lim_{r \rightarrow 1^+} P^- f(z) = f(z).)$$

6) Ukažte, že pokud je $\Omega \subset \mathbb{C}$ oblast, f je spojitá na Ω a F_1 a F_2 jsou primitivní funkce k f na Ω , pak existuje $c \in \mathbb{C}$ tak, že $F_1 + c = F_2$.