

NEZÁVISLOST, PODMÍNĚNÁ PRAVDĚPODOBNOST, ÚPLNÁ  
PRAVDĚPODOBNOST, BAYESŮV VZOREC

28.2.2019 A 1.3. 2019

- 
1. Necht'  $A$  a  $B$  jsou neslučitelné jevy. Mohou být tyto dva jevy nezávislé?
  2. Házíme dvěma pravidelnými kostkami.
    - (a) Jaká je pravděpodobnost, že padla šestka za podmínky, že celkový součet je 8?
    - (b) Jsou jevy [padla šestka] a [celkový součet je 8] nezávislé?
    - (c) Jaká je pravděpodobnost, že padla šestka na 1.kostce za podmínky, že padla šestka alespoň na jedné kostce?
  3. Házíme dvěma pravidelnými kostkami — modrou a zelenou. Označme jevy  $A$ =[na modré kostce padlo sudé číslo],  $B$  =[na zelené kostce padlo liché číslo],  $C$  =[součet čísel je lichý]. Jsou náhodné jevy  $A, B, C$  po dvou nezávislé? Jsou jevy  $A, B, C$  nezávislé?
  4. Ve třídě je 70% chlapců a 30% dívek. Dlouhé vlasy má 10% chlapců a 80% dívek.
    - (a) Jaká je pravděpodobnost, že má náhodně vybraná osoba dlouhé vlasy?
    - (b) Vybraná osoba má dlouhé vlasy. Jaká je pravděpodobnost, že je to dívka?
  5. Na stole leží náhodný počet mincí: pravděpodobnost, že je na stole právě  $k$  mincí je rovna  $2/3^k$  pro  $k = 1, 2, \dots$ . Hodíme všemi mincemi najednou. Jestliže na všech mincích padl orel, pak dostaneme odměnu.
    - (a) Je pravděpodobnější, že odměnu dostaneme nebo že odměnu nedostaneme?
    - (b) Jestliže jsme odměnu nedostali, jaká je pravděpodobnost, že na stole leželo právě  $n$  mincí?
  6. Karel, Franta a Cyril postupně hází kostkou v pořadí  $K \rightarrow F \rightarrow C$ . Komu první padne šestka, ten vyhrává, a hra v takovém případě končí.
    - (a) Určete, s jakou pravděpodobností vyhraje Cyril.
    - (b) Určete pravděpodobnost, že Franta hodil kostkou právě  $k$ -krát.
  7. V krabici máme  $b$  bílých a  $a$  černých koulí. Postupně je taháme ven bez vracení.
    - (a) Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme bílou kouli v prvním tahu? A ve druhém?
    - (b) Jaká je pravděpodobnost, že  $(n + 1)$ -ní tažená koule bude bílá?
  8. Tři lovci vystřelili současně na divokého kance, který byl jednou střelou trefen. Určete pravděpodobnost toho, že kance zastřelil první, druhý nebo třetí střelec, jsou-li pravděpodobnosti zásahu po řadě rovny 0.2, 0.4 nebo 0.6.
  9. Máme tři truhly se dvěma mincemi. V truhle A jsou dvě zlaté mince, v truhle B dvě stříbrné mince a v truhle C zlatá a stříbrná mince. Náhodně vybereme truhlu a z ní vytáhneme náhodně minci. Ta je zlatá. Jaká je pravděpodobnost, že i druhá mince v této truhle je zlatá?

## OPAKOVÁNÍ

Nechť  $A, B$  jsou náhodné jevy,  $P(B) > 0$ . **Podmíněnou pravděpodobnost** jevu  $A$  za podmínky  $B$  definujeme jako

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

**Nezávislost.** Náhodné jevy  $A, B$  se nazývají nezávislé, jestliže platí

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Náhodné jevy  $A_1, \dots, A_n$  jsou nezávislé, jestliže pro každé  $r \leq n$  a každou  $\{i_1, \dots, i_r\}$  podmnožinu  $\{1, \dots, n\}$  platí

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_r}).$$

(Tj. součinnou podmínku musíme ověřit pro všechny dvojice, všechny trojice ... atd.)

**Věta o úplné pravděpodobnosti:**

Nechť  $A, B_1, B_2, \dots$  jsou náhodné jevy takové, že  $B_i \cap B_j = \emptyset$  pro všechna  $i \neq j$ ,  $\bigcup_i B_i = \Omega$  a  $P(B_i) > 0$  pro všechna  $i = 1, 2, \dots$ . Pak

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i).$$

**Bayesova věta:**

Nechť  $A, B_1, B_2, \dots$  jsou náhodné jevy takové, že  $B_i \cap B_j = \emptyset$  pro všechna  $i \neq j$ ,  $\bigcup_i B_i = \Omega$ ,  $P(B_i) > 0$  pro všechna  $i$  a necht'  $P(A) > 0$ . Pak

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_j P(A|B_j)P(B_j)}.$$

**Věta o násobení pravděpodobností:**

Jestliže náhodné jevy  $A_1, \dots, A_n$  splňují  $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) > 0$ , pak

$$P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_n | \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i) \cdot P(A_{n-1} | \bigcap_{i=1}^{n-2} A_i) \cdot \dots \cdot P(A_2 | A_1) P(A_1).$$