

FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA 1

PŘÍKLADY PRO POROZUMĚNÍ LÁTCE – ZS 2016/2017

PŘÍKLADY KE KAPITOLE V

K ODDÍLU V.1 – LINEÁRNÍ TOPOLOGIE A JEJICH GENEROVÁNÍ

Příklad 1. Nechť X je vektorový prostor a $A \subset X$ neprázdná množina. Ukažte, že A je konvexní, právě když pro každé $\alpha, \beta > 0$ platí $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

Příklad 2. Nechť X je vektorový prostor a \mathcal{T} je topologie na X .

- (1) Ukažte, že \mathcal{T} je translačně invariantní, právě když sčítání na X je odděleně spojitě (tj. pro každé $y \in X$ je $x \mapsto x + y$ spojitě).
- (2) Najděte X a \mathcal{T} tak, aby sčítání bylo spojitě (v obou proměnných, jako zobrazení $X \times X \rightarrow X$), ale násobení nebylo spojitě.
- (3) Nechť \mathcal{T} je translačně invariantní a existuje báze okolí nuly z konvexních množin. Ukažte, že sčítání je spojitě (v obou proměnných).
- (4) Najděte topologii na \mathbb{R}^2 , v níž je sčítání odděleně spojitě, nikoli však spojitě.

Návod: (2) Uvažte diskrétní topologii. (4) Uvažte například bázi okolí nuly $\{(0, 0)\} \cup \{(x, y); |y| < |x| < r\}$, $r > 0$.

Příklad 3. Nechť X je vektorový prostor a ρ je translačně invariantní metrika na X . Ukažte, že ρ generuje lineární topologii na X , právě když

$$\lim_{x \rightarrow \mathbf{o}} \sup_{\lambda \in \mathbb{F}, |\lambda| \leq 1} \rho(\lambda x, 0) = 0.$$

Najděte translačně invariantní metricku, která tuto podmínku nesplňuje.

Příklad 4. Nechť X je vektorový prostor. Nechť \mathcal{U} je systém všech absolutně konvexních pohlcujících množin.

- (1) Ukažte, že \mathcal{U} je báze okolí nuly v nějaké Hausdorffově lokálně konvexní topologii \mathcal{T} na X .
- (2) Ukažte, že tato topologie \mathcal{T} je nejsilnější lokálně konvexní topologie na X .
- (3) Ukažte, že každá konvergentní posloupnost v (X, \mathcal{T}) je obsažena v podprostoru konečné dimenze.

Návod: (3) Kdyby ne, pak existuje lineárně nezávislá posloupnost (x_n) , která konverguje k nule. Doplňme ji na algebraickou bázi. Pak popište absolutně konvexní pohlcující množinu, která neobsahuje žádný z vektorů x_n .

Příklad 5. (1) Nechť $A \subset \mathbb{R}^2$ je vyvážená a pohlcující. Ukažte, že $A + A$ je okolím nuly (ve standardní topologii).
(2) Najděte vyváženou pohlcující $A \subset \mathbb{R}^2$, která není okolím nuly.
(3) Z předchozích dvou bodů odvoďte, že systém všech vyvážených pohlcujících podmnožin \mathbb{R}^2 není bázi okolí nuly v žádné lineární topologii na \mathbb{R}^2 .

Návod: (1) Ukažte, že $A + A$ obsahuje obdélník tvaru $[-a, a] \times [-b, b]$.

- Příklad 6.** (1) Ukažte, že konvexní obal vyvážené podmnožiny vektorového prostoru je vyvážený, a tedy absolutně konvexní.
 (2) Ukažte, že vyvážený obal konvexní množiny nemusí být konvexní.

Návod: (2) Uvažte vhodnou úsečku v \mathbb{R}^2 .

Příklad 7. Nechť X je prostor všech lebesgueovsky měřitelných funkcí na $[0, 1]$ (s hodnotami v \mathbb{F} ; ztotožňujeme funkce, které se rovnají skoro všude). Pro $f, g \in X$ položme

$$\rho(f, g) = \int_0^1 \min\{1, |f - g|\}.$$

- (1) Ukažte, že ρ je metrika, která na X generuje lineární topologii.
 (2) Ukažte, že konvergence posloupností v metrice ρ splývá s konvergencí v míře.
 (3) Je výsledná topologie lokálně konvexní?

Návod: (1) Ukažte, že operace jsou spojité s využitím konvergence posloupností. (3) Ukažte, že pro každé $r > 0$ je konvexní obal množiny $\{f \in X; \rho(f, 0) < r\}$ celé X .

Příklad 8. Nechť X je TVS a $A \subset X$ vyvážená množina s neprázdným vnitřkem.

- (1) Ukažte, že $\text{int } A$ je vyvážená, právě když $0 \in \text{int } A$.
 (2) Ukažte na protipříkladu, že $\text{int } A$ nemusí být vyvážená.

Příklad 9. Nechť (X, \mathcal{T}) je TVS a $A \subset X$ neprázdná. Ukažte, že

$$\overline{A} = \bigcap \{A + U; U \in \mathcal{T}(0)\}.$$

Příklad 10. Nechť (X, \mathcal{T}) je TVS, který není Hausdorffův.

- Označme $Z = \overline{\{0\}} = \bigcap \mathcal{T}(0)$. Ukažte, že Z je vektorový podprostor X .
- Nechť $Y = X/Z$ je kvocientový vektorový prostor a $q : X \rightarrow Y$ kanonické kvocientové zobrazení. Nechť \mathcal{R} je kvocientová topologie na Y (tj. $\mathcal{R} = \{U \subset Y; q^{-1}(U) \in \mathcal{T}\}$). Ukažte, že (Y, \mathcal{R}) je HTVS.
- Ukažte, že (Y, \mathcal{R}) je lokálně konvexní, právě když (X, \mathcal{T}) je lokálně konvexní.

K ODDÍLU V.2 – OMEZENÉ MNOŽINY, SPOJITÁ LINEÁRNÍ ZOBRAZENÍ

Příklad 11. Nechť X je TVS a $A \subset X$. Ukažte, že A je omezená, právě když každá spočetná podmnožina A je omezená.

Příklad 12. Nechť X je TVS a $A, B \subset X$ jsou omezené množiny. Ukažte, že i množiny $A \cup B$, $A + B$, \overline{A} , $b(A)$ jsou omezené.

Příklad 13. Nechť X je LCS a $A \subset X$ je omezená množina. Ukažte, že i množiny $\text{co } A$ a $\text{aco } A$ jsou omezené.

Příklad 14. Nechť $X = L^p([0, 1])$, kde $p \in (0, 1)$. Ukažte, že $A = \{f \in X; \|f\|_p < 1\}$ je omezená množina, jejíž konvexní obal není omezená množina.

Návod: Ukažte, že $\text{co } A = X$.

Příklad 15. Nechť X je normovaný lineární prostor a $A \subset X$. Ukažte, že A je omezená jakožto podmnožina TVS X , právě když je omezená v metrice generované normou.

Příklad 16. Necht' X je TVS, jehož topologie je generovaná translačně invariantní metrikou ρ .

- (1) Ukažte, že množina $A \subset X$, která je omezená v X , je omezená i v metrice ρ .
- (2) Ukažte, že množina $A \subset X$, která je omezená v metrice ρ , nemusí být omezená v TVS X .

Návod: (2) *Metrika ρ sama může být omezená.*

Příklad 17. Uvažme prostor testovacích funkcí $\mathcal{D}(\Omega)$ s topologií z Příkladu V.5(2) z přednášky. Necht' $\Lambda : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{F}$ je lineární funkcionál. Ukažte, že $\Lambda \in \mathcal{D}'(\Omega)$, právě když Λ je spojitý.

Příklad 18. Uvažme prostor (X, \mathcal{T}) z Příkladu 4. Ukažte, že každý lineární funkcionál $L : X \rightarrow \mathbb{F}$ je spojitý.

Příklad 19. Necht' $X = \mathbb{F}^\Gamma$ a $A \subset X$. Ukažte, že A je omezená v X , právě když je „bodově omezená“, tj. právě když pro každé $\gamma \in \Gamma$ je množina $\{x(\gamma); x \in A\}$ omezená v \mathbb{F} .

Příklad 20. Necht' $X = \mathcal{C}([0, 1])$ s topologií bodové konvergence, $Y = \mathcal{C}([0, 1])$ s topologií generovanou metrikou ρ z Příkladu 7 a $L : X \rightarrow Y$ je identita.

- (1) Ukažte, že L zobrazuje omezené množiny na omezené množiny.
- (2) Ukažte, že L je sekvenciálně spojitý (tj., pokud $f_n \rightarrow f$ v X , pak $Lf_n \rightarrow Lf$ v Y).
- (3) Ukažte, že L není spojitý.

Návod: (1) *Necht' $A \subset X$ je omezená. Pro $n \in \mathbb{N}$ položme $F_n = \{x \in [0, 1]; \forall f \in A : |f(x)| \leq n\}$. Ukažte, že F_n jsou uzavřené podmnožiny $[0, 1]$, jejichž sjednocení je celý interval $[0, 1]$. Pro $\varepsilon > 0$ zvolte $n \in \mathbb{N}$, aby $\lambda([0, 1] \setminus F_n) < \frac{\varepsilon}{2}$ a $m > n$, aby $\frac{n}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$. Ukažte, že pak $L(A) \subset m\{g \in Y; \rho(g, 0) < \varepsilon\}$. Z toho odvoďte omezenost $L(A)$ v Y . (2) Použijte Lebesgueovu větu. (3) Necht' $U = \{f \in Y; \rho(f, 0) < \frac{1}{2}\}$. Pak U je okolí nuly v Y . Ukažte, že $L^{-1}(U)$ není okolí nuly v X . (Pro každou konečnou $F \subset [0, 1]$ najděte $f \in \mathcal{C}([0, 1])$, pro kterou platí $f|_F = 0$ a přitom $f = 1$ na množině míry aspoň $\frac{1}{2}$.)*

Příklad 21. Necht' X je TVS a (x_n) je posloupnost prvků X . Ukažte, že posloupnost (x_n) je omezená v X , právě když pro každou posloupnost (λ_n) v \mathbb{F} platí $\lambda_n \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda_n x_n \rightarrow \mathbf{o}$.

Příklad 22. Necht' X je metrizable TVS a (x_n) posloupnost prvků X . Ukažte, že existuje posloupnost kladných čísel (λ_n) , pro kterou $\lambda_n x_n \rightarrow \mathbf{o}$.

Návod: *Necht' ρ je metrika generující topologii na X . Ukažte a pak použijte, že pro každé $x \in X$ platí $\lim_{t \rightarrow 0^+} \rho(\mathbf{o}, tx) = 0$.*

Příklad 23. Platí tvrzení z Příkladu 22 i pro nemetrizable TVS?

Návod: *Uvažte prostor z Příkladu 4.*

Příklad 24. Necht' X je TVS, jehož topologie je generovaná translačně invariantní metrikou ρ . Necht' (x_n) je posloupnost prvků X , která konverguje k nule. Ukažte, že existuje posloupnost kladných čísel (λ_n) splňující $\lambda_n \rightarrow \infty$ a $\lambda_n x_n \rightarrow \mathbf{o}$.

Návod: *Z translační invariance metriky ρ plyne $\rho(\mathbf{o}, nx) \leq n\rho(\mathbf{o}, x)$ pro $x \in X$ a $n \in \mathbb{N}$.*

Příklad 25. Platí tvrzení z předchozího příkladu pro obecný TVS?

Návod: *Uvažte například $X = c_0$ nebo $X = \ell^p$ pro $p \in (1, \infty)$ se slabou topologií (viz oddíl VI.1 z přednášky), (x_n) necht' je posloupnost kanonických jednotkových vektorů.*

K ODDÍLU V.3 – PROSTORY KONEČNÉ A NEKONEČNÉ DIMENZE

Příklad 26. Ukažte, že každý TVS konečné dimenze je lokálně konvexní.

Návod: Pro Hausdorffův prostor použijte Tvzení V.9 z přednášky. Pro obecný případ využijte Příklad 10.

Příklad 27. Necht' X je vektorový prostor nekonečné dimenze. Ukažte, že na X existuje Hausdorffova lineární topologie, která není lokálně konvexní.

Návod: Necht' $(e_j)_{j \in J}$ je algebraická báze X . Zvolme $p \in (0, 1)$ a definujme na X metriku $\rho(\sum a_j e_j, \sum b_j e_j) = \sum |a_j - b_j|^p$.

Příklad 28. Necht' X je metrizovatelný TVS nekonečné dimenze. Ukažte, že na X existuje nespojitý lineární funkcionál.

Návod: Použijte algebraickou bázi X a Příklad 22.

Příklad 29. Existuje na každém HTVS nekonečné dimenze nespojitý lineární funkcionál?

Návod: Použijte Příklad 18.

K ODDÍLU V.4 – METRIZOVATELNOST TVS

Příklad 30. Necht' X je vektorový prostor nad \mathbb{F} a $p : X \rightarrow [0, \infty)$ je F -norma na X .

- (1) Ukažte, že vzorec $\rho(x, y) = p(x - y)$ definuje translačně invariantní metriku na X , která generuje lineární topologii na X .
- (2) Ukažte, že systém $\left\{ \left\{ x \in X; p(x) < \frac{1}{n} \right\}; n \in \mathbb{N} \right\}$ tvoří bázi okolí nuly v této topologii.

Příklad 31. Necht' X je vektorový prostor nad \mathbb{F} a $q : X \rightarrow [0, \infty)$ je **kvazinorma** na X , tj. zobrazení s vlastnostmi:

- $\forall x \in X : q(x) = 0 \Leftrightarrow x = \mathbf{o}$;
- $\forall x \in X \forall \lambda \in \mathbb{F} : q(\lambda x) = |\lambda| q(x)$;
- $\exists C \geq 1 \forall x, y \in X : q(x + y) \leq C(q(x) + q(y))$.

- (1) Ukažte, že systém $\left\{ \left\{ x \in X; q(x) < r \right\}; r \in (0, \infty) \right\}$ tvoří bázi okolí nuly v jisté lineární topologii na X .
- (2) Ukažte, že tato topologie je metrizovatelná.
- (3) Ukažte, že v této topologii platí $x_n \rightarrow x$, právě když $q(x_n - x) \rightarrow 0$.

Návod: (2) Ukažte, že existuje spočetná báze okolí nuly.

Příklad 32. Necht' X je vektorový prostor nad \mathbb{F} , $q : X \rightarrow [0, \infty)$ F -norma na X a $p \in (0, 1)$. Pak říkáme, že q je **p -norma**, pokud $q(\lambda x) = |\lambda|^p q(x)$ pro každé $x \in X$ a $\lambda \in \mathbb{F}$.

- (1) Ukažte, že funkce $f \mapsto \|f\|_p$ je p -norma na $L^p(\mu)$.
- (2) Ukažte, že funkce $f \mapsto (\|f\|_p)^{1/p}$ je kvazinorma na $L^p(\mu)$.
- (3) Necht' q je p -norma na X . Ukažte, že $q^{1/p}$ je kvazinorma na X a odhadněte příslušnou hodnotu C .

Návod: (2) je speciální případ (3). Položme $\alpha = \frac{1}{p}$. Pomocí vyšetření průběhu vhodné funkce ukažte, že pro $a, b \geq 0$ je $a^\alpha + b^\alpha \leq (a + b)^\alpha \leq 2^{\alpha-1}(a^\alpha + b^\alpha)$.

Příklad 33. Necht' X je TVS a p F -pseudonorma na X . Ukažte, že p je spojitá, právě když je spojitá v nule.

Příklad 34. Necht' X je TVS a U je okolí nuly. Ukažte, že existuje spojitá F -pseudonorma p na X , pro kterou $\{x \in X; p(x) < 1\} \subset U$.

Návod: Necht' (V_n) je posloupnost vyvážených okolí nuly splňující $V_1 + V_1 \subset U$ a $V_{n+1} + V_{n+1} \subset V_n$ pro $n \in \mathbb{N}$. Aplikujte na tuto posloupnost postup konstrukce z důkazu Tvzení V.14 z přednášky.

Příklad 35. S využitím předchozího příkladu ukažte, že každý TVS je úplně regulární.

K ODDÍLU V.5 – PSEUDONORMY, MINKOWSKÉHO FUNKCIONÁLY, F-PSEUDONORMY

Příklad 36. Ukažte na protipříkladu, že Minkowského funkcionál vyváženého okolí nuly nemusí být spojitý.

Návod: Může se stát, že existuje $x \in X$ a čísla $0 < a < b$, že úsečka $\{tx; t \in [a, b]\}$ je obsažena v hranici daného vyváženého okolí nuly. Protipříklad lze zkonstruovat již v \mathbb{R}^2 .

Příklad 37. Necht' X je TVS, $A \subset X$ vyvážené okolí nuly a p_A jeho Minkowského funkcionál. Ukažte, že následující tři podmínky jsou ekvivalentní:

- (i) p_A je spojitý na X ;
- (ii) Pro každé $x \in \overline{A}$ platí $\{tx; t \in [0, 1]\} \subset \text{int } A$;
- (iii) $\text{int } A = \{x \in X; p_A(x) < 1\}$ & $\overline{A} = \{x \in X; p_A(x) \leq 1\}$.

Příklad 38. Necht' X je TVS, $A \subset X$ podmnožina obsahující nulový vektor a $p \in (0, 1)$. Řekneme, že množina A je p -konvexní, jestliže

$$\forall x, y \in A \forall s, t \in [0, 1] : s^p + t^p = 1 \Rightarrow sx + ty \in A.$$

- (1) Necht' A je p -konvexní, $x_1, \dots, x_n \in A$ a $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$ splňují $t_1^p + \dots + t_n^p = 1$. Ukažte, že $t_1x_1 + \dots + t_nx_n \in A$.
- (2) Necht' $0 < p < q < 1$. Ukažte, že platí

$$A \text{ konvexní} \Rightarrow A \text{ } q\text{-konvexní} \Rightarrow A \text{ } p\text{-konvexní}.$$

- (3) Ukažte na příkladu, že p -konvexní množina nemusí být konvexní.
- (4) Necht' A je p -konvexní okolí nuly. Ukažte, že jeho Minkowského funkcionál je spojitý.

Návod: (1) Použijte matematickou indukci. (2) Využijte, že $0 \in A$. (3) Uvažte například množinu $\{f \in L^p([0, 1]); \|f\|_p < 1\}$. (4) Použijte charakterizaci z předchozího příkladu.

Příklad 39. Ukažte, že topologie z Příkladu 4 je generována systémem všech pseudonorem na X .

Příklad 40. Necht' X je vektorový prostor a \mathcal{P} je nějaký systém F -pseudonorem na X .

- (1) Ukažte, že systém

$$\left\{ \{x \in X; p_1(x) < c_1, \dots, p_k(x) < c_k\}; p_1, \dots, p_k \in \mathcal{P}, c_1, \dots, c_k > 0 \right\}$$

tvorí bázi okolí nuly v nějaké lineární topologii na X .

- (2) Ukažte, že F -pseudonormy z \mathcal{P} jsou v této topologii spojité.
- (3) Ukažte, že tato topologie je Hausdorffova, právě když pro každé $x \in X \setminus \{0\}$ existuje $p \in \mathcal{P}$, pro kterou $p(x) > 0$.

Příklad 41. Necht' (X, \mathcal{T}) je TVS. Necht' \mathcal{P} je systém všech spojitých F -pseudonorem na X . Ukažte, že topologie generovaná systémem \mathcal{P} ve smyslu Příkladu 40 je právě \mathcal{T} .

Návod: *Použijte Příklad 34.*

Příklad 42. Necht' X je vektorový prostor. Ukažte, že na X existuje nejsilnější lineární topologie a že tato topologie je Hausdorffova.

Návod: *Použijte konstrukci z Příkladu 40 na systém všech F -seminorem na X .*

Příklad 43. Necht' X je vektorový prostor spočetné algebraické dimenze. Ukažte, že nejsilnější lineární topologie na X je lokálně konvexní.

Návod: *Necht' \mathcal{T} je topologie z Příkladu 4. Ukažte, že každá F -pseudonorma na X je spojitá v \mathcal{T} : Necht' p je F -pseudonorma na X a (e_n) je algebraická báze. Pro každé $\varepsilon > 0$ ukažte, že existuje (t_n) posloupnost kladných čísel, pro kterou $\text{aco} \{t_n e_n; n \in \mathbb{N}\} \subset \{x; p(x) < \varepsilon\}$.*

Příklad 44. Necht' X je vektorový prostor nespočetné algebraické dimenze. Ukažte, že nejsilnější lineární topologie na X není lokálně konvexní.

Návod: *Ukažte, že F -seminorma definovaná jako v Příkladu 27 není spojitá v topologii z Příkladu 4.*

K ODDÍLU V.6 - F-PROSTORY, FRÉCHETOVY PROSTORY, TOTÁLNĚ OMEZENÉ MNOŽINY

Příklad 45. Necht' X je TVS a $A, B \subset X$ jsou totálně omezené podmnožiny. Ukažte, že i množiny $A \cup B$, $A + B$, \overline{A} , $b(A)$ jsou totálně omezené.

Příklad 46. Necht' X je TVS, jehož topologie je generovaná translačně invariantní metrikou ρ . Ukažte, že množina $A \subset X$ je totálně omezená v TVS X , právě když je totálně omezená v metrice ρ .

Příklad 47. Ukažte na protipříkladu, že v F -prostoru, který není lokálně konvexní, uzavřený konvexní obal kompaktní množiny nemusí být kompaktní.

Návod: *Protipříklad lze zkonstruovat například v prostoru $L^p([0, 1])$, kde $p \in (0, 1)$: Zvolme kladná čísla ε, η a δ tak, aby platilo: $p < \frac{1}{1+\varepsilon}$, $\frac{\eta}{\varepsilon} < p$, $\delta < \varepsilon$ a $\frac{\eta}{\varepsilon-\delta} < p$. Pro $n \in \mathbb{N}$ položme $x_n = \frac{1}{n^{1+\eta}}$, $f_n = n^{1+\varepsilon} \chi_{(x_{n+1}, x_n)}$ a $t_n = \frac{1}{n^{1+\delta}}$. Ukažte, že $f_n \rightarrow 0$ v $L^p([0, 1])$, a tedy $\{0, f_1, f_2, f_3, \dots\}$ je kompaktní množina. Dále ukažte, s využitím prvků $\frac{t_1 f_1 + \dots + t_n f_n}{t_1 + \dots + t_n}$, že konvexní obal uvedené kompaktní množiny je množina neomezená v $L^p([0, 1])$.*

K ODDÍLU V.7 – ODDĚLOVACÍ VĚTY

Příklad 48. Necht' $X = L^p([0, 1])$, kde $p \in (0, 1)$. Ukažte, že $X^* = \{0\}$.

Návod: *Ukažte, že jediné dvě konvexní otevřené množiny v X jsou \emptyset a X .*

Příklad 49. Necht' $X = \ell^p$, kde $p \in (0, 1)$. Ukažte, že pro každou posloupnost $\mathbf{x} = (x_n) \in \ell^\infty$ vzorec

$$\varphi_{\mathbf{x}}(\mathbf{y}) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n, \quad \mathbf{y} = (y_n) \in \ell^p,$$

definuje spojitý lineární funkcionál na ℓ^p . Ukažte, že zobrazení $\mathbf{x} \mapsto \varphi_{\mathbf{x}}$ je lineární bijekce ℓ^∞ na X^* .

Příklad 50. Necht' $p \in (0, 1)$. Uka'zte, že ℓ^p je izomorfní (dokonce izometrické) podprostoru $L^p([0, 1])$. S využitím předchozích dvou příkladů pak uka'zte na protipříkladu, že spojitý lineární funkcionál na podprostoru TVS nemusí jít rozšířit na spojitý lineární funkcionál na celém prostoru.

Příklad 51. Necht' X je normovaný lineární prostor nekonečné dimenze. Uka'zte, že v X existují dvě disjunktní konvexní množiny, které jsou husté v X (a tedy je nelze oddělit nenulovým prvkem X^*).

Návod: Využijte existenci nespojitého lineárního funkcionálu.

Příklad 52. Necht' $X = \mathcal{C}([0, 1])$ s L^2 -normou (tj. $\|f\| = \left(\int_0^1 |f|^2\right)^{1/2}$). Pro $\alpha \in \mathbb{R}$ definujme $Y_\alpha = \{f \in X; f(0) = \alpha\}$. Uka'zte, že $(Y_\alpha; \alpha \in \mathbb{R})$ je systém po dvou disjunktních hustých konvexních množin. Uka'zte, že pro $\alpha \neq \beta$ nelze množiny Y_α a Y_β oddělit nenulovým prvkem X^* .

Příklad 53. Necht' $X = c_0$ nebo $X = \ell^p$ pro nějaké $p \in [1, \infty)$ (uvažujme prostory nad \mathbb{R}). Necht' $\mathbf{x} = (x_n) \in X$ je prvek, jehož všechny souřadnice jsou kladné, a $\mathbf{y} = \left(\frac{x_n}{n}\right) \in X$. Položme

$$A = \{\mathbf{z} = (z_n) \in X; \forall n \in \mathbb{N} : z_n \geq 0\}, \quad B = \{-\mathbf{x} + t\mathbf{y}; t \in \mathbb{R}\}.$$

Uka'zte, že A a B jsou disjunktní uzavřené podmnožiny X , které není možné oddělit nenulovým prvkem X^* .

Návod: Postupujte sporem: Necht' $f \in X^ \setminus \{0\}$ splňuje $\sup f(B) \leq \inf f(A)$. Uka'zte, že nutně $f \geq 0$ na A a $\inf f(A) = 0$. Funkcionál f lze reprezentovat příslušnou posloupností (prvkem ℓ^1 resp. ℓ^q , kde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), uka'zte, že všechny prvky této posloupnosti musí být nezáporné. Z předpokladu $\inf f(B) \leq 0$ odvoďte $f(\mathbf{y}) = 0$, a odtud $f = 0$, což dává spor.*