

## VIII.2 Konformní zobrazení a konformní ekvivalence

**Definice.** Nechť  $G \subset \overline{\mathbb{C}}$  je otevřená. Řekneme, že zobrazení  $f : G \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  je **konformní** na  $G$ , je-li meromorfní a prosté.

**Poznámky.**

- (1) Je-li  $f$  konformní na  $G$ ,  $a \in G \cap \mathbb{C}$  a  $f(a) \in \mathbb{C}$ , pak  $f'(a) \neq 0$ .
- (2) Je-li  $f$  konformní na  $G$ , pak má nejvýše jeden pól, a ten je násobnosti 1.
- (3) Je-li  $G \subset \mathbb{C}$  otevřená,  $f \in H(G)$  splňující  $f'(z) \neq 0$  pro všechna  $z \in G$ , pak  $f$  je na  $G$  lokálně konformní, tj. konformní v nějakém okolí každého bodu.
- (4) Je-li  $f$  konformní na  $G$ , pak zachovává úhly v každém bodě  $G$ : Je-li  $a \in \mathbb{C}$  a  $f(a) \in \mathbb{C}$ , pak je zachovávání úhlů definováno výše. V ostatních případech je definice analogická, s tím že:
  - (a) je-li  $a \in \mathbb{C}$  a  $f(a) = \infty$ , pak  $v(t) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{A(f(a+re^{it}))}$ ;
  - (b) je-li  $a = \infty$  a  $f(a) \in \mathbb{C}$ , pak  $v(t) = \lim_{r \rightarrow \infty} A(f(re^{-it}) - f(\infty))$ ;
  - (c) je-li  $a = \infty$  a  $f(a) = \infty$ , pak  $v(t) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{A(f(re^{-it}))}$ .

**Větička 2.**  $f$  je konformní na  $\overline{\mathbb{C}}$ , právě když na  $\overline{\mathbb{C}}$  platí  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ , kde  $a, b, c, d \in \mathbb{C}$  splňují  $ad - bc \neq 0$ .

**Větička 3.** Je-li  $f$  konformní na  $\mathbb{C}$ , pak lze konformně rozšířit na  $\overline{\mathbb{C}}$ , a má tedy tvar z Větičky 2.

**Důsledek.** Je-li  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  konformní, pak  $f(z) = az + b$  pro nějaká  $a, b \in \mathbb{C}$ ,  $a \neq 0$ .

**Lemma 4** (Schwarzovo). Nechť  $f$  je holomorfní na  $U(0, 1)$  splňující  $f(0) = 0$  a  $|f(z)| \leq 1$  pro všechna  $z \in U(0, 1)$ . Pak platí

- $|f(z)| \leq |z|$  pro každé  $z \in U(0, 1)$ ,
- $|f'(0)| \leq 1$ .

Jestliže navíc buď  $|f'(0)| = 1$  nebo alespoň pro jedno  $z \in P(0, 1)$  platí  $|f(z)| = |z|$ , pak existuje takové  $\alpha \in \mathbb{C}$ ,  $|\alpha| = 1$ , že  $f(z) = \alpha z$  pro všechna  $z \in U(0, 1)$ .

**Věta 5** (Riemannova). Nechť  $G \subsetneq \mathbb{C}$  je oblast, pro kterou  $\overline{\mathbb{C}} \setminus G$  je souvislá. Pak existuje konformní zobrazení  $G$  na  $U(0, 1)$ .

**Definice.** Oblasti  $G_1, G_2 \subset \mathbb{C}$  se nazývají **konformně ekvivalentní**, jestliže existuje konformní zobrazení  $G_1$  na  $G_2$ .

**Poznámka.** Z Věty 5 plyne, že každé dvě oblasti  $G_1, G_2 \subsetneq \mathbb{C}$  se souvislým doplňkem v  $\overline{\mathbb{C}}$  (ekvivalentně, jednoduše souvislé) jsou konformně ekvivalentní.

**Poznámka.** Pro oblasti s nesusvislým doplňkem v  $\overline{\mathbb{C}}$  je situace složitější. Například platí netriviální tvrzení:

- (1) Mezikruží  $P(a_1, r_1, R_1)$  a  $P(a_2, r_2, R_2)$  (kde  $a_j \in \mathbb{C}$ ,  $0 < r_j < R_j < +\infty$  pro  $j = 1, 2$ ) jsou konformně ekvivalentní, právě když  $\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2}$ .
- (2) Nechť  $1 < R < +\infty$ . Pak každé konformní zobrazení mezikruží  $P(0, 1, R)$  na sebe je buď tvaru  $f(z) = \alpha z$ , kde  $|\alpha| = 1$ , nebo tvaru  $f(z) = \frac{\alpha R}{z}$ , kde  $|\alpha| = 1$ .