

## II.3 Něco málo o Riemannových plochách

**Definice.** Riemannovou plochou rozumíme souvislou holomorfní varietu dimenze 1, tj. souvislý Hausdorffův topologický prostor  $X$ , na němž je dán holomorfní atlas, tj. systém  $(U_\lambda, \varphi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  s vlastnostmi:

- Pro každé  $\lambda \in \Lambda$  je  $U_\lambda$  otevřená podmnožina prostoru  $X$ ;
- $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda = X$ ;
- pro každé  $\lambda \in \Lambda$  je  $\varphi_\lambda$  homeomorfismus množiny  $U_\lambda$  na nějakou otevřenou podmnožinu  $\mathbb{C}$ ;
- kdykoli  $\lambda, \mu \in \Lambda$  jsou takové, že  $U_\lambda \cap U_\mu \neq \emptyset$ , pak zobrazení  $\varphi_\mu \circ \varphi_\lambda^{-1}$  je holomorfní na množině  $\varphi_\lambda(U_\lambda \cap U_\mu)$ .

Dvojice  $(U_\lambda, \varphi_\lambda)$ , které jsou prvky atlasu, se nazývají **mapy**.

**Poznámky.**

- (1) Každá oblast v  $\mathbb{C}$  je Riemannova plocha. (Atlas obsahuje jedinou mapu, příslušná funkce je identita.)
- (2)  $\overline{\mathbb{C}}$  je Riemannova plocha. Atlas tvoří například dvojice map  $(\mathbb{C}, z \mapsto z)$  a  $(\overline{\mathbb{C}} \setminus \{0\}, z \mapsto \frac{1}{z})$ .
- (3) Otevřená souvislá podmnožina Riemannovy plochy je Riemannova plocha (s přirozeným atlasem).
- (4) Bez újmy na obecnosti lze předpokládat, že pro každou mapu  $(U, \varphi)$  je  $\varphi(U)$  otevřený kruh.

**Definice.** Necht'  $X$  a  $Y$  jsou Riemannovy plochy a  $\Omega \subset X$  je otevřená podmnožina.

- Zobrazení  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  se nazývá **holomorfní**, pokud pro každou mapu  $(U, \varphi)$  splňující  $U \cap \Omega \neq \emptyset$  je  $f \circ \varphi^{-1}$  holomorfní na  $\varphi(U \cap \Omega)$ .
- Zobrazení  $f : \Omega \rightarrow Y$  se nazývá **holomorfní**, pokud je spojitý a pro každou mapu  $(U, \varphi)$  na  $X$  a každou mapu  $(V, \psi)$  na  $Y$  je  $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$  holomorfní na  $\varphi(U \cap f^{-1}(V))$  (pokud je tato množina neprázdná).
- Zobrazení  $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  se nazývá **meromorfní**, pokud pro každou mapu  $(U, \varphi)$  splňující  $U \cap \Omega \neq \emptyset$  je  $f \circ \varphi^{-1}$  meromorfní na  $\varphi(U \cap \Omega)$ .

**Věta 7** (vlastnosti holomorfních zobrazení mezi Riemannovými plochami).

- (1) Necht'  $X$  je Riemannova plocha a  $f, g$  jsou holomorfní zobrazení  $X$  do  $\mathbb{C}$ . Pak funkce  $f + g$  a  $fg$  jsou také holomorfní. Pokud  $g$  nenabývá nuly, je i funkce  $f/g$  holomorfní.
- (2) Necht'  $X, Y$  a  $Z$  jsou Riemannovy plochy,  $f : X \rightarrow Y$  a  $g : Y \rightarrow Z$  jsou holomorfní zobrazení. Pak je i zobrazení  $g \circ f$  holomorfní.
- (3) Necht'  $X$  a  $Y$  jsou Riemannovy plochy. Necht'  $f : X \rightarrow Y$  a  $g : X \rightarrow Y$  jsou holomorfní. Pokud má množina  $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$  hromadný bod v  $X$ , pak  $f = g$  na  $X$ .
- (4) Necht'  $X$  je Riemannova plocha a  $f : X \rightarrow \mathbb{C}$  nekonstantní holomorfní zobrazení. Pak  $|f|$  nenabývá na  $X$  lokálního maxima.

**Důsledek.** Necht'  $X$  je kompaktní Riemannova plocha. Pak každá holomorfní funkce  $f : X \rightarrow \mathbb{C}$  je konstantní.

**Poznámky:**

- (1) Na každé Riemannově ploše existuje nekonstantní meromorfní funkce.
- (2) Na každé nekompaktní Riemannově ploše existuje nekonstantní holomorfní funkce.

### Riemannova plocha analytické funkce

Necht'  $f$  je analytická funkce v oblasti  $\Omega$ . Pak jí přísluší následující Riemannova plocha a holomorfní funkce na ní:

- Množina  $X$  je množina všech tříd ekvivalence při ekvivalenci „být stejnými elementy“ definované na  $f$ .
- Topologie na  $X$ : Necht'  $\mathbf{x} \in X$ . Necht'  $(f, D) \in \mathbf{x}$  a  $z_0$  necht' je střed kruhu  $D$ . Pro každé  $r > 0$  definujme

$$U(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{y} \in X : \exists (g, U(z, \delta)) \in \mathbf{y} : |z - z_0| < r \\ \& (g, U(z, \delta)) \text{ je přímým pokračováním } (f, D)\}.$$

Systém  $U(\mathbf{x}, r)$ ,  $r > 0$ , pak bude tvořit bázi okolí  $\mathbf{x}$  v  $X$ .

- Atlas na  $X$  tvoří mapy  $(U(\mathbf{x}, r), \varphi)$  pro  $\mathbf{x} \in X$  a  $r > 0$ , kde

$$\varphi : \mathbf{y} \mapsto \text{střed kruhu } D, \text{ kde } (D, f) \in \mathbf{y}.$$

Uvažme dále funkci  $F : X \rightarrow \mathbb{C}$  definovanou předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(z), \text{ pokud } (f, D) \in \mathbf{x} \text{ a } z \text{ je středem kruhu } D.$$

Pak  $F$  je holomorfní na  $X$ .