

V.9 Kvazikonkávnní funkce

Definice. Necht $M \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní množina a funkce f je definována na M . Řekneme, že f je

- kvazikonkávnní na M , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle : f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\},$$

- ryze kvazikonkávnní na M , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \forall t \in (0, 1) : f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

Poznámky. Necht $M \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M .

- (i) Funkce f je kvazikonkávnní na M , právě když

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, f(\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a}) \forall t \in \langle 0, 1 \rangle : f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a}).$$

- (ii) Funkce f je ryze kvazikonkávnní na M , právě když

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, f(\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a}) \forall t \in (0, 1) : f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > f(\mathbf{a}).$$

- (iii) Je-li f konkávnní na M , pak je i kvazikonkávnní na M .

- (iv) Je-li f ryze konkávnní na M , pak je i ryze kvazikonkávnní na M .

Věta 25 (o jednoznačnosti extrému). Necht f je ryze kvazikonkávnní funkce na konvexní množině $M \subset \mathbf{R}^n$. Pokud f nabývá na M svého maxima, pak ho nabývá právě v jednom bodě.

Důsledek. Necht $M \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní, kompaktní a neprázdná množina a f je spojitá a ryze kvazikonkávnní funkce na M . Pak f nabývá maxima na M právě v jednom bodě.

Věta 26 (charakterizace kvazikonkávnních funkcí pomocí úrovnových množin). Necht $M \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Funkce f je kvazikonkávnní na M právě tehdy, když pro každé $\alpha \in \mathbf{R}$ je množina

$$Q_\alpha = \{\mathbf{x} \in M; f(\mathbf{x}) \geq \alpha\}$$

konvexní.