

APPENDIX 3: Částečně uspořádané množiny a Zornovo lemma

Nechť A je nějaká množina a \preceq je relace na A . Relace \preceq se nazývá

- **částečné uspořádání**, pokud
 - $\forall x \in A : x \preceq x$,
 - $\forall x, y, z \in A : x \preceq y \ \& \ y \preceq z \Rightarrow x \preceq z$,
 - $\forall x, y \in A : x \preceq y \ \& \ y \preceq x \Rightarrow x = y$;
- **úplné uspořádání** (nebo též **lineární uspořádání**), je-li to částečné uspořádání splňující navíc
 - $\forall x, y \in A : x \preceq y$ nebo $y \preceq x$;
- **dobré uspořádání**, je-li to úplné uspořádání a navíc má každá neprázdná podmnožina A \preceq -nejmenší prvek.

Nechť (A, \preceq) je částečně uspořádaná množina a $B \subset A$. Množině B říkáme **řetězec**, pokud je úplně uspořádaná relací \preceq (tj. pokud pro každé dva prvky $x, y \in B$ platí $x \preceq y$ nebo $y \preceq x$).

Zornovo lemma. *Nechť (A, \preceq) je částečně uspořádaná množina. Předpokládejme, že každý řetězec v A má horní odhad, tj.*

$$\forall B \subset A \text{ řetězec } \exists x \in A \forall y \in B : y \preceq x.$$

Pak pro každé $x \in A$ existuje $y \in A$ splňující $x \preceq y$, které je \preceq -maximální, tj.

$$\forall z \in A : y \preceq z \Rightarrow y = z.$$

Příklady rutinního použití Zornova lemmatu

1. Nechť (M, d) je metrický prostor a $\varepsilon > 0$. Pak existuje maximální ε -diskrétní podmnožina M , tj. taková $C \subset M$, že pro každé dva různé prvky $x, y \in C$ je $d(x, y) \geq \varepsilon$ a přitom pro každé $z \in M$ existuje $x \in C$, že $d(x, z) < \varepsilon$.

Důkaz. Označme symbolem \mathcal{A} množinu všech ε -diskrétních podmnožin M . Pro $B, C \in \mathcal{A}$ definujme $B \preceq C$, jestliže $B \subset C$. Pak (\mathcal{A}, \preceq) je částečně uspořádaná množina. Je-li $\mathcal{R} \subset \mathcal{A}$ řetězec, je jeho sjednocení $R = \bigcup \mathcal{R}$ horním odhadem \mathcal{R} . (K tomu je potřeba ukázat, že $R \in \mathcal{A}$, nerovnosti jsou pak zřejmé. Abychom ukázali, že $R \in \mathcal{A}$, vezměme $x, y \in R$. Protože $R = \bigcup \mathcal{R}$, existují $B, C \in \mathcal{R}$, že $x \in B$ a $y \in C$. Protože \mathcal{R} je řetězec, je $B \subset C$ nebo $C \subset B$. Dejme tomu, že $B \subset C$. Pak $x, y \in C$. Protože C je ε -diskrétní, je $d(x, y) \geq \varepsilon$.) Protože $\emptyset \in \mathcal{A}$, z Zornova lemmatu plyne existence maximálního prvku.

2. Nechť (M, d) je metrický prostor a $\varepsilon > 0$. Pak existuje systém \mathcal{U} s vlastnostmi:

- Prvky \mathcal{U} jsou otevřené podmnožiny M diametru $< \varepsilon$.
- Prvky \mathcal{U} jsou po dvou disjunktní.
- Sjednocení $\bigcup \mathcal{U}$ je hustá podmnožina M .

Návod k důkazu: Nechť \mathcal{A} je množina všech systémů \mathcal{U} splňujících první dvě podmínky. Pro dva prvky $\mathcal{U}, \mathcal{V} \in \mathcal{A}$ nechť $\mathcal{U} \preceq \mathcal{V}$, pokud $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$. Ověřte předpoklady Zornova lemmatu a dokažte, že maximální prvek musí splňovat třetí podmínku.

3. Existuje systém \mathcal{U} s vlastnostmi:

- Prvky \mathcal{U} jsou nekonečné podmnožiny \mathbb{N} .
- Pokud $B, C \in \mathcal{U}$ jsou různé, je $A \cap B$ konečná.
- Pro každou $A \subset \mathbb{N}$ nekonečnou existuje $B \in \mathcal{U}$ taková, že $A \cap B$ je nekonečná.

Návod k důkazu: Stejný jako v případě 2.

4. Nechť (Ω, Σ, μ) je prostor s nezápornou mírou. Pak existuje systém \mathcal{U} s vlastnostmi:

- $\mathcal{U} \subset \Sigma$ a pro každou $A \in \mathcal{U}$ je $0 < \mu(A) < \infty$.
- Pokud $B, C \in \mathcal{U}$ jsou různé, je $\mu(A \cap B) = 0$.
- Pro každou $A \in \Sigma$ splňující $0 < \mu(A) < \infty$ existuje $B \in \mathcal{U}$ taková, že $\mu(A \cap B) > 0$.

Návod k důkazu: Stejný jako v případě 2.

Poznámky k důkazu Zornova lemmatu.

Zornovo lemma je důsledkem axiomu výběru, je s ním ve skutečnosti ekvivalentní, stejně jako například Zermelova věta o dobrém uspořádání.

Axiom výběru. *Nechť I je neprázdňá množina a $(A_i)_{i \in I}$ je indexovaný systém neprázdňých množin. Pak existuje zobrazení f definované na množině I takové, že pro každé $i \in I$ je $f(i) \in A_i$.*

Zermelova věta o dobrém uspořádání. *Každou množinu lze dobře uspořádat. Tj. na každé množině existuje relace, která je dobrým uspořádáním.*

Axiom výběru plyne z Zermelovy věty: Uvažme množinu $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Zvolme na ní dobré uspořádání \preceq . Položme $f(i) = \preceq - \min A_i$ pro $i \in I$.

Zermelova věta plyne z Zornova lemmatu: Nechť A je množina. Označme \mathcal{A} množinu všech dvojic (B, \preceq_B) , kde $B \subset A$ a \preceq_B je dobré uspořádání na B . Definujme na \mathcal{A} částečné uspořádání $(B, \preceq_B) \preceq (C, \preceq_C)$, pokud platí

- $B \subset C$,
- pro $x, y \in B$ je $x \preceq_B y$, právě když $x \preceq_C y$,
- je-li $x \in B$, $y \in C$ a $y \preceq_C x$, pak $y \in B$.

Pak jsou splněny předpoklady Zornova lemmatu a maximálním prvkem je (A, \preceq_A) pro nějaké dobré uspořádání na A .

Zornovo lemma plyne z axiomu výběru, ale důkaz je obtížnější, protože používá transfinitní rekurzi. Základní schéma je následující: Postupuje se sporem. Nechť (A, \preceq) splňuje předpoklady Zornova lemmatu, ale neexistuje maximální prvek nad prvkem $a \in A$. Nechť I je množina všech řetězců obsahujících bod a . Z axiomu výběru plyne existence funkce $f : I \rightarrow A$ takové, že pro každé $R \in I$ a každé $x \in R$ je $x \prec f(R)$. Nyní se transfinitní rekurzí pro každé ordinální číslo α zkonstruuje funkce $g_\alpha : \alpha = [0, \alpha) \rightarrow A$ takto:

- $g_1(0) = \{a\}$;
- $g_{\alpha+1}|_{[0, \alpha)} = g_\alpha$, $g_{\alpha+1}(\alpha) = f(g_\alpha[[0, \alpha))$;
- je-li α limitní, pak $g_\alpha(\gamma) = g_{\gamma+1}(\gamma)$ pro $\gamma < \alpha$.

Protože A je množina, musí se konstrukce někdy zastavit, což dává spor.