

$$C'(x)e^{-\int P dx} - C(x)Pe^{-\int P dx} + PC(x)e^{-\int P dx} = Q,$$

po úpravě dostaneme

$$C'(x) = Qe^{\int P dx}. \quad (22)$$

To je diferenciální rovnice pro funkci  $C(x)$ , jejíž řešení je možno napsat ve tvaru

$$C(x) = \int Qe^{\int P dx} dx + K, \quad (23)$$

kde  $K$  je libovolná konstanta. Dosadíme-li tuto funkci do rovnice (20), obdržíme

$$y = e^{-\int P dx} \left( K + \int Qe^{\int P dx} dx \right), \quad (24)$$

což je obecný integrál dané diferenciální rovnice.

### Příklad 5 – variace konstant – 1

Řešte rovnici  $y' + y = e^x$  metodou variace konstant.

#### Řešení

1. Nejprve řešíme příslušnou homogenní rovnici  $y' + y = 0$  metodou separace proměnných.

$$\frac{dy}{y} = -dx,$$

$$y = Ce^{-x}.$$

2. Předpokládáme  $C = C(x)$ , potom  $y = C(x)e^{-x}$ ,  
 $y' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}$ . Po dosazení do původní nehomogenní rovnice

$$C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} = e^x,$$

$$C'(x) = e^{2x},$$

$$C(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + K,$$

kde  $K$  je libovolná konstanta.

Pak  $y = \left( \frac{1}{2}e^{2x} + K \right) e^{-x}$ , neboli

$$y = \frac{1}{2}e^x + Ke^{-x}.$$

(1b)  $xy' - y = x^2$

• pro  $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ :

$$y' - \frac{y}{x} = x$$

$$y' = \frac{y}{x} + x$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln|y| = \ln|x| + c$$

$$|y| = e^c |x|$$

$$y = kx$$

$$c \in \mathbb{R}$$

$$k \in \mathbb{R}$$

$$y = 0$$

$$y = k(x) \cdot x$$

$$k'x + k - \frac{kx}{x} = x$$

$$k' = 1$$

$$k = x + c$$

$$y = (x+c)x \quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

$c \in \mathbb{R}$

• lepení

odhad:

$$y = \begin{cases} x(x+c_2) & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x(x+c_2) & x > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x + c_2 = c_2$$

lepe:  $y = \begin{cases} x(x+c_1) & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x(x+c_1) & x > 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x + c_1 = c_1$$

$$\Rightarrow c_1 = c_2$$

Dosadíme do rovnice a dostaneme

$$u' \cdot e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

$$u = \int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + K$$

$$y = \left( \int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + K \right) \cdot e^{-\int p(x)dx}$$

Můžeme si všimnout, že v obou postupech jsou počítané integrály stejné.

## 5.1 Řešené úlohy

(1c)

**Příklad 5.1**  $y' - xy = e^{\frac{x(x+2)}{2}}$

Řešení DR

zkrácená LDR

$$y' - xy = 0$$

to je DR se separovanými proměnnými

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int x dx$$

$$\ln y = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\tilde{y} = C e^{\frac{x^2}{2}}$$

to je obecné řešení zkrácené LDR, nyní nalezneme obecné řešení úplné LDR

$$y = C(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$$

derivace bude:

$$y' = C'(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + C(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \cdot x$$

$$y' = C'(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + xC(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$$

(1c)

dosadíme do zadání

$$\left[ C'(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + xC(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \right] - xC(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} = e^{\frac{x(x+2)}{2}}$$

$$C'(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}} = e^{\frac{x^2+2x}{2}}$$

$$C'(x) = e^{\frac{2x}{2}}$$

$$C'(x) = e^x$$


$$C(x) = \int e^x dx = e^x + K$$

provedeme dosazení  $C(x)$  do  $y = C(x) \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$  a dostaneme

$$y = (e^x + K) \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$$


kde  $x \in \mathbb{R}, K \in \mathbb{R}$ .

Grafické řešení pro  $C = -5, -3, -1, 0, 1, 3$



Kdybychom vykreslili všechna řešení, pak by křivky vyplnily celou rovinu.

(1d)  $y' \tan x - y = 1$



$x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi$ ; da lo Fedimo pro

$x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$

$\cup x \in (0, \frac{\pi}{2}) + 2\pi$

$y' - y \cdot \cot x = \cot x$

$y' = y \cdot \cot x$

$y \neq 0$

$\int \frac{1}{y} dy = \int \cot x dx$

$\ln|y| = \ln|\sin x| + c$

$|y| = |\sin x| \cdot e^c$

$y = k \cdot \sin x$   $k \in \mathbb{R}$

$k' \sin x + k \cos x - k \sin x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\cos x}{\sin x}$

$k' = \frac{\cos x}{\sin^2 x}$

$k = \frac{-1}{\sin x} + d$   $d \in \mathbb{R}$

paž  $y = \left( \frac{-1}{\sin x} + d \right) \sin x = -1 + d \cdot \sin x$

lepeni v  $0 + 2\pi$

stepeno spojite.

$y = \begin{cases} -1 + d_1 \sin x & x \in (-\frac{\pi}{2}, 0) \\ -1 & x = 0 \\ -1 + d_2 \sin x & x \in (0, \frac{\pi}{2}) \end{cases}$

Da:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 + d_1 \cos x = -1 + d_1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = \lim_{x \rightarrow 0^+} -1 + d_2 \cos x = -1 + d_2$

Znova:

$\rightarrow d_1 = d_2$

$y = \begin{cases} -1 + d_2 \sin x & x \in (-\frac{\pi}{2}, 0) \\ -1 & x = 0 \\ -1 + d_2 \sin x & x \in (0, \frac{\pi}{2}) \end{cases} + 2\pi, \quad d_2 \in \mathbb{R}$

toto je obecné řešení zkrácené LDR, nyní nalezneme obecné řešení úplné LDR

$$y = C(x) \cdot \sin x$$

derivace bude

$$y' = C'(x) \cdot \sin x + C(x) \cdot \cos x$$

dosadíme do zadání

$$[C'(x) \cdot \sin x + C(x) \cdot \cos x] \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - C(x) \sin x = 1$$

$$C'(x) \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos x} = 1$$

$$C(x) = \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\sin x} + K$$


provedeme dosazení  $C(x)$  do  $y = C(x) \cdot \sin x$  a získáme

$$y = \left(-\frac{1}{\sin x} + K\right) \cdot \sin x$$

$$y = K \cdot \sin x - 1$$

kde  $x \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}, K \in \mathbb{R}$ .

Grafické řešení pro  $K = -5, -3, 0, 3, 5$



Kdybychom vykreslili všechna řešení, pak by křivky vyplnily celou rovinu kromě přímek  $x \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ .

kde  $u(t, c)$  je obecný tvar řešení příslušné homogenní rovnice a  $w(t)$  je jedno partikulární řešení rovnice nehomogenní. Připomeňme, že  $u(t, c) = c \exp(\int h(t) dt)$ . Partikulární řešení nehomogenní rovnice můžeme získat metodou *variace konstanty*. Uvedeme stručně princip této metody, která se používá i při řešení ostatních lineárních diferenciálních rovnic a jejich soustav.

**Metoda variace konstanty** je založena na tom, že existuje řešení nehomogenní rovnice, které má obdobné vyjádření jako má obecný tvar řešení homogenní rovnice  $u(t, c)$ , kde je konstanta  $c$  nahrazena vhodně zvolenou funkcí  $c(t)$ . Řešení nehomogenní rovnice hledáme ve tvaru

$$(4.3) \quad w(t) = c(t)e^{\int h(t) dt}, \quad t \in \mathcal{I}.$$

Dosazením do nehomogenní rovnice dostaneme rovnici

$$c'(t)e^{\int h(t) dt} + c(t)h(t)e^{\int h(t) dt} = h(t)c(t)e^{\int h(t) dt} + q(t)$$

a odtud získáme podmínku pro neznámou funkci  $c(t)$  ve tvaru

$$c'(t) = q(t)e^{-\int h(t) dt}.$$

Je tedy

$$c(t) = \int q(t)e^{-\int h(t) dt} dt$$

a tudíž

$$(4.4) \quad x(t) = x(t, c) = ce^{\int h(t) dt} + e^{\int h(t) dt} \left( \int q(t)e^{-\int h(t) dt} dt \right), \quad t \in \mathcal{I}.$$

V neurčitých integrálech ve vzorci volíme jednu z primitivních funkcí. Obecnost řešení je zohledněna v konstantě  $c$ .

Řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = h(t)x + q(t), \quad x(\tau) = \xi$$

můžeme zapsat obdobným vzorcem. Za primitivní funkce volíme funkce horní meze s počáteční mezí  $\tau$ . Dostaneme vzorec pro řešení ve tvaru

$$(4.5) \quad x(t) = x(t; \tau, \xi) = \xi e^{\int_{\tau}^t h(s) ds} + \int_{\tau}^t e^{\int_s^t h(r) dr} q(s) ds, \quad t \in \mathcal{I}.$$

První sčítanec je řešením homogenní rovnice s počáteční podmínkou  $x(\tau) = \xi$  a druhý je řešením nehomogenní rovnice s nulovou počáteční podmínkou.

#### Řešené úlohy k odstavci 4.

(e)

1. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = -\frac{3}{t}x + \frac{2}{t^3}, \quad x(1) = 3.$$

*Řešení:* Rovnice je nehomogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (4.1) a její řešení má tvar (4.2), kde funkci  $u(t)$  určíme postupem z odst. 3, (vzorec (3.2)) a funkci  $w(t)$  metodou variace konstanty z odst. 4, (vzorec (4.3)).

Příslušná homogenní rovnice je

$$x' = -\frac{3}{t}x, \quad t \in (0, \infty) \text{ nebo } t \in (-\infty, 0),$$

(1e)

tedy pro její řešení  $u(t)$  platí:

$$\int \frac{u'(t)}{u(t)} dt = - \int \frac{3}{t} dt \Rightarrow \ln |u(t)| = -3 \ln |t| + \ln c^*,$$

tedy

$$u(t, c) = \frac{c}{t^3}, \quad t \in (-\infty, 0) \text{ nebo } t \in (0, \infty).$$

Řešení  $w(t)$  nehomogenní rovnice budeme hledat podle (4.3) ve tvaru

$$w(t) = \frac{c(t)}{t^3}, \quad t \in (-\infty, 0) \text{ nebo } t \in (0, \infty).$$

Po dosazení za  $w(t)$  a  $w'(t)$  do řešené rovnice dostaneme:

$$\begin{aligned} w(t) &= \frac{c(t)}{t^3}, \quad w'(t) = \frac{c'(t)}{t^3} - 3 \frac{c(t)}{t^4} \Rightarrow \\ \frac{c'(t)}{t^3} - 3 \frac{c(t)}{t^4} &= -\frac{3c(t)}{t^3} + \frac{2}{t^3} \Rightarrow c'(t) = 2 \Rightarrow c(t) = 2t, \end{aligned}$$

tedy

$$w(t) = \frac{2}{t^2}, \quad t \in (-\infty, 0) \text{ nebo } t \in (0, \infty).$$

Dosazením do vzorce (4.2) dostaneme vzorec pro obecné řešení

$$\underline{x(t, c) = \frac{c}{t^3} + \frac{2}{t^2}, \quad t \in (-\infty, 0) \text{ nebo } t \in (0, \infty).}$$

Pro řešení příslušné Cauchyovy úlohy dostaneme podmínku:

$$t = 1 \text{ a } x = 3 \Rightarrow 3 = c + 2 \Rightarrow c = 1.$$

Je tedy

$$\underline{x(t) = x(t; 1, 3) = \frac{1}{t^3} + \frac{2}{t^2}, \quad t \in (0, \infty).}$$

2. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = x \operatorname{tg} t + \frac{1}{\cos t}, \quad x(0) = 2.$$

*Řešení:* Rovnice je nehomogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (4.1) a její řešení má tvar (4.2), kde funkci  $u(t)$  určíme postupem z odst. 3, (vzorec (3.2)) a funkci  $w(t)$  metodou variace konstanty z odst. 4, (vzorec (4.3)). Funkce  $\operatorname{tg} t$  a  $\frac{1}{\cos t}$  jsou spojité v intervalech  $((2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2})$ ,  $k$  je celé číslo, a v nich bude mít rovnice řešení.

Příslušná homogenní rovnice je

$$x' = x \operatorname{tg} t,$$

pro její řešení  $u(t)$  platí:

$$\int \frac{u'(t)}{u(t)} dt = \int \operatorname{tg} t dt \Rightarrow \ln |u(t)| = -\ln |\cos t| + \ln c^* = \ln \frac{c^*}{|\cos t|}$$

tedy

$$u(t, c) = \frac{c}{\cos t}, \quad t \in ((2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2}), \quad k \text{ je celé číslo.}$$



Řešení  $w(t)$  nehomogenní rovnice budeme hledat podle (4.3) ve tvaru

$$w(t) = \frac{c(t)}{\cos t}.$$

Po dosazení za  $w(t)$  a  $w'(t)$  do řešené rovnice dostaneme:

$$w(t) = \frac{c(t)}{\cos t}, \quad w'(t) = \frac{c'(t)}{\cos t} + \frac{c(t) \sin t}{\cos^2 t},$$
$$\frac{c'(t)}{\cos t} + \frac{c(t) \sin t}{\cos^2 t} = \frac{c(t) \sin t}{\cos t \cos t} + \frac{1}{\cos t} \Rightarrow c'(t) = 1$$

tedy

$$c(t) = t \Rightarrow w(t) = \frac{t}{\cos t}, \quad t \in ((2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2}), \quad k \text{ je celé číslo.}$$

Dosazením do vzorce (4.2) dostaneme vzorec pro obecné řešení

$$x(t, c) = \frac{c}{\cos t} + \frac{t}{\cos t}, \quad t \in ((2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2}), \quad k \text{ je celé číslo.}$$

Pro řešení příslušné Cauchyovy úlohy dostaneme z počáteční podmínky

$$t = 0, \quad x = 2 \Rightarrow 2 = c$$

je tedy

$$x(t) = x(t; 0, 1) = \frac{2+t}{\cos t}, \quad t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

3. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = x + e^t, \quad x(2) = -3.$$

*Řešení:* Rovnice je nehomogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (4.1) a její řešení má tvar (4.2), kde funkci  $u(t)$  určíme postupem z odst. 3, (vzorec (3.2)) a funkci  $w(t)$  metodou variace konstanty z odst. 4, (vzorec (4.3)). Rovnice je ovšem také lineární diferenciální rovnicí s konstantním koeficientem tvaru (5.1) se speciální pravou stranou tvaru (5.4). Řešení homogenní rovnice je dáno vzorcem (5.2) a funkci  $w(t)$  lze najít odhadem podle (5.7). Zde uvedeme obecný postup řešení a můžete jej porovnat s úlohami v odstavci 5.

Příslušná homogenní rovnice je

$$x' = x, \quad t \in \mathbb{R},$$

pro její řešení  $u(t)$  platí:

$$\int \frac{u'(t)}{u(t)} dt = \int 1 dt \Rightarrow \ln |u(t)| = t + \ln c^*,$$

tedy

$$u(t, c) = ce^t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Řešení  $w(t)$  nehomogenní rovnice budeme hledat podle (4.3) ve tvaru

$$w(t) = c(t)e^t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Po dosazení za  $w(t)$  a  $w'(t)$  do řešené rovnice dostaneme:

$$w(t) = c(t)e^t, \quad w'(t) = c'(t)e^t + c(t)e^t,$$

(14)

$$c'(t)e^t + c(t)e^t = c(t)e^t + e^t \Rightarrow c' = 1 \Rightarrow c(t) = t$$

tedy

$$w(t) = te^t \in \mathbb{R}.$$

Dosazením do vzorce (4.2) dostaneme vzorec pro obecné řešení

$$\underline{x(t, c) = ce^t + te^t, t \in \mathbb{R}.$$

Pro řešení příslušné Cauchyovy úlohy dostaneme z počáteční podmínky

$$t = 2, x = -3 \Rightarrow -3 = ce^2 + 2e^2 \Rightarrow c = -3e^{-2} - 2$$

je tedy

$$\underline{x(t) = x(t; 2, -3) = (t - 3e^{-2} - 2)e^t, t \in \mathbb{R}.$$

#### Neřešené úlohy k odstavci 4.

1. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = -\frac{4t}{t^2+1}x + \frac{1}{t^2+1}, \quad x(0) = -3.$$

$$[x(t, c) = \frac{c}{(t^2+1)^2} + \frac{t^3+t}{3(t^2+1)^2}, x(t) = x(t; 0, -3) = \frac{-3}{(t^2+1)^2} + \frac{t^3+t}{3(t^2+1)^2}, t \in \mathbb{R}]$$

2. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = -2tx + 2te^{-t^2}, \quad x(1) = 4.$$

$$[x(t, c) = ce^{-t^2} + t^2e^{-t^2}, x(t) = x(t; 1, 4) = (4e - 1 + t^2)e^{-t^2}, t \in \mathbb{R}]$$

3. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = \frac{2}{t}x + \frac{t-1}{t}, \quad x(1) = 5.$$

$$[x(t, c) = ct^2 + \frac{1}{2}t - t, t \in (0, \infty) \text{ nebo } t \in (-\infty, 0), x(t) = x(t; 1, 5) = \frac{11}{2}t^2 + \frac{1}{2}t - t, t \in (0, \infty)]$$

4. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = -t^2x + t^2, \quad x(0) = 1.$$

$$[x(t, c) = 1 + ce^{-\frac{1}{3}t^3}, x(t) = x(t; 0, 1) = 1, t \in (-\infty, \infty)]$$

5. *Úloha:* Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy

$$x' = \frac{1}{t}x + \frac{3}{t}, \quad x(1) = 2.$$

$$[x(t, c) = \frac{c}{t} + 3, t \in (-\infty, 0) \text{ nebo } (0, \infty), x(t) = x(t; 1, 2) = 3 - \frac{1}{t}, t \in (0, \infty)]$$

$$\ln|y| = -\int P(x) dx + \ln C$$

Řešení upravíme využitím pravidla o skládání vzájemně inverzních funkcí a pravidel pro počítání s logaritmy:

$$\ln|y| = \ln e^{-\int P(x) dx} + \ln C$$

$$\ln|y| = \ln C e^{-\int P(x) dx}$$

$$y = C e^{-\int P(x) dx}, \quad (2)$$

což je předpokládaný tvar řešení. Je to část řešení, která odpovídá zkrácené rovnici.

Je zřejmé, že výjimečné řešení lineární diferenciální rovnice nemá, protože řešení  $y = 0$  (vyplyvající z podmínky  $y \neq 0$ ) dostaneme dosazením za  $C = 0$  do vztahu (2).

Pravou stranu  $Q(x)$  do řešení zabudujeme následujícím postupem.

- II. Druhý krok se nazývá **variací (změna) konstanty**. V obecném řešení (2) bude místo konstanty  $C$  funkce proměnné  $x$ :  $C = C(x)$

Dosadíme za ni do (2):  $y = C(x)e^{-\int P(x) dx}$

Derivujeme součin:  $y' = C'(x)e^{-\int P(x) dx} + C(x)e^{-\int P(x) dx} \cdot (-P(x))$

Za  $y$  a  $y'$  dosadíme do zadání:

$$C'(x)e^{-\int P(x) dx} + C(x)e^{-\int P(x) dx} (-P(x)) + P(x)C(x)e^{-\int P(x) dx} = Q(x)$$

Následuje kontrolní krok: sčítance s  $C(x)$  se vzájemně musí vyrušit, zůstává pouze sčítanec s derivací  $C'(x)$ .

$$C'(x)e^{-\int P(x) dx} = Q(x), \quad \text{upravíme} \quad C'(x) = Q(x)e^{\int P(x) dx}$$

$$\text{a odtud vypočítáme integrační konstantu} \quad C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + K.$$

- III. Obecné řešení zadané lineární diferenciální rovnice získáme dosazením vypočítané konstanty do předpokládaného tvaru řešení (2):

$$y = \left( \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + K \right) e^{-\int P(x) dx}.$$

*(1g)* **Příklad 7.10:** Vyřešte diferenciální rovnici  $y' - \frac{5y}{x} = x^2$ ,  $x \neq 0$ .

**Řešení:** Budeme dodržovat výše uvedený postup I. – III. uvedený v 7.2.4:

- I. Vyřešíme příslušnou zkrácenou rovnici  $y' - \frac{5y}{x} = 0$ ,

která je vždy separovatelná. Vyřešíme ji proto postupem uvedeným v 7.2.2.

$$\frac{dy}{dx} - \frac{5y}{x} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5y}{x} \quad | dx$$

$$dy = \frac{5y}{x} dx \quad | \frac{1}{y}, \quad y \neq 0$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{5}{x} dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = 5 \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln|y| = 5 \ln|x| + \ln C$$

Řešení upravíme využitím pravidel pro počítání s logaritmy:

$$\ln|y| = \ln|x^5| + \ln C$$

$$\ln|y| = \ln C|x^5|$$

$$y = Cx^5, \tag{3}$$

což je předpokládaný tvar řešení. Je to část řešení, která odpovídá levé straně rovnice.

Je zřejmé, že výjimečné řešení lineární diferenciální rovnice nemá, protože řešení  $y = 0$  (vyplývající z podmínky  $y \neq 0$ ) dostaneme dosazením za  $C = 0$  do vztahu (3).

Pravou stranu  $Q(x) = x^2$  do řešení zabudujeme následujícím postupem.

- II. Druhý krok se nazývá variace (změna) konstanty. Obecné řešení (3) bude mít místo konstanty  $C$  funkci proměnné  $x$ :  $C = C(x)$ .

Dosadíme za ni do (3):  $y = C(x)x^5$ ,

derivujeme součin:  $y' = C'(x)x^5 + C(x) \cdot 5x^4$ .

Za  $y$  a  $y'$  dosadíme do zadání  $C'(x)x^5 + C(x) \cdot 5x^4 - \frac{5C(x)x^5}{x} = x^2$

Následuje kontrolní krok: sčítance s  $C(x)$  se vzájemně musí odečíst, zůstává pouze sčítanec s derivací  $C'(x)$ :

$$C'(x)x^5 = x^2,$$

upravíme  $C'(x) = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$

a odtud vypočítáme integrační konstantu  $C(x) = \int C'(x) dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} + K = -\frac{1}{2x^2} + K$ .

- III. Obecné řešení zadané lineární diferenciální rovnice získáme dosazením vypočítané konstanty do předpokládaného tvaru řešení (3):

$$y = \left(-\frac{1}{2x^2} + K\right)x^5,$$

po úpravě

$$y = Kx^5 - \frac{x^3}{2}$$

Je zřejmé, že obecné řešení tvoří dvě části:

$$y = y_0 + \hat{y},$$

kde  $y_0 = Kx^5$  je řešení zkrácené rovnice,

$$\hat{y} = -\frac{x^3}{2} \text{ je partikulární integrál odpovídající pravé straně } Q(x).$$

**Příklad 7.11:** Vyřešte diferenciální rovnici  $y' + xy = x$ , platí-li  $y(0) = 4$ .

*Řešení:* Budeme dodržovat uvedený postup I. – III. uvedený v příkladu 7.10:

- I. Vyřešíme příslušnou zkrácenou rovnici  $y' + xy = 0$ , která je vždy separovatelná, postupem uvedeným v 7.2.2.

$$\frac{dy}{dx} + xy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -xy \quad | dx$$

*Poznámka:* Uvedený příklad  $y' + xy = x$  vyřešíme i jiným postupem:

Stačí, když provedeme jednoduchou úpravu  $y' = x - xy \Rightarrow y' = x(1 - y)$ .

Získáme separovatelnou rovnici, kterou vyřešíme postupem uvedeným v 7.2.2.

$$\frac{dy}{dx} = x(1 - y) \quad | dx$$

$$dy = x(1 - y)dx \quad | \frac{1}{1 - y}, \quad y \neq 1$$

$$\frac{dy}{1 - y} = x dx$$

$$-\int \frac{dy}{1 - y} = \int x dx$$

$-\ln|1 - y| = \frac{x^2}{2} + \ln C$ , což je obecné řešení, které můžeme (ale nemusíme) dále upravit:

$$\ln|(1 - y)^{-1}| = \ln e^{\frac{x^2}{2}} + \ln C$$

$$(1 - y)^{-1} = C e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$\frac{1}{1 - y} = C e^{\frac{x^2}{2}} \Rightarrow 1 - y = \frac{1}{C e^{\frac{x^2}{2}}} \Rightarrow \boxed{y = 1 + K e^{-\frac{x^2}{2}}}, \quad \text{kde } K = -\frac{1}{C}$$

Z tohoto příkladu je zřejmé, že diferenciální rovnice nemusí být pouze jednoho typu. Pokud splňuje současně podmínky pro více typů, volíme vždy jednodušší postup řešení (v uvedeném příkladě je to řešení separovatelné diferenciální rovnice).

*Příklad 7.12:* Vyřešte diferenciální rovnici  $y' - \frac{3x^2 y}{1 + x^3} = 1 + x^3$ ,  $x \neq -1$ , platí-li  $y(1) = -1$ .

*Řešení:* Budeme dodržovat uvedený postup I – III uvedený v příkladu 7.10:

I. Vyřešíme příslušnou zkrácenou rovnici  $y' - \frac{3x^2 y}{1 + x^3} = 0$ ,

která je vždy separovatelná, postupem uvedeným v 7.2.2.

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3x^2 y}{1 + x^3} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 y}{1 + x^3} \quad | dx$$

$$dy = \frac{3x^2 y}{1 + x^3} dx \quad | \frac{1}{y}, \quad y \neq 0$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{3x^2}{1 + x^3} dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{3x^2}{1 + x^3} dx$$

$$\ln|y| = \ln|1 + x^3| + \ln C$$

Řešení upravíme využitím pravidel pro počítání s logaritmy:

$$\ln|y| = \ln C|1+x^3|$$

$$y = C(1+x^3), \text{ což je předpokládaný tvar řešení.} \quad (5)$$

II. Integrační konstantu  $C$  budeme považovat za funkci proměnné  $x$ :  $C = C(x)$

$$\text{Dosadíme za ni do (5):} \quad y = C(x) \cdot (1+x^3)$$

$$\text{Derivujeme součin:} \quad y' = C'(x) \cdot (1+x^3) + C(x) \cdot 3x^2$$

$$\text{Za } y \text{ a } y' \text{ dosadíme do zadání:} \quad C'(x) \cdot (1+x^3) + 3C(x) \cdot x^2 - \frac{3x^2 C(x) \cdot (1+x^3)}{1+x^3} = 1+x^3$$

Následuje kontrolní krok: sčítance s  $C(x)$  se vzájemně vyruší, zůstává pouze sčítanec

$$\text{s derivací } C'(x): \quad C'(x) \cdot (1+x^3) = 1+x^3, \quad \text{po vykrácení } C'(x) = 1$$

$$\text{a vypočítáme integrační konstantu} \quad C(x) = \int C'(x) dx = \int 1 dx = x + K.$$

III. Obecné řešení zadané lineární diferenciální rovnice získáme dosazením vypočítané konstanty do předpokládaného tvaru řešení (5):

$$y = (x+K)(1+x^3).$$

Z podmínky  $y(1) = -1$  vyplývá, že hledáme partikulární řešení, které prochází bodem  $P[1, -1]$ . Po dosazení do obecného řešení vypočítáme hodnotu integrační konstanty:

$$-1 = (1+K)(1+1^3) \quad \text{a odtud vypočítáme} \quad K = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{Partikulární řešení:} \quad y = (x - \frac{3}{2})(1+x^3), \text{ po úpravě} \quad y = x^4 - \frac{3}{2}x^3 + x - \frac{3}{2}.$$

*Poznámka:* Existuje řada dalších typů diferenciálních rovnic I. řádu, které nejsou zařazeny do tohoto stručného přehledu.

### 7.3. Diferenciální rovnice II. řádu

Ve stručném přehledu se budeme zabývat výhradně řešením lineárních diferenciálních rovnic II. řádu s konstantními koeficienty.

**Obecný tvar:**  $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = Q(x)$ , kde  $a_2 \neq 0$ ,  $a_1$ ,  $a_0$  jsou reálné konstanty.

$$\text{Dělíme je do dvou typů: zkrácená pro } Q(x) = 0: \quad a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

$$\text{úplná pro } Q(x) \neq 0: \quad a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = Q(x)$$

Řešením lineárních diferenciálních rovnic II. řádu se zabýval švýcarský matematik Leonhard Euler.

#### 7.3.1. Zkrácená rovnice

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

Euler zjistil, že řešení má tvar  $y = e^{rx}$ , kde  $r$  je konstanta, zvaná charakteristický kořen.

Pro derivace platí  $y' = r e^{rx}$ ,  $y'' = r^2 e^{rx}$ .

$$\text{Dosadíme do zadání} \quad a_2 r^2 e^{rx} + a_1 r e^{rx} + a_0 e^{rx} = 0,$$

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y &= xy', \\ \int \frac{dy}{y} &= \int \frac{dx}{x}, \\ \ln |y| &= \ln |x| + C_1, \\ y &= cx.\end{aligned}$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y &= c(x)x, \\ c(x)x &= xc'(x)x + xc(x) - x^2 \cos x, \\ c'(x) &= \cos x, \\ c(x) &= \sin x + c_2, \\ y(x) &= (c_2 + \sin x)x.\end{aligned}$$

(4i)

**Příklad 3.3.** Řešte rovnici  $xy' + (x+1)y = 3x^2e^{-x}$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}xy' + (x+1)y &= 0, \\ \int \frac{dy}{y} &= - \int \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx, \\ \ln |y| &= -x - \ln x + c_1, \\ y(x) &= e^{-x} \frac{c}{x}.\end{aligned}$$

$$x \in (-\infty, 0)$$

$$x \in (0, \infty)$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{c(x)}{x} e^{-x}, \\ c'(x)e^{-x} - c(x)e^{-x} - \frac{c(x)}{x}e^{-x} + ce^{-x} + \frac{c}{x}e^{-x} &= 3x^2e^{-x}, \\ c'(x) &= 3x^2 \Rightarrow c(x) = x^3 + c_2, \\ y(x) &= \left(x^2 + \frac{c_2}{x}\right) e^{-x}.\end{aligned}$$

**Příklad 3.4.** Řešte rovnici  $y' = \frac{y}{3x-y^2}$ .

Řešení: Rovnici si upravíme do tvaru

$$\frac{3x - y^2}{y} \frac{dy}{dx} = 1,$$

což odpovídá rovnici

$$x'(y) = \frac{3x}{y} - y.$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= c(x)e^{-x^2}, \\c'(x)e^{-x^2} + c(x)(-2x)e^{-x^2} + 2xc(x)e^{-x^2} &= 2xe^{-x^2}, \\c'(x) = 2x &\Rightarrow c(x) = x^2 + c_2, \\y(x) &= (x^2 + c_2)e^{-x^2}.\end{aligned}$$

(1j)

**Příklad 3.7.** Řešte rovnici  $xy' + 2y = 3x$ ,  $y(0) = 0$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}xy' + 2y &= 0, \\ \int \frac{dy}{y} &= -\frac{2}{x}dx, \\ \ln|y| &= -2\ln|x| + c_1, \\ y &= \frac{c}{x^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &\in (-\infty, 0) \\ x &\in (0, \infty)\end{aligned}$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{c(x)}{x^2}, \\ x\frac{c'(x)}{x^2} + (-2)x\frac{c(x)}{x^3} + \frac{2c(x)}{x^2} &= 3x, \\ c'(x) = 3x^2 &\Rightarrow c(x) = x^3 + c_2, \\ y(x) &= \frac{c_2}{x^2} + x.\end{aligned}$$

Z počáteční podmínky

$$c_2 = 0 \Rightarrow y(x) = x.$$

(1k)

**Příklad 3.8.** Řešte rovnici  $y' + y \cos x = \sin x \cos x$ ,  $y(0) = 1$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y' + y \cos x &= 0, \\ \int \frac{dy}{y} &= -\int \cos x dx, \\ \ln|y| &= -\sin x + c_1, \\ y &= ce^{-\sin x}.\end{aligned}$$



(12)

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}
y(x) &= c(x)e^{-\sin x}, \\
c'(x)e^{-\sin x} + (-\cos x)c(x)e^{-\sin x} + c(x)e^{-\sin x} \cos x &= \sin x \cos x, \\
c'(x) &= \sin x \cos x e^{\sin x}, \\
c(x) &= \int \sin x \cos x e^{\sin x} dx = \int te^t dt = (At + B)e^t, \\
A + At + B &= t \Rightarrow A = 1, B = -1, \\
c(x) &= (t - 1)e^t + c_2 = (\sin x - 1)e^{\sin x} + c_2, \\
y(x) &= \sin x - 1 + c_2 e^{-\sin x}, \\
y(0) = 1 &\Rightarrow 1 = -1 + c_2 \Rightarrow c_2 = 2, \\
y(x) &= \sin x - 1 + 2e^{-\sin x}.
\end{aligned}$$

(14)

**Příklad 3.9.** Řešte rovnici  $(1 - x^2)y' + xy = 1$ ,  $y(0) = 1$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

pro  $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$

$$\begin{aligned}
(1 - x^2)y' + xy &= 0, \\
\int \frac{dy}{y} &= \int \frac{x}{x^2 - 1} dx, \\
\ln |y| &= \frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + c_1, \\
y(x) &= c\sqrt{|x^2 - 1|}.
\end{aligned}$$

Řešení proto budeme uvažovat ve tvaru (pro výraz uvnitř odmocniny bereme v úvahu počáteční podmínku)  $y(x) = c(x)\sqrt{1 - x^2}$ . Variace konstanty:

$$\begin{aligned}
(1 - x^2)c'(x)\sqrt{1 - x^2} + (1 - x^2)c(x)\frac{1/2(-2x)}{\sqrt{1 - x^2}} + xc(x)\sqrt{1 - x^2} &= 1, \\
c'(x) &= (1 - x^2)^{-\frac{3}{2}}, \\
c(x) &= \int \frac{1}{(1 - x^2)^{3/2}} dx = |x = \sin t, \quad dx = \cos t dt| = \int \frac{1}{\cos^2 t} dt = \\
&= \left| u = \operatorname{tg} t, \quad du = \frac{1}{\cos^2 t} dt \right| = \int du = u + c_1 = \\
&= \left| \operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\sqrt{1 - \sin^2 t}} \right| = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} + c_1. \\
c(x) &= x(1 - x^2)^{-1/2} + c_1 \Rightarrow y(x) = x + c_1\sqrt{1 - x^2}.
\end{aligned}$$

\*

Z počáteční podmínky:

$$1 = c_1 \Rightarrow y(x) = x + \sqrt{1 - x^2}.$$

\* nelze sepsat ; (nelze spj. dodat)

(1m)

**Příklad 3.10.** Řešte rovnici  $y' - y \frac{\cos x}{\sin x} = 2 \sin x$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y' - y \frac{\cos x}{\sin x} &= 0, \\ \int \frac{dy}{y} &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx, \\ \ln |y| &= \ln |\sin x| + c_1, \\ y &= c \sin x.\end{aligned}$$

$x \neq k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= c(x) \sin x, \\ c'(x) \sin x + c(x) \cos x - c(x) \cos x &= 2 \sin x, \\ c(x) &= \int 2 dx = 2x + c_2, \\ y(x) &= (2x + c_2) \sin x.\end{aligned}$$

**Příklad 3.11.** Řešte rovnici  $y' + xy = x$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y' + xy &= 0, \\ \int \frac{dy}{y} &= - \int x dx, \\ \ln |y| &= -\frac{x^2}{2} + c_1, \\ y &= ce^{-\frac{x^2}{2}}.\end{aligned}$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= c(x)e^{-\frac{x^2}{2}}, \\ c'(x)e^{-\frac{x^2}{2}} - c(x)xe^{-\frac{x^2}{2}} + xc(x)e^{-\frac{x^2}{2}} &= x, \\ c'(x) &= xe^{\frac{x^2}{2}}, \\ c(x) &= \int xe^{\frac{x^2}{2}} dx \Big| u = \frac{x^2}{2}, \quad du = x dx \Big| = \int e^u du = e^u = e^{\frac{x^2}{2}} + c_2, \\ y(x) &= 1 + c_2e^{-\frac{x^2}{2}}.\end{aligned}$$

**Příklad 3.12.** Řešte rovnici  $y' = \frac{y-1}{x(x-1)}$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y' &= \frac{y}{x(x-1)}, \\ \int \frac{dy}{y} &= \int \frac{1}{x(x-1)} dx = \int \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx, \\ \ln|y| &= \ln \frac{x-1}{x} + c_1, \\ y &= c \frac{x-1}{x}.\end{aligned}$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= c(x) \frac{x-1}{x}, \\ c'(x) \frac{x-1}{x} + c(x) \left( \frac{x-1}{x} \right)' &= \frac{c(x)}{x^2} - \frac{1}{(x-1)x}, \\ c'(x) \frac{x-1}{x} + c(x) \left( \frac{x-(x-1)}{x^2} \right)' &= \frac{c(x)}{x^2} - \frac{1}{(x-1)x}, \\ c'(x) &= -\frac{1}{(x-1)^2}, \\ c(x) &= \frac{1}{x-1} + c_2, \\ y(x) &= \frac{1}{x} + c_2 \frac{x-1}{x} = 1 + c_3 \frac{x-1}{x}.\end{aligned}$$

(1n)

**Příklad 3.13.** Řešte rovnici  $y' + 3y = e^{2x}$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y' + 3y &= 0, \\ \int \frac{dy}{y} &= - \int 3 dx, \\ \ln|y| &= -3x + c_1, \\ y &= ce^{-3x}.\end{aligned}$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}y(x) &= c(x)e^{-3x}, \\ c'(x)e^{-3x} + c(x)e^{-3x}(-3) + 3c(x)e^{-3x} &= e^{2x}, \\ c'(x) &= e^{5x}, \\ c(x) &= \frac{1}{5}e^{5x} + c_2, \\ y(x) &= \frac{1}{5}e^{2x} + c_2e^{-3x}.\end{aligned}$$

(1c)

**Příklad 3.14.** Řešte rovnici  $y' + y = \cos x$ .

(1c)

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}
y' + y &= 0, \\
\int \frac{dy}{y} &= - \int 1 dx, \\
\ln |y| &= -x + c_1, \\
y &= ce^{-x}.
\end{aligned}$$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}
y(x) &= c(x)e^{-x}, \\
c'(x)e^{-x} + c(x)e^{-x}(-1) + c(x)e^{-x} &= \cos x, \\
c(x) &= \int e^x \cos x dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + c_2, \\
y(x) &= \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) + c_2e^{-x}.
\end{aligned}$$

(1p)

Příklad 3.15. Řešte rovnici  $xy' - \frac{y}{x+1} = x$ .

Řešení: Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}
xy' &= \frac{y}{x+1}, \\
\int \frac{dy}{y} &= \int \frac{1}{(x+1)x} dx = \int \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx, \\
\ln |y| &= \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + c_1, \\
y &= c \frac{x}{x+1}.
\end{aligned}$$

$x \neq -1$

pro  $x \in (-\infty, -1)$   
 $(-1, 0)$   
 $(0, \infty)$

Variace konstanty:

$$\begin{aligned}
y(x) &= c(x) \frac{x}{x+1}, \\
xc'(x) \frac{x}{x+1} + c(x)x \frac{x+1-x}{(x+1)^2} - \frac{c(x)x}{(x+1)^2} &= x, \\
c'(x) &= \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x}, \\
c(x) &= x + \ln |x| + c_2, \\
y(x) &= \frac{x}{x+1}(x + \ln |x| + c_2).
\end{aligned}$$

šlepat u 0 nelze

Příklad 3.16. Řešte rovnici  $(2e^y - x)y' = 1$ .

Řešení: Použijeme triku, že hledáme řešení  $x(y)$  jako funkce od  $y$ .

$$x' = -x + 2e^y.$$

## Cvičení 1

### LINEÁRNÍ ROVNICE PRVNÍHO ŘÁDU

(1g)

1. Najděte řešení Cauchyovy úlohy  $x' + x \operatorname{tg} t = \cos^2 t$ , které vyhovuje podmínce  $x(2\pi) = 2$ .

*Řešení:*

Máme nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce  $h(t) = \operatorname{tg} t$  a  $q(t) = \cos^2 t$  jsou definované a spojité v intervalech  $\left(\frac{2k-1}{2}\pi, \frac{2k+1}{2}\pi\right)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Protože je počáteční podmínka

definována v bodě  $t_0 = 2\pi$ . Budeme hledat řešení v intervalu  $t \in \left(\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi\right)$ .

Nejprve určíme řešení příslušné homogenní rovnice

$$u' + u \operatorname{tg} t = 0.$$

To je  $u(t) = C \cos t$ . Jedno partikulární řešení nehomogenní rovnice najdeme variací konstanty. Řešení budeme hledat ve tvaru  $w(t) = C(t) \cos t$ . Po dosazení do původní rovnice dostaneme  $C'(t) = \cos t$ , neboli  $C(t) = \sin t$ . Obecné řešení nehomogenní rovnice je  $x(t) = C \cos t + \sin t \cos t$ . Z podmínky  $x(2\pi) = 2$  plyne,  $C = 2$ . Řešení Cauchyovy úlohy je tedy

$$x(t) = (2 + \sin t) \cos t \quad \text{pro } t \in \left(\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi\right).$$

(1r)

2. Najděte řešení Cauchyovy úlohy  $x' - 2tx = t - t^3$ , které vyhovuje podmínce  $x(1) = 1$ .

*Řešení:*

Máme najít řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice prvního řádu. Proto nejprve vyřešíme příslušnou homogenní rovnici  $u' = 2tu$ . Standardním způsobem získáme její řešení  $u = Ce^{t^2}$ . Řešení nehomogenní rovnice  $w(t)$  získáme variací konstanty, tj. předpokládáme, že  $w(t) = C(t)e^{t^2}$ .

Po dosazení do dané diferenciální rovnice dostaneme  $C'(t) = (t - t^3)e^{-t^2}$ , čili  $C(t) = \frac{t^2}{2}e^{-t^2}$ .

Tedy hledané řešení nehomogenní rovnice je  $w(t) = \frac{t^2}{2}$  a obecné řešení dané diferenciální rovnice je

$x(t) = Ce^{t^2} + \frac{t^2}{2}$ . Z počáteční podmínky plyne rovnost  $x(1) = 1 = Ce + \frac{1}{2}$ . Tedy  $C = \frac{1}{2e}$ . Když dosadíme tuto konstantu do obecného řešení, získáme hledané řešení Cauchyovy úlohy

$$x(t) = \frac{e^{t^2-1} + t^2}{2}.$$

(1s)

3. Najděte řešení Cauchyovy úlohy  $x' + \frac{2x}{t^2-1} = t$ , které vyhovuje podmínce  $x(0) = 1$ .

*Řešení:*

Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce  $h(t) = -\frac{2}{t^2-1}$  a  $q(t) = t$  jsou definované a spojité v intervalech  $(-\infty, -1)$ ,  $(-1, 1)$  a  $(1, +\infty)$ . Protože počáteční podmínka je dána v bodě  $t_0 = 0$ , který leží v intervalu  $(-1, 1)$ , budeme hledat řešení rovnice v tomto intervalu.

Nejprve najdeme obecné řešení příslušné homogenní rovnice  $u' + \frac{2u}{t^2-1} = 0$ . Standardní metodou dostaneme

$$\frac{u'}{u} = \frac{2}{1-t^2} = \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t}$$

(15)

a po integraci získáme  $u(t) = C \frac{1+t}{1-t}$ .

Řešení  $w(t)$  nehomogenní rovnice budeme hledat ve tvaru  $w(t) = C(t) \frac{1+t}{1-t}$ . Po dosazení do původní rovnice dostaneme

$$C'(t) = \frac{t(1-t)}{1+t} = -t + 2 - \frac{2}{1+t}, \quad \text{neboli} \quad C(t) = -\frac{1}{2}(2-t)^2 - 2\ln(1+t).$$

Partikulární řešení  $w(t)$  nehomogenní rovnice je tedy  $w(t) = \frac{1+t}{1-t} \left( -\frac{(t-2)^2}{2} - 2\ln(1+t) \right)$  a obecné řešení dané diferenciální rovnice je

$$x(t) = \frac{1+t}{1-t} \left( C - \frac{(2-t)^2}{2} - 2\ln(1+t) \right).$$

Z podmínky  $x(0) = 1 = C - 2$  plyne, že  $C = 3$ , a tedy řešení dané Cauchyovy úlohy je

$$x(t) = \frac{1+t}{1-t} \left( 3 - \frac{(2-t)^2}{2} - 2\ln(1+t) \right) \quad \text{pro } t \in (-1, 1).$$

4. Najděte řešení Cauchyovy úlohy  $x' - 2x = t^2$ , které vyhovuje podmínce  $x(-1) = 0$ .

*Řešení:*

Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Tato rovnice je speciálního typu. Funkce  $h(t) = 2$  je konstantní. Proto lze hledat řešení příslušné homogenní rovnice  $u' - 2u = 0$  ve tvaru  $u = e^{\lambda t}$ . Jestliže tento předpoklad dosadíme do homogenní rovnice, dostaneme  $\lambda - 2 = 0$ , která se nazývá *charakteristická rovnice*. Její řešení je  $\lambda = 2$ . Tedy obecné řešení homogenní rovnice je  $u(t) = Ce^{2t}$ .

Také partikulární řešení nehomogenní rovnice lze v tomto případě najít bez integrace. Protože pravá strana  $q(t) = t^2$  je polynom stupně 2 a  $\mu = 0$  není kořenem charakteristické rovnice, lze partikulární řešení nehomogenní rovnice hledat ve tvaru  $w = at^2 + bt + c$ , kde  $a, b$  a  $c$  jsou konstanty. Dosazením do původní rovnice a srovnáním koeficientů u různých mocnin proměnné  $t$ , dostaneme soustavu rovnic  $-2a = 1$ ,  $2a - 2b = 0$  a  $b - 2c = 0$ , která má řešení  $a = -\frac{1}{2}$ ,  $b = -\frac{1}{2}$  a  $c = -\frac{1}{4}$ . Proto je partikulární

řešení nehomogenní rovnice rovno  $w(t) = -\frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} - \frac{1}{4}$  a její obecné řešení je  $x(t) = Ce^{2t} - \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} - \frac{1}{4}$ .

Z počáteční podmínky plyne  $x(-1) = 0 = Ce^{-2} - \frac{1}{4}$ , tedy  $C = \frac{e^2}{4}$ . Z toho dostáváme hledané řešení Cauchyho úlohy

$$x(t) = \frac{1}{4}(e^{2(t+1)} - 2t^2 - 2t - 1).$$

5. Najděte řešení Cauchyovy úlohy  $x' + 4x = te^{-4t} + 4t - 3$ , které vyhovuje podmínce  $x(0) = 2$ .

*Řešení:*

Máme opět řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu s konstantními koeficienty. Její charakteristická rovnice  $\lambda + 4 = 0$  má řešení  $\lambda = -4$ , a tedy obecné řešení homogenní rovnice je  $u(t) = Ce^{-4t}$ . Partikulární řešení nehomogenní rovnice budeme hledat ve tvaru  $w(t) = w_1(t) + w_2(t)$ , kde  $w_1(t)$  je partikulární řešení rovnice  $w_1' + 4w_1 = te^{-4t}$  a  $w_2$  je partikulární řešení rovnice  $w_2' + 4w_2 = 4t - 3$ . Protože  $\mu = -4$  je řešením charakteristické rovnice, budeme hledat funkci  $w_1$  ve tvaru  $w_1(t) = t(at + b)e^{-4t}$ . Jestliže tento předpoklad dosadíme do rovnice pro  $w_1$ , dostaneme po srovnání koeficientů u různých mocnin proměnné  $t$  soustavu rovnic  $2a = 1$  a  $b = 0$ . Tedy  $w_1(t) = \frac{t^2}{2}e^{-4t}$ . Funkci  $w_2$  budeme hledat ve tvaru  $w_2(t) = At + B$ , protože  $\mu = 0$  není řešení

2  
(a)

$$y' + \frac{1}{x}y = e^{x^2} \quad x \neq 0$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{x}$$

$$\ln|y| = -\ln|x| + k$$

$$|y| = e^k \cdot e^{\ln \frac{1}{x}}$$

$$y = k \cdot \frac{1}{x} \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \quad k' \cdot \frac{1}{x} + k \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x} \cdot k \cdot \frac{1}{x} = e^{x^2}$$

$$k' = x e^{x^2} \quad \text{subst.}$$

$$k = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$$

$$y = \frac{1}{x} \left( \frac{1}{2} e^{x^2} + c \right)$$

(b)

$$y' - y \ln x = x^{x+1}$$

$$x^{x+1} = e^{(x+1) \ln x}$$

$$\boxed{x > 0}$$

•  $y = y \ln x$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \ln x dx \quad \text{Per partes}$$

$$\ln |y| = x \ln x - x + k$$

$$|y| = e^{\ln x^x - x + k}$$

$$y = \underline{k e^{-x} \cdot x^x}$$

•  $y_p = k(x) e^{-x} \cdot x^x = k e^{-x} e^{x \ln x}$

$$k' e^{-x} x^x + k (-e^{-x} x^x + e^{-x} x^x (\ln x + 1)) - k e^{-x} x^x \ln x = x^{x+1}$$

$$\underline{k' e^{-x} x^x = x^{x+1}}$$

$$k' = e^x \cdot x \quad \text{per partes}$$

$$\underline{k = e^x x - e^x + c}$$

allgemein  $y = \underline{(e^x x - e^x + c) e^{-x} \cdot x^x} \quad x \in (0, \infty)$



(2)

$$xy' - 2y = 2x^4 \quad x \in \mathbb{R}$$

$$y' - 2y \cdot \frac{1}{x} = 2x^3 \quad x \neq 0$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x}$$

$$\ln |y| = 2 \ln x + k$$

$$y = kx^2 \quad k \in \mathbb{R}$$

$$k'x^2 + k \cdot 2x - 2kx^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x^3 \quad x > 0$$

$$k' = 2x$$

$$k = x^2 + C_1$$

$$y = (x^2 + C_1)x^2 \quad x > 0$$

pro  $x < 0$  dostaneme

$$y = (x^2 + C_2)x^2$$

no 0 lze slepit,

$$y = \begin{cases} x^2(x^2 + C_2) & x \in (-\infty, 0) \\ x^2(x^2 + C_1) & x \in [0, \infty) \end{cases} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

ma'no no 0 derivaci? lze primo upocitat, lca je spoj.

$$y'_+ = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4x^3 + 2C_1x = 0$$

$$y'_- = \lim_{x \rightarrow 0^-} 4x^3 + 2C_2x = 0$$

Vsechno OK

(d)

$$y' + 3x^2 y = e^{-x^3+x} \sin x$$

$$\frac{y'}{y} = -3x^2$$

$$\ln |y| = -x^3 + c$$

$$y = e^{-x^3} \cdot k \quad k \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

$$e^{-x^3} \cdot k' + k e^{-x^3} (-3x^2) + 3x^2 k e^{-x^3} = e^{-x^3+x} \sin x$$

$$k' = e^x \sin x \quad \text{2x Per partes}$$

$$k = \frac{1}{2} (e^x \sin x - e^x \cos x) + c$$

$$y = e^{-x^3} \left( \frac{1}{2} e^x \sin x - \frac{1}{2} e^x \cos x + c \right) \quad x, c \in \mathbb{R}$$

(e)

$$y'(1+x^2) + \frac{y}{\arctan x} = x^2(1+x^2)$$

$$y' + \frac{y}{\arctan x (1+x^2)} = x^2 \quad \begin{matrix} x \in (-\infty, 0) \\ x \in (0, \infty) \end{matrix}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{-1}{\arctan x (1+x^2)}$$

$$\ln|y| = -\ln|\arctan x| + k$$

$$y = \frac{k}{\arctan x} \quad x \neq 0$$

$$k' \frac{1}{\arctan x} + k \frac{-1}{\arctan^2 x} \cdot \frac{1}{1+x^2} + \frac{k}{\arctan x (1+x^2)} = x^2$$

$$k' = x^2 \arctan x \quad \text{per partes}$$

altern

$$\int x^2 \arctan x = \frac{1}{3} x^3 \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{2x^3}{1+x^2} dx$$

$$u = x^2 \quad v = \arctan x$$

$$u = 1+x^2$$

$$u = \frac{1}{3} x^3 \quad v' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$du = 2x dx$$

$$k = \frac{1}{3} x^3 \arctan x - \frac{1}{6} (1+x^2 - \ln(1+x^2)) + c$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u} du$$

$$= \frac{1}{2} \int \left( 1 - \frac{1}{u} \right) du = \frac{1}{2} (u - \ln u)$$

$$y = \frac{1}{\arctan x} \left[ \frac{1}{3} x^3 \arctan x - \frac{1}{6} (1+x^2 - \ln(1+x^2)) + c \right]$$

x ≠ 0

$$(f) \quad y' + \frac{x}{1+x^2} y = 1$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{-x}{1+x^2}$$

$$\ln|y| = -\frac{1}{2} \ln|1+x^2| + C$$

$$y = k \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad (= k(1+x^2)^{-1/2})$$

$$k' \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + k \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}} \cdot 2x + \frac{xk}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{1+x^2} = 1$$

$$k' = \sqrt{1+x^2}$$

bud' spec. subst.  $y = \sin h \ x$

webo Euler. subst.

$$t = \sqrt{x^2+1} + x$$

par ( $z$  tabulky)

$$x = \frac{t^2-1}{2t}$$

ma'no

$$\int \left(t - \frac{t^2-1}{2t}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \frac{t^2-1}{t^2}\right) dt$$

$$\sqrt{x^2+1} = t - \frac{t^2-1}{2t}$$

$$= \int \frac{2t^2-t^2+1}{2t} \cdot \frac{2t^2-t^2+1}{2t^2} dt$$

$$a \quad dx = \frac{2t \cdot 2t - (t^2-1) \cdot 2}{4t^2} dt$$

$$= \int \frac{(t^2+1) \cdot (t^2+1)}{4t^3} dt = \int \frac{t^4 + 2t^2 + 1}{4t^3} dt = \frac{1}{4} \int t + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^3} dt =$$

$$= \frac{1}{4} \left( \frac{t^2}{2} + 2 \ln t + \frac{-1}{2t^2} \right) \rightarrow$$

$$k = \frac{1}{8} \left( \sqrt{x^2+1} + x \right)^2 + \frac{1}{2} \ln \left( \sqrt{x^2+1} + x \right) - \frac{1}{8} \frac{1}{\left( \sqrt{x^2+1} + x \right)^2} + C$$

$$\text{par } y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \left[ \right.$$

- 11 -

**Písenná zkouška z Matematiky IV pro FSV (F)**  
**LS 2003-2004, 17.9. 2004**

---

**Příklad F1:** Najděte všechna maximální řešení rovnice

$$y' = x\sqrt{y} \quad (10 \text{ bodů}).$$

**Příklad F2:** Najděte všechna maximální řešení rovnice

$$y' + \frac{x}{1+x^2}y = 1. \quad (10 \text{ bodů})$$

**Příklad F3:** Najděte všechna maximální řešení rovnice

$$y''' + y' = x \sin x. \quad (10 \text{ bodů})$$

**Příklad F4:** Najděte všechna maximální řešení rovnice

$$y' = e^{x+y} - 1. \quad (10 \text{ bodů})$$

**Příklad F5:** Najděte všechna  $y^0 \in \mathbb{R}^3$  taková, že maximální řešení  $y$  počáteční úlohy

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = y^0$$

splňuje  $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y(t)}{t} e^{-t} = 0$ . (10 bodů)

**Výsledky**

---

**Příklad F1:**  $y(x) = 0, x \in \mathbb{R}; y(x) = (\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}c)^2, x \in \mathbb{R}, c > 0;$

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, \sqrt{-2c}), \\ (\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}c)^2, & x \in (\sqrt{-2c}, +\infty), \end{cases} \quad c \leq 0;$$

$$y(x) = \begin{cases} (\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}c)^2, & x \in (-\infty, -\sqrt{-2c}), \\ 0, & x \in (-\sqrt{-2c}, \infty) \end{cases} \quad c \leq 0;$$

$$y(x) = \begin{cases} (\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}c_1)^2, & x \in (-\infty, -\sqrt{-2c_1}), \\ 0, & x \in (-\sqrt{-2c_1}, \sqrt{-2c_2}), \\ (\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}c_2)^2, & x \in (\sqrt{-2c_2}, \infty), \end{cases} \quad c_1 \leq 0, c_2 \leq 0;$$

**Příklad F2:**  $y(x) = \left(\frac{1}{8}(\sqrt{1+x^2}-x)^2 - \frac{1}{2} \log(\sqrt{1+x^2}-x) - \frac{1}{8}(\sqrt{1+x^2}-x)^2\right) \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{c}{\sqrt{1+x^2}},$   
 $x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}$

**Příklad F3:**  $y(x) = -\frac{3}{4}x \cos x - \frac{1}{4}x^2 \sin x + c_1 + c_2 \sin x + c_3 \cos x, x \in \mathbb{R}, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

**Příklad F4:**  $y(x) = -\log(-x-c) - x, x \in (-\infty, -c), c \in \mathbb{R}$

**Příklad F5:**  $\left\{ k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; k \in \mathbb{R} \right\}$

*finai substituice di*

Potom integrály typu  $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$  lze řešit *Eulerovou substitucí*

$$t = \sqrt{a \frac{x - x_1}{x - x_2}}, \quad \text{odkud} \quad x = \frac{ax_1 - x_2 t^2}{a - t^2}, \quad dx = \frac{2a(x_1 - x_2)t}{(a - t^2)^2} dt.$$

3. *Kvadratický trojčlen*  $ax^2 + bx + c$  nemá reálný kořen. Pokud kvadratický trojčlen  $ax^2 + bx + c$  nemá žádné reálné kořeny, pak, aby odmocnina měla smysl, musí být  $a > 0$ . Z neexistence kořenů navíc vyplývá, že  $c > 0$ . Lze použít jedné z následujících dvou *Eulerových substitucí*

$$t = \sqrt{ax^2 + bx + c} \pm x\sqrt{a}, \quad (1)$$

$$xt = \sqrt{ax^2 + bx + c} + \sqrt{c}. \quad (2)$$

Například z první substituce lze vyjádřit, že

$$\begin{aligned} t \mp x\sqrt{a} &= \sqrt{ax^2 + bx + c} \\ (t \mp x\sqrt{a})^2 &= ax^2 + bx + c \\ t^2 \mp 2tx\sqrt{a} &= bx + c \\ x &= \frac{t^2 - c}{b \pm 2t\sqrt{a}} \end{aligned}$$

a odtud máme, že

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \mp \frac{t^2 - c}{b \pm 2t\sqrt{a}}.$$

4. Existuje ještě jiná, v jednodušších případech častěji využívaná možnost, založená na transformaci kvadratického trojčlenu na kanonický tvar - *převodem na čtverec*.

$$= \int \frac{1}{a^2} \cos t \, dt \stackrel{C}{=} \frac{1}{a^2} \sin t = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}},$$

přičemž poslední vztah plyne z výpočtu

$$\operatorname{tg}^2 t = \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = \frac{\sin^2 t}{1 - \sin^2 t} \implies \sin^2 t = \frac{\operatorname{tg}^2 t}{1 + \operatorname{tg}^2 t} \implies \sin t = \frac{\operatorname{tg} t}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 t}}.$$

2. Hyperbolické:

(a)  $f(x) = \sqrt{a^2 + x^2}$

**Řešení:** Použijeme substituci  $x = a \sinh t$ . Potom  $dx = a \cosh t \, dt$  a platí

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 + x^2} \, dx &= \int a^2 \cosh^2 t \, dt \stackrel{C}{=} \frac{a^2}{2} (t + \cosh t \sinh t) = \\ &= \frac{1}{2} a^2 \operatorname{arg} \sinh \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} \stackrel{C}{=} \frac{1}{2} a^2 \ln \left( x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} \end{aligned}$$

(b)  $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$

**Řešení:**

Použijeme substituci  $x = a \cosh t$ . Potom  $dx = a \sinh t \, dt$  a platí

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx &= \int a^2 \sinh^2 t \, dt \stackrel{C}{=} \frac{a^2}{2} (\cosh t \sinh t - t) = \\ &= -\frac{1}{2} a^2 \operatorname{arg} \cosh \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - a^2}. \end{aligned}$$

Lze také psát

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx \stackrel{C}{=} -\frac{1}{2} a^2 \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - a^2}.$$

(c)  $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 2}}$

**Řešení:** Provedeme substituci  $x = \sqrt{2} \cosh t$ . Potom  $dx = \sqrt{2} \sinh t \, dt$  a platí

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} \, dx &= \int \frac{2 \cosh^2 t}{\sqrt{2} \sinh t} \sqrt{2} \sinh t \, dt = \int 2 \cosh^2 t \, dt \stackrel{C}{=} (t + \sinh t \cosh t) = \\ &= \operatorname{arg} \sinh \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 2} \stackrel{C}{=} \ln \left( x + \sqrt{x^2 - 2} \right) + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 2} \end{aligned}$$

(d)  $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}}$

**Řešení:** Použijeme substituci  $x = a \sinh t$ . Potom  $dx = a \cosh t \, dt$  a platí

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} \, dx &= \int \frac{a^2 \sinh^2 t}{a \cosh t} a \cosh t \, dt = a^2 \int \sinh^2 t \, dt \stackrel{C}{=} \frac{a^2}{2} [t - \sinh t \cosh t] = \\ &= \frac{a^2}{2} \operatorname{arg} \sinh \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} \stackrel{C}{=} \frac{1}{2} a^2 \ln \left( x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} \end{aligned}$$

## 10. cvičení

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/>  
kytaristka@gmail.com

### Teorie

**Věta 1** (první věta o substituci). Nechť  $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ ,  $a < b$ ,  $\alpha < \beta$ . Nechť  $F$  je primitivní funkce k  $f$  na  $(a, b)$ . Nechť  $\varphi$  je funkce definovaná na intervalu  $(\alpha, \beta)$  s hodnotami v  $(a, b)$ , která má v každém bodě  $(\alpha, \beta)$  vlastní derivaci. Pak

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \stackrel{C}{=} F(\varphi(t)), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

**Věta 2** (druhá věta o substituci). Nechť  $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ ,  $a < b$ ,  $\alpha < \beta$ . Nechť  $\varphi : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$  má v každém bodě nenulovou vlastní derivaci a  $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$ . Nechť  $f$  je funkce definovaná na intervalu  $(a, b)$  a platí

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \stackrel{C}{=} G(t), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

Pak

$$\int f(x)dx \stackrel{C}{=} G(\varphi^{-1}(x)), \quad x \in (a, b).$$

### Hinty

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} - 1}{2e^x} = \frac{1 - e^{-2x}}{2e^{-x}}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} + 1}{2e^x} = \frac{1 + e^{-2x}}{2e^{-x}}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$$

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} = \frac{1 + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}}$$

$$\sinh(-x) = -\sinh(x)$$

$$\cosh(-x) = \cosh(x)$$

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

$$\cosh(x+y) = \sinh(x) \cdot \sinh(y) + \cosh(x) \cdot \cosh(y)$$

$$\sinh(x+y) = \cosh(x) \cdot \sinh(y) + \sinh(x) \cdot \cosh(y)$$

$$\cosh(x) + \sinh(x) = e^x$$

$$\cosh(x) - \sinh(x) = e^{-x}$$