

20. cvičení

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/>,

Věta 1. Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a necht' f je **spojitá** funkce na $[a, b]$. Potom $f \in \mathcal{N}(a, b)$.

Věta 2 (limitní srovnávací kritérium). Nechť $-\infty \leq a < b < \infty$ a necht' $a < b$. Necht' f, g jsou **spojité** a necht' g je **kladná** na $(a, b]$.

1. Jestliže $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ je vlastní a $\int_a^b f$ diverguje, pak také $\int_a^b g$ diverguje.
2. Jestliže $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ je vlastní a nenulová, pak $\int_a^b f$ diverguje právě tehdy, když $\int_a^b g$ diverguje.
3. Jestliže $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ je nevlastní a $\int_a^b f$ konverguje, pak také $\int_a^b g$ konverguje.

Věta 3 (srovnávací kritérium pro konvergenci Newtonova integrálu). Necht' $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$ a necht' $a < b$. Necht' funkce $f, g : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ splňují $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $x \in (a, b]$. Necht' dále je f **spojitá** na $(a, b]$ a platí $g \in \mathcal{N}(a, b)$. Potom $f \in \mathcal{N}(a, b)$.

Algoritmus

1. Je funkce spojitá na omezeném intervalu? Lze ji spojitě dodefinovat?
2. Je možné integrál přímo upočítat? Je možné jej (např. substitucí) převést na tabulkový integrál?
3. Srovnávací a limitní srovnávací kritérium.

Příklady

1. Vyšetřete **absolutní** konvergenci integrálů, $\alpha, \beta, a, b, k, p, q, s \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$:

(a) $\int_0^\infty \frac{\sin x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$

(g) $\int_0^1 \frac{\sin x^p}{x^q} dx$

(b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg}^\alpha x dx$

(h) i. $\int_0^1 \frac{|\ln x|^\alpha}{1+x^k} dx$

(c) $\int_0^\pi \ln(\sin x) dx$

ii. $\int_1^\infty \frac{|\ln x|^\alpha}{1+x^k} dx$

(d) $\int_1^\infty \sin(x^\alpha) dx$

(i) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

(e) $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

(j) $\int_1^2 \frac{e^x}{\sqrt{x^2-1}} dx$

(f) $\int_0^1 \ln x dx$

(k) $\int_0^\infty x^\alpha \arctan^\beta x dx$

$$\begin{array}{ll}
(l) \int_0^{\infty} x^a + x^b dx & (o) \int_0^{\infty} \frac{\arctan px}{x^n} dx \\
(m) \int_0^1 x^{\ln x} dx & (p) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx \\
(n) \int_1^2 \frac{\arctan(x-1)}{(x-\sqrt{x})^p} dx & (q) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin(x^2+x^3)}{x \ln^2(1+x)} dx
\end{array}$$


2. Vyšetřete **absolutní** konvergenci integrálů, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Zdroj:

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/index.html>

$$\begin{array}{ll}
(a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan x^2}{x^\gamma} \sin(2x) dx, \gamma > 0 & (e) \int_0^1 (\arcsin x - x)^\alpha \frac{\sin^\beta(\pi x)}{(1-x)^\alpha} dx \\
(b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\arctan x)^\alpha \frac{\sin x}{2x+1} dx & (f) \int_0^{2\pi} \arctan^\alpha(\sqrt{x}) \sin^\beta\left(\frac{x}{2}\right) dx \\
(c) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \sin^\beta x dx & (g) \int_0^1 (\arcsin x - x)^\alpha \sin^\beta(\pi x) \cos^\alpha\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx \\
(d) \int_0^\pi \frac{\ln^\alpha(1+x) \sin^\beta x}{x^2(\pi-x)^3} dx &
\end{array}$$

3. Buď f spojitá a nezáporná funkce na intervalu $[a, \infty)$, $a > 0$. Nechť existuje $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \cdot x^\alpha = A$. Co můžeme říct o konvergenci $\int_a^\infty f$ v závislosti na A a α ?
4. Buď f spojitá a nezáporná funkce na intervalu $[a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$. Nechť existuje $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \cdot (x-b)^\alpha = A$. Co můžeme říct o konvergenci $\int_a^b f$ v závislosti na A a α ?



- (2b) u $\frac{\pi}{2}$: $\tan x = \sin x / \cos x$, pak užiěte srovnávací tabulku pro $\cos x$.
- (2c) u π srovnáěte $\sin x$ s $\pi - x$.
- (2d) Pro $\alpha > 0$ substituujte $y = x^\alpha$.
- (2g) Pro $p > 0$ převeděte na $\int \frac{y^p}{\sin y}$.
- (2p) $1 - x^4 = (1 + x^2)(1 - x^2)(1 + x)$.