



14. cvičení - Parciální zlomky 2

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

Teorie

Per partes

Označme

$$I_n := \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$$

Pak

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{C}{=} \arctan x \\ I_{n+1} &= \frac{x}{2n(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n \end{aligned}$$

Substituce

Pro substituci $x = \tan t$ platí vztahy:

$$t = \arctan x \quad \sin^2 t = \frac{x^2}{1+x^2}, \quad \cos^2 t = \frac{1}{1+x^2}, \quad \sin t \cos t = \frac{x}{1+x^2} \quad (1)$$

Tedy

$$I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \int (\cos^2 t)^{n-1} dt$$

Příklady

Určete primitivní funkci k daným funkcím:

$$1. f(x) = -\frac{3}{16} \frac{1}{(x^2+1)^2}$$

$$5. f(x) = \frac{x^2+3x-2}{(x-1)(x^2+x+1)^2}$$

$$2. f(x) = \frac{1}{(x^2+x+1)^2}$$

$$6. \text{※ } f(x) = \frac{x^2+1}{(x^4+x^2+1)^2}$$

$$3. f(x) = \frac{x^2}{(x^2+2x+2)^2}$$

$$7. f(x) = \frac{1}{(x^3+1)^2}$$

$$4. f(x) = \frac{1}{(x^2+1)^3}$$

$$8. \text{※ } f(x) = \frac{x^9}{(x^{10}+2x^5+2)^2}.$$

(8) substituce $t = \arctan x$
 (6) pro rozklad hledějte $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$, rozdávejte a porovnávejte člen po členu