



7. cvičení – Mocninné řady – poloměr konvergence

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

Teorie

Definice 1. *Mocninnou řadou o středu $x_0 \in \mathbb{R}$ rozumíme řadu $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$, kde $x \in \mathbb{R}$ a $a_n \in \mathbb{R}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$.*

Věta 2 (Poloměr konvergence). Necht' $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada. Pak existuje právě jeden nezáporný prvek $R \in \mathbb{R}^*$ takový, že

- pro každé $x \in \mathbb{R}$, $|x - x_0| < R$, uvedená řada konverguje absolutně,
- pro každé $x \in \mathbb{R}$, $|x - x_0| > R$, uvedená řada diverguje.

Prvek R splňuje

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}},$$

kde výrazem $1/0$ zde rozumíme $+\infty$ a výrazem $1/\infty$ zde rozumíme 0 . Prvek R nazýváme *poloměrem konvergence* uvedené řady.

Věta 3. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost s **kladnými** členy, splňující podmínku

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A.$$

Pak také

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = A.$$

Věta 4. Necht' $\{a_n\}$ je reálná posloupnost, jejíž všechny členy jsou **kladné**. Necht' dále platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1.$$

Potom platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

Fakta

Neht' $a > 0$, pak:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^a} = 1$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

Hint

$$a^b = e^{b \ln a}$$

$$n!! = n(n-2)(n-4) \dots$$

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} > \frac{1}{2n+1}, \quad \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+2}}.$$

Příklady

1. Určete poloměr konvergence mocninných řad a konvergenci (i absolutní) na hranici.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n^2} \cdot x^n$, kde $(0 < \alpha < 1)$

(g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3 + (-1)^n)^n}{n} x^n$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$, kde $p \in \mathbb{R}$.

(h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}$, kde $a > 0, b > 0$.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a^{n^2}} \cdot x^n$, kde $(a > 1)$

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x + 1)^n$

(j) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \cdot x^n$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{n^2}$

(k) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^{\sqrt{n}}}$, kde $a > 0$.

(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^n$

(l) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2}\right) \cdot x^n$, kde $a > 0, b > 0$.

Bonus

2. Víme, že řada $\sum a_n(x+7)^n$ konverguje pro $x = 0$ a diverguje pro $x = -17$. Co můžeme říct o poloměru konvergence?

3. Víme, že řada $\sum a_n x^n$ konverguje pro $x = -4$ a diverguje pro $x = 7$. Určete, zda jsou následující výroky pravdivé, nepravdivé nebo pravdivost nelze určit:

(a) Řada konverguje pro $x = 10$.

(c) Řada diverguje pro $x = 1$.

(b) Řada konverguje pro $x = 3$.

(d) Řada diverguje pro $x = 6$.

4. Najděte mocninnou řadu, která:

(a) diverguje pro $x = 0$;

(b) konverguje pro $x = 5$, ale nikde jinde;

(c) má střed konvergence v 0, poloměr konvergence roven 2 a konverguje pro 2, ale diverguje pro -2 .

5. Nechť mocninná řada $\sum a_n x^n$ má poloměr konvergence roven R_1 a mocninná řada $\sum b_n x^n$ má poloměr konvergence roven R_2 . Co můžeme říct o poloměru konvergence mocninné řady $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$?

(1e) Jak vypadá n -tý člen?
 (1f) pro hranici: $\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} < \frac{2^{n+1}}{1} < \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} > \frac{\sqrt{2^{n+2}}}{1}$.
 (1g) Na hranici zkoumejte liché a sudé členy.
 (1j) Na hranici otestuje NP (Taylorem nebo L'Hospitalem).