

### 13. cvičení - limita funkce

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

## Příklady

### Z grafu

- 1.
- |  |   |
|--|---|
| (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$         | (k) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$                          |
| (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty$      | (l) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$                              |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$     | (m) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$                            |
| (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} = \infty$  | (n) $\lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty$                           |
| (e) $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x} = 0$           | (o) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x \not\exists$                    |
| (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$    | (p) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$                                 |
| (g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$   | (q) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+} \operatorname{tg} x = -\infty$ |
| (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \not\exists$ | (r) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \operatorname{tg} x = \infty$  |
| (i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ | (s) $\lim_{x \rightarrow 0+} \cot x = \infty$                           |
| (j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$  | (t) $\lim_{x \rightarrow 0-} \cot x = -\infty$                          |

### Z definice

2. Určete z **definice** následující limity (či jejich neexistenci)

(a)  $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$

**Řešení:** Je  $f(x) = x + 2$ . Zvolme  $\varepsilon > 0$ . Pomocí tohoto  $\varepsilon$  stačí určit  $\delta > 0$  takové, aby všechna  $x$  z prstencového okolí  $(2 - \delta, 2 + \delta) \setminus \{2\}$  bodu 2 splňovala nerovnost

$$|f(x) - 4| < \varepsilon \Leftrightarrow |(x + 2) - 4| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - 2| < \varepsilon. \quad (*)$$

Tuto nerovnici umíme vyřešit. Jejím řešením jsou všechna  $x$  z intervalu  $(2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon)$ . Z toho je vidět, že stačí položit  $\delta = \varepsilon$ , neboť potom

$$x \in (2 - \delta, 2 + \delta) \implies x \in (2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon) \implies x \text{ splňuje nerovnici } (*)$$

$\implies$  tvrzení o limitě je dokázáno.

(b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1$

**Řešení:** Volme  $\varepsilon > 0$ . Chceme najít  $K$  takové, aby pro všechna  $x \geq K$  bylo

$$\left| \frac{x}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Nerovnici upravíme na vhodnější tvar pro její řešení.

$$\left| \frac{x}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{x - (x+1)}{x+1} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{-1}{x+1} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{1}{x+1} \right| < \varepsilon.$$

Protože pro  $x$  hledáme okolí  $+\infty$ , můžeme se omezit na kladná  $x$  a tím zrušit absolutní hodnotu. Pak je vidět, že při tomto omezení jsou řešením rovnice všechna  $x$  kladná taková, že  $x+1 > \frac{1}{\varepsilon}$  a tedy  $x > \frac{1}{\varepsilon} - 1$ . Stačí tedy volit libovolné  $K > \frac{1}{\varepsilon} - 1$  (popřípadě  $K > 0$ , pokud  $\frac{1}{\varepsilon} < 1$ ).

(c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} = +\infty$

**Řešení:** Volme  $K$  reálné a omezme se na  $K > 0$ . Chceme najít  $\delta$  tak, aby pro všechna  $x \in (2 - \delta, 2 + \delta) \setminus \{2\}$  platilo, že

$$\frac{1}{|x-2|} \geq K \Leftrightarrow |x-2| \leq \frac{1}{K}.$$

Odtud vyplývá, že stačí volit libovolné kladné  $\delta < \frac{1}{K}$ .

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \not\exists$

**Řešení:** V bodě nula funkce  $\frac{1}{x}$  nemůže mít limitu, protože  $\frac{1}{x} < \frac{-1}{\delta}$  na  $(-\delta, 0)$  a  $\frac{1}{x} > \frac{1}{\delta}$  na  $(0, \delta)$ . Pro každé reálné číslo  $L$  tedy najdeme  $\delta$  tak, že  $L$  neleží v  $f(-\delta, +\delta)$ . Je-li pak  $L$  kladné nekonečno, potom  $U = (1, +\infty)$  je okolím  $L$ , ale  $f(-\delta, +\delta)$  není podmnožinou  $U$  dokonce pro žádné  $\delta > 0$  (obsahuje totiž také záporná čísla). Obdobně vyloučíme záporné nekonečno.

Vyšetříme tedy jednostranné limity. Protože hodnoty  $\frac{1}{x}$  se zvětšují, jdeme-li k nule zprava, máme podezření, že limita zprava bude  $+\infty$ . Chceme tedy dokázat, že pro libovolné  $K > 0$  existuje  $\delta > 0$  tak, že  $f(x) \geq K$ , pokud  $x \in (0, \delta)$ . Buď tedy  $K > 0$  libovolné reálné číslo. Řešením nerovnice (uvědomte si, že  $x, K > 0$ )

$$f(x) \geq K \Leftrightarrow \frac{1}{x} \geq K \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{K},$$

dostáváme, že stačí volit  $\delta < \frac{1}{K}$ . Tím je důkaz hotov,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ .

Důkaz, že  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ , by probíhal obdobně. Neexistence limity v nule pak též plyne z nerovnosti jednostranných limit.

(e)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x} \not\exists$

**Řešení:** Volme libovolné pravé prstencové okolí nuly  $(0, \delta)$ . Uvažme body  $x_n = \frac{1}{n\pi}$ . Je-li  $n$  dost velké ( $\frac{1}{n\pi} < \delta$ ), pak  $x_n \in (0, \delta)$  a  $\sin x_n = 0$ . Uvažme ještě body  $y_m = \frac{1}{2m\pi + \frac{\pi}{2}}$ . Opět pro  $m$  dost velké ( $\frac{1}{2m\pi + \frac{\pi}{2}} < \delta$ ) je  $y_m \in (0, \delta)$  a  $\sin y_m = 1$ . Je tedy vidět, že v libovolném okolí  $(0, \delta)$  najdeme body, v nichž funkce  $\sin \frac{1}{x}$  nabývá hodnot nula a jedna, limita zprava tedy nemůže existovat. Důkaz neexistence limity zleva probíhá analogicky, jen u před  $x_n$  a  $y_m$  napíšeme minus.

## Přímo

3. (a)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x+2}{-x+1} = \frac{3 \cdot 3 + 2}{-3 + 1} = \frac{-11}{2}$
- (b)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x = \tan \frac{\pi}{4} = 1$
- (c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(x-4)^2} =' \frac{1}{\infty}' = 0$
- (d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+3)^2 = (-\infty) \cdot (-\infty)$
- (e)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{-8-x} =' \frac{-3}{-\infty}' = 0$
- (f)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln x+1} =' \frac{1}{\infty}' = 0$
- (g)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+2} + \sqrt{x} = \infty + \infty$

4. Spočtěte limity, příp. jednostranné limity.

(a)  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{6}{x-5}$

**Řešení:** Dle Věty 4, aplikovanou na jednostranné limity. Zprava:

$f(x) = 6$ ,  $\lim_{x \rightarrow 5+} f(x) = 6$ ,  $6 > 0$ .  $g(x) = x - 5$ ,  $\lim_{x \rightarrow 5+} g(x) = 0$ ,  $x - 5 > 0$  na  $(5, 5 + 1)$ . Tedy  $\lim_{x \rightarrow 5+} \frac{f}{g} = \infty$ .

Zleva:  $f(x) = 6$ ,  $\lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = 6$ ,  $6 > 0$ .  $g(x) = x - 5$ ,  $\lim_{x \rightarrow 5-} g(x) = 0$ ,  $x - 5 < 0$  na  $(5 - 1, 5)$ . Tedy  $\lim_{x \rightarrow 5-} \frac{f}{g} = -\infty$ .

Závěr:  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{6}{x-5}$  neexistuje.

(b)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{(x-2)^2}$

**Řešení:** Máme  $g(x) = 2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2 > 0$ . Navíc  $f(x) = (x-2)^2$ ,  $f(x) > 0$  na  $P(2, 3)$ . Z věty  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{(x-2)^2} = \infty$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2}{x^2-4}$

**Řešení:** (Příklad převzat tu: [http://www2.gcc.edu/dept/math/faculty/BancroftED/teaching/handouts/limit\\_examples\\_from\\_class.pdf](http://www2.gcc.edu/dept/math/faculty/BancroftED/teaching/handouts/limit_examples_from_class.pdf))

Máme  $g(x) = x^2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = 16 > 0$ . Navíc  $f(x) = x^2 - 4$ ,  $f(x) > 0$  na  $(4, 5)$ .

Z věty je  $\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{x^2}{x^2 - 4} = \infty$ .

Zleva pak  $f(x) = x^2 - 4$ ,  $f(x) < 0$  na  $(3, 4)$ . Z věty je  $\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{x^2}{x^2 - 4} = -\infty$ .

Závěr: limita neexistuje.

(d)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-2x-3}{x^2+6x+9}$  **Řešení:** (Příklad převzat tu: [http://www2.gcc.edu/dept/math/faculty/BancroftED/teaching/handouts/limit\\_examples\\_from\\_class.pdf](http://www2.gcc.edu/dept/math/faculty/BancroftED/teaching/handouts/limit_examples_from_class.pdf))

Limitu lze rozložit

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 6x + 9} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-3)(x+1)}{(x+3)^2}.$$

Nyní lze psát  $g(x) = (x-3)(x+1)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = 12 > 0$ . Navíc  $f(x) = (x+3)^2$ ,  $f(x) > 0$  na  $P(-3, 42)$ . Z věty  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-3)(x+1)}{(x+3)^2} = \infty$

(e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x}$

**Řešení:** Máme  $g(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 1 > 0$ . Navíc  $f(x) = \sin x$ ,  $f(x) > 0$  na  $(0, \frac{\pi}{2})$ . Z věty je  $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sin x} = \infty$ .

Zleva pak  $g(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = 1 > 0$ . Navíc  $f(x) = \sin x$ ,  $f(x) < 0$  na  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ . Z věty je  $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{\sin x} = -\infty$ .

Závěr: limita neexistuje.

0/0

5. Vytkněte výraz s kořenem,

(a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 2x + 1}$

**Řešení:** Rozložíme na

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+4)}{(x-1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+4)}{(x-1)}.$$

Podle předchozího cvičení dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+4)}{(x-1)} = +\infty$$

a

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+4)}{(x-1)} = -\infty$$

Limita tedy neexistuje.

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^2 + x}{2x^3 + x^2 - 2x}$

**Řešení:** Vytkneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^2 + x}{2x^3 + x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} \cdot \frac{x^2 - 2x + 1}{2x^2 + x - 2} \stackrel{VQAL}{=} \frac{0 - 0 + 1}{0 + 0 - 2} = -\frac{1}{2}$$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{(x-1)^2}$

**Řešení:** Rozložíme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+5)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+5)}{(x-1)}.$$

Dle předchozího cvičení vyjde

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+5)}{(x-1)} = \infty$$

a

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+5)}{(x-1)} = -\infty$$

Závěr: limita neexistuje.

(d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$

**Řešení:** Platí, že  $(x^2 - 1) = (x-1)(x+1)$  a  $2x^2 - x - 1 = 2(x-1)(x + \frac{1}{2})$ . Platí tedy

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{2(x-1)(x + \frac{1}{2})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x+1} = \frac{2}{3}.$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$$

**Řešení:** Snadno se ověří, že jednička je kořen, dokonce dvojnásobný. Vytknutím dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^2(x^2+2x+3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2+2x+3} = \frac{1+2}{1+2+3} = \frac{1}{2}.$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}}$$

Rozložte polynomy na součin a pak teprve umocněte.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^{20}(x+1)^{20}}{[(x-2)^2]^{10}(x+4)^{10}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)^{20}}{(x+4)^{10}} = \frac{3^{20}}{6^{10}} = \frac{3^{10}}{2^{10}}.$$

## Bonus

6. Spočtěte limity

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}, \text{ kde } m, n \in \mathbb{N}$$

**Řešení:** Rozložíme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1)}{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1}{x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1} = \frac{m}{n}.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1}, \text{ kde } n \in \mathbb{N}$$

**Řešení:** Číslo  $n$  tu hraje roli pevně daného čísla, parametru. Postupnými rozklady dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) + (x^2-1) + (x^3-1) + \dots + (x^n-1)}{x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + (x+1) + (x^2+x+1) + (x^3+x^2+x+1) + \dots + (x^{n-1}+x^{n-2}+\dots+1)}{1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2+3+4+\dots+n}{1} = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

7. Najděte příklad funkce (stačí obrázkem), která:

(a) Nemá limitu v nekonečnu.

**Řešení:**  $f(x) = \cos x$

(b) Nemá limitu v čísle 3.

**Řešení:**  $f(x) = \frac{1}{x-3}$

(c) Má v nekonečnu limitu nekonečno.

**Řešení:**  $f(x) = x$

(d) Má v nekonečnu limitu -2.

**Řešení:**  $f(x) = -2 + \frac{1}{x}$

(e) Nemá limitu v 0, ale její absolutní hodnota ano.

**Řešení:**  $f(x) = \operatorname{sgn} x$

(f) Není spojitá v 0.

**Řešení:**  $f(x) = \operatorname{sgn} x$

(g) Je nespojitá v nekonečně mnoha bodech.

**Řešení:**  $f(x) = \tan x$

(h) Má vlastní limitu v nekonečnu a je rostoucí.

**Řešení:**  $f(x) = \arctan x$

8. Proč ten vtip není dobré?

### Know your limits

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{x - 8} = \infty.$$

Therefore

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x - 5} = \text{cr.}$$

Source 1: <https://kityates.com/public-engagement/>

**Řešení:** Protože  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{x-8}$  neexistuje - zprava je  $\infty$  a zleva  $-\infty$ .

9. Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ . Rozhodněte zda platí:

a) Nechť je  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ . Potom  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$ .

**Řešení:** Ano - aritmetika limit.

b) Nechť je  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ . Potom je buď  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = +\infty$  nebo  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = -\infty$ .

**Řešení:** Ne - např. pro funkci  $f(x) = x$  v 0 dostaneme  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \not\exists$ .

c) Nechť je  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  a  $f \neq 0$  na nějakém prstencovém okolí  $a$ . Potom je  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{|f(x)|} = +\infty$ .

**Řešení:** Tvrzení platí. Jde-li  $f(x) \rightarrow 0$  v bodě  $a$ , pak pro libovolné  $\varepsilon > 0$  existuje prstencové okolí bodu  $a$  tak, že  $|f(x)| < \varepsilon$ . Je-li nyní  $K > 0$ , pak existuje  $\varepsilon > 0$  tak, že  $K < \frac{1}{\varepsilon}$  a podle předchozího najdeme prstencové okolí  $a$  tak, že  $\frac{1}{|f(x)|} > \frac{1}{\varepsilon} > K$  pro  $x$  z tohoto prstencového okolí.

d1) Nechť je  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ . Potom vždy existují obě jednostranné limity  $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{1}{f(x)}$  a  $\lim_{x \rightarrow a-} \frac{1}{f(x)}$ , nemusí se však rovnat.

**Řešení:** Tvrzení neplatí. Stačí vzít  $f \equiv 0$  - pak  $1/f$  není definována, nelze jí tedy počítat limitu.

d2\*) Co když navíc požadujeme, aby  $f(x) \neq 0$  na nějakém prstencovém okolí bodu  $a$  ?

**Řešení:**

Tvrzení neplatí. Uvažte příklad funkce  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ , která v nule konverguje do nuly (je to nulová krát omezená) a tuto funkci předefinujme  $f(\frac{1}{n\pi}) = \frac{(-1)^n}{n\pi}$ , kde  $n$  jsou celá čísla (tedy v nulových bodech sinu). Potom z odhadu  $|f(x)| \leq |x|$  opět plyne konvergence do nuly a funkce je dokonce různá od nuly na  $\mathbb{R}$ . Přitom  $\frac{1}{f}$  nabývá libovolně velkých i libovolně malých hodnot na jakémkoli jednostranném okolí nuly.