



8. cvičení – Per partes, substituce

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

Teorie

Věta 1 (první věta o substituci). Nechť $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, $\alpha < \beta$. Nechť F je primitivní funkce k f na (a, b) . Nechť φ je funkce definovaná na intervalu (α, β) s hodnotami v (a, b) , která má v každém bodě (α, β) vlastní derivaci. Pak

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx \stackrel{C}{=} F(\varphi(x)), \quad x \in (\alpha, \beta).$$

Věta 2 (Integrace per partes). Nechť I je neprázdný otevřený interval a funkce f je spojitá na I . Nechť F je primitivní funkce k f na I a G je primitivní funkce ke g na I . Pak platí

$$\int g(x)F(x) dx = G(x)F(x) - \int G(x)f(x) dx \text{ na } I.$$

Poznámka 3. Objevuje se i v podobě:

$$\int u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x) dx \text{ na } I.$$

Poznámka 4. Nechť $P(x)$ značí polynom. V následujících tabulkách je pak návod, jak zvolit v per partes. (Jako každá návod, funguje to často, ale ne nutně vždycky.)

	$v(x)$	$u'(x)$
$P(x) \cdot e^{kx}$	$P(x)$	e^{kx}
$P(x) \cdot a^{kx}$	$P(x)$	a^{kx}
$P(x) \cdot \sin(kx)$	$P(x)$	$\sin(kx)$
$P(x) \cdot \cos(kx)$	$P(x)$	$\cos(kx)$

	$v(x)$	$u'(x)$
$P(x) \cdot \ln^n x$	$\ln^n x$	$P(x)$
$P(x) \cdot \arcsin(kx)$	$\arcsin(kx)$	$P(x)$
$P(x) \cdot \arccos(kx)$	$\arccos(kx)$	$P(x)$
$P(x) \cdot \arctan(kx)$	$\arctan(kx)$	$P(x)$
$P(x) \cdot \operatorname{arccot}(kx)$	$\operatorname{arccot}(kx)$	$P(x)$

Příklady

Určete primitivní funkci k funkci $f(x)$ na všech otevřených intervalech, kde primitivní funkce existuje.

1. Substituce

(a) $\int \sin^5 x \cos x dx.$

(c) $\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$

(b) $\int -2xe^{-x^2} dx$

(d) $\int \frac{1}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}} dx$

2. Per partes

(a) $\int x \cos x dx$

(c) $\int e^x \sin x dx$

(b) $\int xe^{-x} dx$

3. Směs

- | | | |
|---|---|---|
| (a) $\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$ | (j) $\heartsuit \int \cos(\ln x) dx$ | (s) $\clubsuit \int \operatorname{tg} x dx$ |
| (b) $\int \ln x dx$ | (k) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ | (t) $\clubsuit \int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx$ |
| (c) $\int \frac{e^x}{2+e^x} dx$ | (l) $\clubsuit \int \sin x \ln(\operatorname{tg} x) dx$ | (u) $\clubsuit \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$ |
| (d) $\int \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} dx$ | (m) $\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$ | (v) $\clubsuit \int \frac{1}{\sin x} dx$ |
| (e) $\int \arcsin x dx$ | (n) $\int x^2 \arccos x dx$ | (w) $\star \int \cos^3 x dx$ |
| (f) $\int \frac{x}{3-2x^2} dx$ | (o) $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos^3 x}} dx$ | (x) $\clubsuit \int \frac{x}{4+x^4} dx$ |
| (g) $\int x^2 \sin 2x dx$ | (p) $\clubsuit \int \sqrt{x} \ln^2 x dx$ | (y) $\clubsuit \int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} dx$ |
| (h) $\int e^{ax} \cos bx dx$ | (q) $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$ | (z) $\clubsuit \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx$ |
| (i) $\int \frac{1}{\sin^2 x \sqrt[4]{\cot x}} dx$ | (r) $\clubsuit \int x^3 e^{-x^2} dx$ | |

(3i) per partes	$\int \frac{\sin x}{1} = \frac{\sin x}{\sin x} = \frac{1}{\sin x}$, substituce $y = \cos x$	(3u) substituce $y = e^x$
(3l) per partes	$\int \cos^3 x = (1 - \sin^2 x) \cos x$, substituce $y = \cos x$	(3v) substituce $y = \sqrt{x}$
(3p) per partes	$\int \cos^3 x = \frac{1}{2} - \frac{\cos^2 x}{2}$, substituce $y = x^2$	(3s) substituce $y = \frac{\cos x}{\sin x}$, substituce $y = \operatorname{tg} x$
(3w) $\cos^3 x = (1 - \sin^2 x) \cos x$, substituce $y = \cos x$	(3y) substituce $y = x^2$	(3t) substituce $y = \frac{\sin x}{x}$
(3z) per partes	(3x) substituce $y = x^2$	(3q) substituce $y = \frac{1}{x}$
(3y) substituce $y = e^x$	(3s) substituce $y = \cos x$	(3r) substituce $y = \sqrt{1-x^2}$
(3z) substituce $y = \sqrt{x}$	(3u) substituce $y = e^{-x}$	(3v) substituce $y = \frac{1}{\sin x}$