

---

# NMFM301 – Statistika pro finanční matematiky

## Cvičení 2. Pořádkové statistiky. Nestrannost a konsistence odhadů

---

### A Příklady na cvičení

Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr ze spojitého rozdělení s distribuční funkcí  $F$  a hustotou  $f$ .

**A1.** [Procvičovací] Nechť  $n = 2k + 1$ .

- Najděte hustotu prostředního pozorování  $X_{(k+1)}$ . [Tato statistika se nazývá výběrový medián.]
- Nechť  $X_i$  má rovnoměrné rozdělení na intervalu  $(0, 1)$ . Spočítejte  $E X_{(k+1)}$  a  $\text{var } X_{(k+1)}$ .
- Nechť  $X_i \sim R(0, \theta)$ . Je  $X_{(k+1)}$  nestranným a/nebo konsistentním odhadem mediánu rozdělení  $R(0, \theta)$ ? [Použijte tvrzení P.7.5]

**A2.** [Instruktážní] Nechť  $X_i$  má exponenciální rozdělení s parametrem 1.

- Definujte

$$Z_1 = nX_{(1)}, \quad Z_k = (n - k + 1)(X_{(k)} - X_{(k-1)}), \quad k = 2, \dots, n.$$

- Ukažte, že  $Z_1, \dots, Z_n$  jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s rozdělením  $\text{Exp}(1)$ .
- Vyjádřete  $X_{(r)}$  pomocí lineární kombinace veličin  $Z_1, \dots, Z_n$  a pomocí tohoto vztahu spočítejte  $E X_{(r)}$  a  $\text{var } X_{(r)}$  (pro libovolné  $r = 1, \dots, n$ ).
  - Nechť  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  a  $n = 2k + 1$ . Je  $X_{(k+1)}$  nestranným a/nebo konsistentním odhadem mediánu rozdělení  $\text{Exp}(\lambda)$ ?

**A3.** [Procvičovací] Nechť  $X_i$  má rozdělení  $R(\theta_1, \theta_2)$ . Najděte nestranné odhady parametrů  $\theta_1$  a  $\theta_2$  založené na maximu  $X_{(n)}$  a minimu  $X_{(1)}$ .

### B Doplnující příklady (nahrazování, procvičování)

**B1.** Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $R(0, \theta)$ . Zjistěte, zdali  $X_{(n)}$  je nestranným a/nebo konsistentním odhadem parametru  $\theta$ .

**B2.** Uvažujme náhodný výběr  $X_1, \dots, X_n$  s hustotou

$$f(x) = 3\theta^{-3}x^2 1_{(0,\theta)}(x), \quad x \in \mathbb{R}, \theta > 0.$$

- (a) Ověřte, že  $\hat{\theta}_n = \frac{4}{3}\bar{X}_n$  je nestranný odhad parametru  $\theta$ .
- (b) Ověřte, že  $\tilde{\theta}_n = \frac{3n+1}{3n}X_{(n)}$  je nestranný odhad parametru  $\theta$ .
- (c) [Pro nahrazování nepovinný] Najděte rozptyl  $\hat{\theta}_n$  a  $\tilde{\theta}_n$  a porovnejte rychlost konvergence rozptylů k 0 při  $n \rightarrow \infty$ .

**B3.** Nechť  $X_i$  má rozdělení  $\text{Alt}(p)$ . Najděte nestranný odhad parametru  $\theta = p(1 - p)$  založený na  $\bar{X}_n$ .

**B4.** Nechť  $X_i$  má rozdělení  $\text{Exp}(\lambda)$ . Ukažte, že

$$\hat{\theta}_n = 1 - \left(1 - \frac{u}{n\bar{X}_n}\right)^{n-1}$$

je nestranným odhadem parametru  $\theta = 1 - e^{-\lambda u} = F_X(u)$ .

**B5.** Uvažujte nezávislé náhodné veličiny  $X_1, X_2, \dots$  s rozdělením  $\text{Alt}(p)$ .

- (a) Ukažte (sporem), že při pevném rozsahu výběru  $n$  neexistuje nestranný odhad parametru  $\theta = 1/p$  založený na  $X_1, \dots, X_n$ .
- (b) Nechť  $Z$  značí počet nul předcházejících první jedničky v posloupnosti  $X_1, X_2, \dots$ . Víme, že  $Z$  má rozdělení  $\text{Geo}(p)$ . Ukažte, že  $Z + 1$  je nestranným odhadem parametru  $\theta = 1/p$ .

**B6.** Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $\text{Exp}(1)$  a  $U_1, \dots, U_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $\text{R}(0, 1)$ . Ukažte, že  $-\log U_{(n-r+1)}$  má stejné rozdělení jako  $X_{(r)}$ . Pomocí příkladu **A2** ukažte, že

$$Q_r = \left( \frac{U_{(r)}}{U_{(r+1)}} \right)^r$$

jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s rozdělením  $\text{R}(0, 1)$ .