

## V. Funkce více proměnných

### V.1. $\mathbb{R}^n$ jako lineární a metrický prostor

**Definice.** Množinou  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , rozumíme množinu všech uspořádaných  $n$ -tic reálných čísel.

**Definice.** Euklidovskou metrikou (vzdáleností) na  $\mathbb{R}^n$  rozumíme funkci  $\rho: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$  definovanou předpisem

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Číslo  $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  nazýváme vzdáleností bodu  $\mathbf{x}$  od bodu  $\mathbf{y}$ .

**Věta 1** (vlastnosti euklidovské metriky). Euklidovská metrika  $\rho$  má následující vlastnosti:

- (i)  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$ ,
- (ii)  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ , (symetrie)
- (iii)  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \rho(\mathbf{z}, \mathbf{y})$ , (trojúhelníková nerovnost)
- (iv)  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}: \rho(\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{y}) = |\lambda| \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ , (homogenita)
- (v)  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x} + \mathbf{z}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ . (translační invariance)

**Definice.** Necht'  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ,  $r \in \mathbb{R}, r > 0$ . Množinu  $B(\mathbf{x}, r)$  definovanou předpisem

$$B(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n; \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < r\}$$

nazýváme otevřenou koulí o poloměru  $r$  a středu  $\mathbf{x}$  nebo také okolím bodu  $\mathbf{x}$ .

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  je vnitřním bodem množiny  $M$ , jestliže existuje  $r > 0$  tak, že  $B(\mathbf{x}, r) \subset M$ .

Množina  $M \subset \mathbb{R}^n$  se nazývá otevřená v  $\mathbb{R}^n$ , jestliže každý její bod je jejím vnitřním bodem.

Vnitřkem množiny  $M$  rozumíme množinu všech vnitřních bodů množiny  $M$  a značíme jej  $\text{Int } M$ .

**Věta 2** (vlastnosti otevřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor  $\mathbb{R}^n$  jsou otevřené v  $\mathbb{R}^n$ .
- (ii) Necht' množiny  $G_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\alpha \in A \neq \emptyset$ , jsou otevřené v  $\mathbb{R}^n$ . Pak  $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$  je otevřená množina v  $\mathbb{R}^n$ .
- (iii) Necht' množiny  $G_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , jsou otevřené v  $\mathbb{R}^n$ . Pak  $\bigcap_{i=1}^m G_i$  je otevřená množina v  $\mathbb{R}^n$ .

*Poznámka.*

- (ii) Sjednocení libovolného systému otevřených množin je otevřená množina.
- (iii) Průnik konečně mnoha otevřených množin je otevřená množina.

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  a  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $\mathbf{x}$  je hraničním bodem množiny  $M$ , pokud pro každé  $r > 0$  platí

$$B(\mathbf{x}, r) \cap M \neq \emptyset \quad \text{a} \quad B(\mathbf{x}, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset.$$

Hranicí množiny  $M$  rozumíme množinu všech hraničních bodů  $M$  a značíme ji  $H(M)$ .

Uzavřením množiny  $M$  rozumíme množinu  $M \cup H(M)$  a značíme jej  $\overline{M}$ .

Řekneme, že množina  $M$  je uzavřená v  $\mathbb{R}^n$ , jestliže obsahuje všechny své hraniční body, tedy  $H(M) \subset M$ , neboli  $M = \overline{M}$ .

—————konec 1. přednášky 21.2.—————

**Definice.** Necht'  $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$  pro každé  $j \in \mathbb{N}$  a  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Říkáme, že posloupnost  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$  konverguje k  $\mathbf{x}$ , pokud

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}^j) = 0.$$

Prvek  $\mathbf{x}$  nazýváme limitou posloupnosti  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ .

Posloupnost  $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$  prvků  $\mathbb{R}^n$  je konvergentní, pokud existuje  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  takové, že  $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$  konverguje k  $\mathbf{y}$ .

*Poznámka.* Platí, že  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$  konverguje k  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists j_0 \in \mathbb{N} \forall j \in \mathbb{N}, j \geq j_0: \mathbf{x}^j \in B(\mathbf{x}, \varepsilon).$$

**Věta 3.** Necht'  $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$  pro každé  $j \in \mathbb{N}$  a  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Posloupnost  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^{\infty}$  konverguje k  $\mathbf{x}$  právě tehdy, když pro každé  $i \in \{1, \dots, n\}$  číselná posloupnost  $\{x_i^j\}_{j=1}^{\infty}$  konverguje k číslu  $x_i$ .

*Poznámka.* Věta 3 říká, že konvergence v prostoru  $\mathbb{R}^n$  je totéž, jako konvergence „po souřadnicích“. Posloupnost  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^{\infty}$  má tedy nejvýše jednu limitu. Pokud existuje, označíme ji symbolem  $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{x}^j$ . Někdy též místo  $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{x}^j = \mathbf{x}$  píšeme  $\mathbf{x}^j \rightarrow \mathbf{x}$ .

**Věta 4** (charakterizace uzavřených množin). Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ . Pak následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (i) Množina  $M$  je uzavřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (ii) Množina  $\mathbb{R}^n \setminus M$  je otevřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (iii) Každý bod  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , k němuž konverguje nějaká posloupnost  $\{\mathbf{x}^j\}$  prvků množiny  $M$ , patří do množiny  $M$ .

**Věta 5** (vlastnosti uzavřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor  $\mathbb{R}^n$  jsou uzavřené v  $\mathbb{R}^n$ .
- (ii) Necht' množiny  $F_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\alpha \in A \neq \emptyset$ , jsou uzavřené v  $\mathbb{R}^n$ . Pak  $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$  je uzavřená množina v  $\mathbb{R}^n$ .
- (iii) Necht' množiny  $F_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , jsou uzavřené v  $\mathbb{R}^n$ . Pak  $\bigcup_{i=1}^m F_i$  je uzavřená množina v  $\mathbb{R}^n$ .

*Poznámka.*

- (ii) Průnik libovolného systému uzavřených množin je uzavřená množina.
- (iii) Sjednocení konečně mnoha uzavřených množin je uzavřená množina.

*Pozorování.* Necht'  $M \subset N \subset \mathbb{R}^n$ . Pak  $\text{Int } M \subset \text{Int } N$  a  $\overline{M} \subset \overline{N}$ .

**Věta 6.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ . Potom platí:

- (i) Množina  $\overline{M}$  je uzavřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (ii) Množina  $\text{Int } M$  je otevřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (iii) Množina  $M$  je otevřená v  $\mathbb{R}^n$ , právě když  $M = \text{Int } M$ .

*Poznámka.* Množina  $\text{Int } M$  je největší otevřená množina obsažená v  $M$  v následujícím smyslu: Je-li  $G$  množina otevřená v  $\mathbb{R}^n$  splňující  $G \subset M$ , pak  $G \subset \text{Int } M$ . Podobně  $\overline{M}$  je nejmenší uzavřená množina obsahující  $M$ .

**Definice.** Řekneme, že množina  $M \subset \mathbb{R}^n$  je omezená, jestliže existuje  $r > 0$  splňující  $M \subset B(\mathbf{o}, r)$ . Posloupnost prvků  $\mathbb{R}^n$  je omezená, jestliže množina jejich členů je omezená.

**Věta 7.** Množina  $M \subset \mathbb{R}^n$  je omezená, právě když je omezená množina  $\overline{M}$ .

## V.2. Spojité funkce více proměnných

**Definice.** Necht'  $f$  je funkce  $n$  proměnných a  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $f$  je spojité v bodě  $\mathbf{x}$ , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta): f(\mathbf{y}) \in B(f(\mathbf{x}), \varepsilon).$$

Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  a  $\mathbf{x} \in M$ . Řekneme, že  $f$  je spojité v bodě  $\mathbf{x}$  vzhledem k  $M$ , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta) \cap M: f(\mathbf{y}) \in B(f(\mathbf{x}), \varepsilon).$$

*Poznámka.* Funkce  $f$  je spojité v bodě  $\mathbf{x}$ , jestliže je spojité v  $\mathbf{x}$  vzhledem k nějakému okolí bodu  $\mathbf{x}$ .

—————konec 2. přednášky 23.2.—————

**Věta 8** (Heine). Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{x} \in M$  a  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ . Pak je ekvivalentní:

- (i)  $f$  je spojité v  $\mathbf{x}$  vzhledem k  $M$ ,
- (ii)  $\lim_{j \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^j) = f(\mathbf{x})$  pro každou posloupnost  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^{\infty}$  splňující  $\mathbf{x}^j \in M$  pro  $j \in \mathbb{N}$  a  $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{x}^j = \mathbf{x}$ .

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  a  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ . Řekneme, že  $f$  je spojité na množině  $M$ , jestliže je spojité v každém bodě  $\mathbf{x} \in M$  vzhledem k  $M$ .

*Poznámka.* Funkce  $\pi^j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\pi^j(\mathbf{x}) = x_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , jsou spojité na  $\mathbb{R}^n$ . Těmto funkcím říkáme souřadnicové projekce.

**Věta 9.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{x} \in M$ ,  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g: M \rightarrow \mathbb{R}$  a  $c \in \mathbb{R}$ . Jestliže  $f$  a  $g$  jsou spojité v bodě  $\mathbf{x}$  vzhledem k  $M$ , potom také funkce  $cf$ ,  $f + g$  a  $f/g$  jsou spojité v  $\mathbf{x}$  vzhledem k  $M$ . Pokud navíc funkce  $g$  je nenulová v bodě  $\mathbf{x}$ , pak je spojitá i funkce  $f/g$  v bodě  $\mathbf{x}$  vzhledem k  $M$ .

**Věta 10.** Necht'  $r, s \in \mathbb{N}$ ,  $M \subset \mathbb{R}^s$ ,  $L \subset \mathbb{R}^r$  a  $\mathbf{y} \in M$ . Necht'  $\varphi_1, \dots, \varphi_r$  jsou funkce definované na  $M$ , spojité v bodě  $\mathbf{y}$  vzhledem k  $M$  a  $[\varphi_1(\mathbf{y}), \dots, \varphi_r(\mathbf{y})] \in L$  pro každé  $\mathbf{x} \in M$ . Necht'  $f: L \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá v bodě  $[\varphi_1(\mathbf{y}), \dots, \varphi_r(\mathbf{y})]$  vzhledem k  $L$ . Potom složená funkce  $F: M \rightarrow \mathbb{R}$  daná předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in M,$$

je spojitá v  $\mathbf{y}$  vzhledem k  $M$ .

**Věta 11.** Necht'  $f$  je spojitá funkce na  $\mathbb{R}^n$  a  $c \in \mathbb{R}$ . Potom platí:

- (i) Množina  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$  je otevřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (ii) Množina  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) > c\}$  je otevřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (iii) Množina  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\}$  je uzavřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (iv) Množina  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}$  je uzavřená v  $\mathbb{R}^n$ .
- (v) Množina  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\}$  je uzavřená v  $\mathbb{R}^n$ .

**Definice.** Množinu  $M \subset \mathbb{R}^n$  nazýváme *kompaktní*, pokud z každé posloupnosti prvků množiny  $M$  lze vybrat konvergentní podposloupnost s limitou v  $M$ .

**Věta 12** (charakterizace kompaktních množin v  $\mathbb{R}^n$ ). Množina  $M \subset \mathbb{R}^n$  je kompaktní, právě když je uzavřená a omezená.

—————konec 3. přednášky 28.2.—————

**Lemma 13.** Necht'  $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^{\infty}$  je omezená posloupnost v  $\mathbb{R}^n$ . Pak z ní lze vybrat konvergentní podposloupnost.

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{x} \in M$  a  $f$  je funkce definovaná alespoň na  $M$  (tj.  $M \subset D_f$ ). Řekneme, že  $f$  nabývá v bodě  $\mathbf{x}$

- *maxima* na  $M$ , jestliže platí  $\forall \mathbf{y} \in M: f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x})$ ,
- *lokálního maxima* vzhledem k  $M$ , jestliže existuje  $\delta > 0$  takové, že  $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta) \cap M: f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x})$ ,
- *ostrého maxima* na  $M$ , jestliže platí  $\forall \mathbf{y} \in M \setminus \{\mathbf{x}\}: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x})$ ,
- *ostrého lokálního maxima* vzhledem k  $M$ , jestliže existuje  $\delta > 0$  takové, že  $\forall \mathbf{y} \in (B(\mathbf{x}, \delta) \setminus \{\mathbf{x}\}) \cap M: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x})$ ,

Analogicky definujeme *minimum* a *ostré minimum* na  $M$ , *lokální minimum* a *ostré lokální minimum* vzhledem k  $M$ .

**Definice.** Řekneme, že funkce  $f$  má v bodě  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  *lokální maximum*, má-li v  $\mathbf{x}$  lokální maximum vzhledem k nějakému okolí bodu  $\mathbf{x}$ .

Podobně pro *lokální minimum*, *ostré lokální maximum* a *ostré lokální minimum*.

**Věta 14** (o nabývání extrémů). Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je neprázdná kompaktní množina a  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá na  $M$ . Pak  $f$  nabývá na  $M$  svého maxima i minima.

**Důsledek.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je kompaktní množina a  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá na  $M$ . Pak  $f$  je omezená na  $M$ .

**Definice.** Řekneme, že funkce  $f$  o  $n$  proměnných má v bodě  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  *limitu* rovnou  $A \in \mathbb{R}^*$ , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta) \setminus \{\mathbf{a}\}: f(\mathbf{x}) \in B(A, \varepsilon).$$

*Poznámka.*

- Každá funkce má v daném bodě nejvýše jednu limitu, píšeme  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = A$ .
- $f$  je spojitá v  $\mathbf{a}$ , právě když  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$ .
- Pro limity funkcí více proměnných platí obdobné věty jako pro limity funkcí jedné proměnné (aritmetika, policajti, ...).

**Věta 15** (limita složené funkce více proměnných s podmínkou (S)). Necht'  $r, s \in \mathbb{N}$ ,  $\mathbf{a} \in M \subset \mathbb{R}^s$ ,  $\varphi_1, \dots, \varphi_r$  jsou funkce definované na  $M$  splňující  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi_j(\mathbf{x}) = b_j$ ,  $j = 1, \dots, r$ , a  $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_r] \in \mathbb{R}^r$ . Necht'  $f$  je funkce  $r$  proměnných spojitá v bodě  $\mathbf{b}$ . Definujme složenou funkci  $F: M \rightarrow \mathbb{R}$  předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \varphi_2(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in M.$$

Pak  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{b})$ .

### V.3. Parciální derivace a tečná nadrovina

**Definice.** Necht'  $f$  je funkce  $n$  proměnných,  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ . Pak číslo

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j) - f(\mathbf{a})}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j + t, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \end{aligned}$$

nazýváme *parciální derivací (prvního řádu) funkce  $f$  podle  $j$ -té proměnné v bodě  $\mathbf{a}$*  (pokud limita existuje).

—————konec 4. přednášky 2.3.2018—————

**Věta 16** (nutná podmínka lokálního extrému). *Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina,  $\mathbf{a} \in G$  a funkce  $f: G \rightarrow \mathbb{R}$  má v bodě  $\mathbf{a}$  lokální extrém. Pak pro každé  $j \in \{1, \dots, n\}$  platí:*

*Parciální derivace  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$  buď neexistuje, nebo je rovna nule.*

**Definice.** Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je neprázdná a otevřená. Necht' funkce  $f: G \rightarrow \mathbb{R}$  má v každém bodě množiny  $G$  spojitě všechny parciální derivace (tj. funkce  $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x})$  jsou spojitě na  $G$  pro všechna  $j \in \{1, \dots, n\}$ ). Pak říkáme, že funkce  $f$  je *třídy  $C^1$  na  $G$* . Množinu všech takových funkcí značíme  $C^1(G)$ .

*Poznámka.* Pokud je  $G \subset \mathbb{R}^n$  otevřená a neprázdná a  $f, g \in C^1(G)$ , pak i funkce  $f+g \in C^1(G)$ ,  $f-g \in C^1(G)$  a  $fg \in C^1(G)$ . Pokud navíc  $\forall \mathbf{x} \in G: g(\mathbf{x}) \neq 0$ , pak i  $f/g \in C^1(G)$ .

**Tvrzení 17** (slabá Lagrangeova věta). *Necht'  $n \in \mathbb{N}$ ,  $I_1, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$  jsou otevřené intervaly,  $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$ ,  $f \in C^1(I)$ ,  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in I$ . Potom existují body  $\xi^1, \dots, \xi^n \in I$ , splňující  $\xi_j^i \in \langle a_j, b_j \rangle$  pro všechna  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , takové, že*

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i)(b_i - a_i).$$

**Definice.** Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina,  $\mathbf{a} \in G$  a  $f \in C^1(G)$ . Pak graf funkce

$$T: \mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a})(x_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a})(x_2 - a_2) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a})(x_n - a_n), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

nazýváme *tečnou nadrovinou* ke grafu funkce  $f$  v bodě  $[\mathbf{a}, f(\mathbf{a})]$ .

—————konec 5. přednášky 7.3.2018—————

**Věta 18** (o tečné nadrovině). *Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina,  $\mathbf{a} \in G$ ,  $f \in C^1(G)$  a  $T$  je funkce, jejímž grafem je tečná nadrovina ke grafu funkce  $f$  v bodě  $[\mathbf{a}, f(\mathbf{a})]$ . Pak*

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - T(\mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x}, \mathbf{a})} = 0.$$

**Věta 19.** *Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená neprázdná množina a  $f \in C^1(G)$ . Pak  $f$  je spojitá na  $G$ .*

**Věta 20** (derivace složené funkce). *Necht'  $r, s \in \mathbb{N}$  a necht'  $G \subset \mathbb{R}^s$ ,  $H \subset \mathbb{R}^r$  jsou otevřené množiny. Necht'  $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in C^1(G)$ ,  $f \in C^1(H)$  a bod  $[\varphi_1(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})] \in H$  pro každé  $\mathbf{x} \in G$ . Potom složená funkce  $F: G \rightarrow \mathbb{R}$  daná předpisem*

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \varphi_2(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in G,$$

*je třídy  $C^1$  na  $G$ . Necht'  $\mathbf{a} \in G$  a  $\mathbf{b} = [\varphi_1(\mathbf{a}), \dots, \varphi_r(\mathbf{a})]$ . Pak pro  $j \in \{1, \dots, s\}$  platí*

$$\frac{\partial F}{\partial x_j}(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\mathbf{b}) \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}).$$

**Definice.** Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina,  $\mathbf{a} \in G$  a  $f \in C^1(G)$ . *Gradientem funkce  $f$  v bodě  $\mathbf{a}$*  rozumíme vektor

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left[ \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right].$$

**Definice.** Je-li  $G \subset \mathbb{R}^n$  otevřená množina,  $\mathbf{a} \in G$ ,  $f \in C^1(G)$  a  $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$ , pak bod  $\mathbf{a}$  nazýváme *stacionárním* (někdy též *kritickým*) bodem funkce  $f$ .

**Definice.** Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je neprázdná otevřená množina,  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , funkce  $f: G \rightarrow \mathbb{R}$  má v každém bodě  $G$  vlastní  $i$ -tou parciální derivaci a  $\mathbf{a} \in G$ . Parciální derivaci funkce  $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$  podle proměnné  $x_j$  v bodě  $\mathbf{a}$  značíme

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}{\partial x_j}(\mathbf{a})$$

a nazýváme ji *parciální derivací druhého řádu* funkce  $f$ . Je-li  $i = j$ , pak používáme značení  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\mathbf{a})$ .

Analogicky se definují parciální derivace vyšších řádů.

*Poznámka.* Obecně nemusí platit  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a})$ .

**Věta 21** (o záměnnosti parciálních derivací). Necht'  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  a funkce  $f$  má na okolí bodu  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  obě parciální derivace  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$  a  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ , a tyto funkce jsou v bodě  $\mathbf{a}$  spojité. Pak platí

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}).$$

—————konec 6. přednášky 9.3.2018—————

**Definice.** Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina a  $k \in \mathbb{N}$ . Řekneme, že funkce  $f$  je *třídy  $C^k$*  na  $G$ , má-li  $f$  všechny parciální derivace až do řádu  $k$  spojité na množině  $G$ . Množinu všech takových funkcí značíme  $C^k(G)$ .

Řekneme, že funkce  $f$  je *třídy  $C^\infty$*  na  $G$ , má-li  $f$  všechny parciální derivace všech řádů spojité na množině  $G$ . Množinu všech funkcí třídy  $C^\infty$  na  $G$  značíme  $C^\infty(G)$ .

#### V.4. Věta o implicitních funkcích

**Věta 22** (o implicitní funkci). Necht'  $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$  je otevřená množina,  $F: G \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\tilde{y} \in \mathbb{R}$ ,  $[\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{y}] \in G$  a necht' platí:

- (i)  $F \in C^1(G)$ ,
- (ii)  $F(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{y}) = 0$ ,
- (iii)  $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{y}) \neq 0$ .

Pak existují okolí  $U \subset \mathbb{R}^n$  bodu  $\tilde{\mathbf{x}}$  a okolí  $V \subset \mathbb{R}$  bodu  $\tilde{y}$  taková, že pro každé  $\mathbf{x} \in U$  existuje právě jedno  $y \in V$  s vlastností  $F(\mathbf{x}, y) = 0$ . Označíme-li toto  $y$  jako  $\varphi(\mathbf{x})$ , pak takto vzniklá funkce  $\varphi \in C^1(U)$  a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x}))}{\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x}))} \quad \text{pro } \mathbf{x} \in U, j \in \{1, \dots, n\}.$$

—————konec 7. přednášky 14.3.2018—————

**Věta 23** (o implicitních funkcích). Necht'  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $G \subset \mathbb{R}^{n+m}$  je otevřená množina,  $F_j: G \rightarrow \mathbb{R}$  pro  $j = 1, \dots, m$ ,  $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^m$ ,  $[\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}] = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m] \in G$  a necht' platí:

- (i)  $F_j \in C^k(G)$  pro všechna  $j \in \{1, \dots, m\}$ ,
- (ii)  $F_j(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) = 0$  pro všechna  $j \in \{1, \dots, m\}$ ,

$$(iii) \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Pak existují okolí  $U \subset \mathbb{R}^n$  bodu  $\tilde{\mathbf{x}}$  a okolí  $V \subset \mathbb{R}^m$  bodu  $\tilde{\mathbf{y}}$  taková, že pro každé  $\mathbf{x} \in U$  existuje právě jedno  $\mathbf{y} \in V$  s vlastností  $F_j(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$  pro každé  $j \in \{1, \dots, m\}$ . Označíme-li jednotlivé souřadnice tohoto  $\mathbf{y}$  jako  $\varphi_j(\mathbf{x})$ ,  $j = 1, \dots, m$ , pak takto vzniklé funkce  $\varphi_j \in C^k(U)$ .

*Poznámka.* Symbol v podmínce (iii) Věty 23 se nazývá *determinant*. Definován bude později.

Pro  $m = 1$  platí  $|a| = a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , tedy podmínka (iii) Věty 23 přechází v podmínku (iii) Věty 22.

Pro  $m = 2$  platí  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ ,  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ .

—————konec 8. přednášky 16.3.2018—————

## V.5. Lagrangeova věta o multiplikatorech

**Věta 24** (Lagrangeova věta o multiplikátoru). Necht'  $G \subset \mathbb{R}^2$  je otevřená množina,  $f, g \in C^1(G)$ ,  $M = \{[x, y] \in G; g(x, y) = 0\}$  a  $[\tilde{x}, \tilde{y}] \in M$  je bodem lokálního extrému funkce  $f$  vzhledem k množině  $M$ . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(I)  $\nabla g(\tilde{x}, \tilde{y}) = \mathbf{o}$ ,

(II) existuje reálné číslo  $\lambda \in \mathbb{R}$  splňující

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) &= 0.\end{aligned}$$

**Věta 25** (Lagrangeova věta o multiplikatorech). Necht'  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m < n$ ,  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina,  $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(G)$ ,

$$M = \{z \in G; g_1(z) = 0, g_2(z) = 0, \dots, g_m(z) = 0\}$$

a bod  $\tilde{z} \in M$  je bodem lokálního extrému funkce  $f$  vzhledem k množině  $M$ . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(I) vektory

$$\nabla g_1(\tilde{z}), \nabla g_2(\tilde{z}), \dots, \nabla g_m(\tilde{z})$$

jsou lineárně závislé,

(II) existují reálná čísla  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$  splňující

$$\nabla f(\tilde{z}) + \lambda_1 \nabla g_1(\tilde{z}) + \lambda_2 \nabla g_2(\tilde{z}) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\tilde{z}) = \mathbf{o}.$$

Poznámka.

- Pojem *lineární závislosti vektorů* bude zaveden později.  
Pro  $m = 1$  platí, že vektor je lineárně závislý, právě když je nulový.  
Pro  $m = 2$  platí, že dva vektory jsou lineárně závislé, právě když jeden z nich je násobkem druhého.
- Čísla  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  se nazývají *Lagrangeovy multiplikátory*.

—————konec 9. přednášky 21.3.2018—————

## V.6. Funkce konkávní a kvazikonkávní

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $M$  je *konvexní množina*, jestliže platí:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in M.$$

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní množina a funkce  $f$  je definována na  $M$ . Řekneme, že funkce  $f$  je

- *konkávní na  $M$* , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}),$$

- *ryze konkávní na  $M$* , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}).$$

*Poznámka.* Obrácením nerovností obdržíme definici *konvexní* a *ryze konvexní* funkce.

*Poznámka.* Funkce  $f$  je konvexní (ryze konvexní), právě když funkce  $-f$  je konkávní (ryze konkávní).

Věty v tomto oddíle jsou formulovány pro konkávní a ryze konkávní funkce, jejich zřejmé analogie platí i pro konvexní a ryze konvexní funkce.

*Poznámka.*

- Pokud je funkce  $f$  ryze konkávní na  $M$ , pak je i konkávní na  $M$ .
- Necht' funkce  $f$  je konkávní na  $M$ . Pak  $f$  je ryze konkávní na  $M$ , právě když graf  $f$  „neobsahuje úsečku“, tj.

$$\neg(\exists \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) = tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b})).$$

**Věta 26.** Necht' funkce  $f$  je konkávní na otevřené konvexní množině  $G \subset \mathbb{R}^n$ . Pak  $f$  je spojitá na  $G$ .

**Věta 27.** Necht' funkce  $f$  je konkávní na konvexní množině  $M \subset \mathbb{R}^n$ . Pak pro každé  $\alpha \in \mathbb{R}$  je množina  $Q_\alpha = \{\mathbf{x} \in M; f(\mathbf{x}) \geq \alpha\}$  konvexní.

**Věta 28** (charakterizace konkávních funkcí třídy  $C^1$ ). Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní otevřená množina a  $f \in C^1(G)$ .

(i) Funkce  $f$  je konkávní na  $G$ , právě když

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G: f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i).$$

(ii) Funkce  $f$  je ryze konkávní na  $G$ , právě když

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G, \mathbf{x} \neq \mathbf{y}: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i).$$

**Důsledek 29.** Necht'  $G \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní otevřená množina a  $f \in C^1(G)$  je konkávní na  $G$ . Je-li bod  $\mathbf{a} \in G$  stacionárním bodem funkce  $f$  (tj.  $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$ ), pak je bod  $\mathbf{a}$  bodem maxima funkce  $f$  na množině  $G$ .

**Definice.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní množina a funkce  $f$  je definována na  $M$ . Řekneme, že funkce  $f$  je

- kvazikonkávní na  $M$ , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\},$$

- ryze kvazikonkávní na  $M$ , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in (0, 1): f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

*Poznámka.* Obrácením nerovností a záměnou minima za maximum obdržíme definici kvazikonvexní a ryze kvazikonvexní funkce.

*Poznámka.* Funkce  $f$  je kvazikonvexní (ryze kvazikonvexní), právě když funkce  $-f$  je kvazikonkávní (ryze kvazikonkávní).

Věty v tomto oddíle jsou formulovány pro kvazikonkávní a ryze kvazikonkávní funkce, jejich zřejmé analogie platí i pro kvazikonvexní a ryze kvazikonvexní funkce.

*Poznámka.*

- Pokud je funkce  $f$  je ryze kvazikonkávní na  $M$ , pak je i kvazikonkávní na  $M$ .
- Necht' funkce  $f$  je kvazikonkávní na  $M$ . Pak  $f$  je ryze kvazikonkávní na  $M$ , právě když graf  $f$  „neobsahuje vodorovnou úsečku“, tj.

$$\neg(\exists \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) = f(\mathbf{a})).$$

*Poznámka.* Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní množina a  $f$  je funkce definovaná na  $M$ . Pak platí:

- Je-li  $f$  konkávní na  $M$ , pak je i kvazikonkávní na  $M$ .
- Je-li  $f$  ryze konkávní na  $M$ , pak je i ryze kvazikonkávní na  $M$ .

**Věta 30** (o jednoznačnosti extrému). Necht'  $f$  je ryze kvazikonkávní funkce na konvexní množině  $M \subset \mathbb{R}^n$ . Pokud  $f$  nabývá na  $M$  svého maxima, pak ho nabývá právě v jednom bodě.

**Důsledek.** Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní, omezená, uzavřená a neprázdná množina a  $f$  je spojitá a ryze kvazikonkávní funkce na  $M$ . Pak  $f$  nabývá maxima na  $M$  právě v jednom bodě.

—————konec 10. přednášky 23.3.2018—————

**Věta 31** (charakterizace kvazikonkávních funkcí pomocí úrovnových množin). Necht'  $M \subset \mathbb{R}^n$  je konvexní množina a  $f$  je funkce definovaná na  $M$ . Funkce  $f$  je kvazikonkávní na  $M$  právě tehdy, když pro každé  $\alpha \in \mathbb{R}$  je množina  $Q_\alpha = \{\mathbf{x} \in M; f(\mathbf{x}) \geq \alpha\}$  konvexní.

## VI. Maticový počet

### VI.1. Základní operace s maticemi

**Definice.** Tabulku

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

kde  $a_{ij} \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, m$ ,  $j = 1, \dots, n$ , nazýváme *maticí typu  $m \times n$* . Zkráceně zapisujeme  $(a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$ .

Matici typu  $n \times n$  nazýváme *čtvercovou maticí řádu  $n$* .

Množinu všech matic typu  $m \times n$  značíme  $M(m \times n)$ .

**Definice.** Necht'

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

O  $n$ -tici čísel  $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ , kde  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ , mluvíme jako o  *$i$ -tém řádku* matice  $\mathbf{A}$ .

O  $m$ -tici čísel  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ , kde  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , mluvíme jako o  *$j$ -tém sloupci* matice  $\mathbf{A}$ .

**Definice.** Řekneme, že dvě matice se rovnají, pokud jsou stejného typu a všechny odpovídající prvky se rovnají, tj. pokud  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$  a  $\mathbf{B} = (b_{uv})_{\substack{u=1..r \\ v=1..s}}$ , pak  $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ , právě když  $m = r$ ,  $n = s$  a  $a_{ij} = b_{ij} \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$ .

**Definice.** Necht'  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in M(m \times n)$ ,  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$ ,  $\mathbf{B} = (b_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Pak *součtem matic  $\mathbf{A}$  a  $\mathbf{B}$*  rozumíme matici

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

*Součinem reálného čísla  $\lambda$  a matice  $\mathbf{A}$  (též  $\lambda$ -násobkem matice  $\mathbf{A}$ )* rozumíme matici

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

**Tvrzení 32** (základní vlastnosti sčítání matic a násobení skalárem). *Platí:*

- $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in M(m \times n): \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$ , (asociativita)
- $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in M(m \times n): \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$ , (komutativita)
- $\exists! \mathbf{O} \in M(m \times n) \forall \mathbf{A} \in M(m \times n): \mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{A}$ , (existence nulového prvku)
- $\forall \mathbf{A} \in M(m \times n) \exists! \mathbf{C}_A \in M(m \times n): \mathbf{A} + \mathbf{C}_A = \mathbf{O}$ , (existence opačného prvku)
- $\forall \mathbf{A} \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda\mu)\mathbf{A} = \lambda(\mu\mathbf{A})$ ,
- $\forall \mathbf{A} \in M(m \times n): 1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$ ,
- $\forall \mathbf{A} \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A}$ ,
- $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in M(m \times n) \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}$ .

*Poznámka.*

- Matici  $\mathbf{O}$  z předešlého tvrzení říkáme *nulová matice* a všechny její prvky jsou nulové.
- Matice  $\mathbf{C}_A$  z předešlého tvrzení se nazývá *matice opačná k  $\mathbf{A}$* . Je určena jednoznačně, značíme ji  $-\mathbf{A}$  a platí  $-\mathbf{A} = (-a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$  a  $-\mathbf{A} = -1 \cdot \mathbf{A}$ .



**Definice.** Necht'  $A \in M(m \times n)$ ,  $A = (a_{is})_{\substack{i=1..m \\ s=1..n}}$ ,  $B \in M(n \times k)$ ,  $B = (b_{sj})_{\substack{s=1..n \\ j=1..k}}$ . Pak součinem matic  $A$  a  $B$  rozumíme matici  $AB \in M(m \times k)$ ,  $AB = (c_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..k}}$ , kde

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj}.$$

—————konec 11. přednášky 28.3.2018—————

**Věta 33** (vlastnosti maticového násobení). Necht'  $m, n, k, l \in \mathbb{N}$ . Pak platí:

- (i)  $\forall A \in M(m \times n) \forall B \in M(n \times k) \forall C \in M(k \times l): A(BC) = (AB)C$ , (asociativita násobení)
- (ii)  $\forall A \in M(m \times n) \forall B, C \in M(n \times k): A(B + C) = AB + AC$ , (distributivita zleva)
- (iii)  $\forall A, B \in M(m \times n) \forall C \in M(n \times k): (A + B)C = AC + BC$ , (distributivita zprava)
- (iv)  $\exists! I \in M(n \times n) \forall A \in M(n \times n): IA = AI = A$ . (existence a jednoznačnost jednotkové matice  $I$ ) Dále  $BI = B$  pro  $B \in M(m \times n)$  a  $IC = C$  pro  $C \in M(n \times k)$ ,
- (v)  $\forall A \in M(m \times n) \forall B \in M(n \times k) \forall \lambda \in \mathbb{R}: (\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$ . (násobení skalárem)

*Poznámka.* Pozor! Maticové násobení není komutativní.

**Definice.** Transponovanou maticí k matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

rozumíme matici

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{m1} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{m3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

tj. pokud  $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$ , pak  $A^T = (b_{uv})_{\substack{u=1..n \\ v=1..m}}$ , kde  $b_{uv} = a_{vu}$  pro každé  $u \in \{1, \dots, n\}$ ,  $v \in \{1, 2, \dots, m\}$ .

**Věta 34** (vlastnosti transponovaných matic). Platí:

- (i)  $\forall A \in M(m \times n): (A^T)^T = A$ ,
- (ii)  $\forall A, B \in M(m \times n): (A + B)^T = A^T + B^T$ ,
- (iii)  $\forall A \in M(m \times n) \forall B \in M(n \times k): (AB)^T = B^T A^T$ .

## VI.2. Regulární matice

**Definice.** Necht'  $A \in M(n \times n)$ . Řekneme, že  $A$  je regulární matice, pokud existuje  $B \in M(n \times n)$  taková, že

$$AB = BA = I.$$

**Definice.** Řekneme, že matice  $B \in M(n \times n)$  je inverzní maticí k matici  $A \in M(n \times n)$ , jestliže  $AB = BA = I$ .

*Poznámka.* Matice  $A \in M(n \times n)$  je regulární, právě když k ní existuje inverzní matice.

*Poznámka.*

- Necht'  $A \in M(n \times n)$  je regulární. Pak k ní existuje právě jedna inverzní matice. Značíme ji  $A^{-1}$ .
- Pokud pro matice  $A, B \in M(n \times n)$  platí  $AB = I$ , pak také  $BA = I$ .

**Věta 35** (regularita a maticové operace). Necht'  $A, B \in M(n \times n)$  jsou regulární matice. Pak platí:

- (i)  $A^{-1}$  je regulární matice a  $(A^{-1})^{-1} = A$ ,

(ii)  $\mathbf{A}^T$  je regulární matice a  $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$ ,

(iii)  $\mathbf{AB}$  je regulární matice a  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ .

—————konec 12. přednášky 4.4.2018—————

**Definice.** Necht'  $k, n \in \mathbb{N}$  a  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k \in \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že vektor  $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$  je *lineární kombinací* vektorů  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$  s koeficienty  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}^1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}^k.$$

V tomto případě také říkáme, že *lineární kombinace* vektorů  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$  s koeficienty  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  je rovna  $\mathbf{u}$ .

Pokud  $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ , pak mluvíme o *triviální lineární kombinaci* vektorů  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$ ; je-li některý koeficient nenulový, pak mluvíme o *netriviální lineární kombinaci*.

**Definice.** Řekneme, že vektory  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k \in \mathbb{R}^n$  jsou *lineárně závislé*, pokud existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je rovna nulovému vektoru. Řekneme, že vektory  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k \in \mathbb{R}^n$  jsou *lineárně nezávislé*, pokud nejsou lineárně závislé, tj. pokud platí:

kdykoli  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$  jsou taková, že  $\lambda_1 \mathbf{v}^1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}^k = \mathbf{o}$ , pak  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ .

(Mezi všemi lineárními kombinacemi vektorů  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$  je rovna nulovému vektoru jenom triviální lineární kombinace.)

*Poznámka.* Vektory  $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$  jsou lineárně závislé, právě když jeden z nich lze vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních.

**Definice.** Necht'  $\mathbf{A} \in M(m \times n)$ . *Hodností matice*  $\mathbf{A}$  rozumíme maximální počet lineárně nezávislých řádků, tj. hodnost je rovna  $k \in \mathbb{N}$ , jestliže

(i) existuje  $k$  lineárně nezávislých řádkových vektorů matice  $\mathbf{A}$  a

(ii) každá  $l$ -tice řádkových vektorů matice  $\mathbf{A}$ , kde  $l > k$ , je lineárně závislá.

Hodnost nulové matice je rovna nule. Hodnost matice  $\mathbf{A}$  značíme  $h(\mathbf{A})$ .

**Definice.** Řekneme, že matice  $\mathbf{A} \in M(m \times n)$  je *schodovitá*, jestliže pro každé  $i \in \{2, \dots, m\}$  platí, že  $i$ -tý řádek matice  $\mathbf{A}$  je nulový nebo začíná větším počtem nul než  $(i - 1)$ -ní řádek.

*Poznámka.* Hodnost schodovité matice je rovna počtu jejích nenulových řádků.

**Definice.** *Elementárními řádkovými úpravami* matice  $\mathbf{A}$  rozumíme:

(i) záměnu dvou řádků,

(ii) vynásobení řádku nenulovým číslem,

(iii) přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

**Definice.** *Transformací* budeme rozumět konečnou posloupnost řádkových elementárních úprav. Matici, která vznikne z matice  $\mathbf{A}$  aplikací transformace  $\mathcal{T}$  budeme značit  $\mathcal{T}(\mathbf{A})$ . Fakt, že  $\mathbf{B} = \mathcal{T}(\mathbf{A})$ , také budeme někdy značit takto:  $\mathbf{A} \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{B}$ .

—————konec 13. přednášky 6.4.2018—————

**Věta 36** (vlastnosti transformace).

(i) Necht'  $\mathbf{A}$  je matice. Pak existuje transformace převádějící matici  $\mathbf{A}$  na schodovitou matici.

(ii) Necht'  $\mathcal{T}_1$  je transformace aplikovatelná na matice o  $m$  řádcích. Pak existuje transformace  $\mathcal{T}_2$  aplikovatelná na matice o  $m$  řádcích taková, že pro každé dvě matice  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in M(m \times n)$  platí  $\mathbf{B} = \mathcal{T}_1(\mathbf{A})$ , právě když  $\mathbf{A} = \mathcal{T}_2(\mathbf{B})$ .

(iii) Necht'  $\mathbf{A}$  je matice a  $\mathcal{T}$  je transformace aplikovatelná na  $\mathbf{A}$ . Pak  $h(\mathcal{T}(\mathbf{A})) = h(\mathbf{A})$ .

*Poznámka.* Podobně jako jsme definovali elementární řádkové úpravy matic, můžeme definovat i elementární sloupcové úpravy matic. Lze ukázat, že elementární sloupcové úpravy nemění hodnost matice.

*Poznámka.* Lze ukázat, že pro matici  $\mathbf{A} \in M(m \times n)$  platí  $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A}^T)$ .

**Věta 37** (součin a transformace). Necht'  $\mathbf{A} \in M(m \times k)$ ,  $\mathbf{B} \in M(k \times n)$  a  $\mathcal{T}$  je transformace aplikovatelná na matice o  $m$  řádcích. Pak  $\mathcal{T}(\mathbf{AB}) = \mathcal{T}(\mathbf{A})\mathbf{B}$ .

—————konec 14. přednášky 11.4.2018—————

**Lemma 38.** Necht'  $\mathbf{A} \in M(n \times n)$  a  $h(\mathbf{A}) = n$ . Pak existuje transformace, která převádí  $\mathbf{A}$  na  $\mathbf{I}$ .

**Věta 39.** Necht'  $\mathbf{A} \in M(n \times n)$ . Pak  $\mathbf{A}$  je regulární, právě když  $h(\mathbf{A}) = n$ .

### VI.3. Determinanty

**Definice.** Necht'  $A \in M(n \times n)$ . Symbolem  $A_{ij}$  označíme matici typu  $(n-1) \times (n-1)$ , která vznikne z  $A$  vynecháním  $i$ -tého řádku a  $j$ -tého sloupce.

**Definice.** Necht'  $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$ . *Determinant matice A* definujeme takto:

$$\det A = \begin{cases} a_{11} & \text{pokud } n = 1, \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} & \text{pokud } n > 1. \end{cases}$$

Pro  $\det A$  budeme také používat symbol

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

**Věta 40.** Necht'  $j, n \in \mathbb{N}$ ,  $j \leq n$  a matice  $A, B, C \in M(n \times n)$  se shodují ve všech řádcích vyjma  $j$ -tého. Necht'  $j$ -tý řádek matice  $A$  je roven součtu  $j$ -tého řádku matice  $B$  a  $j$ -tého řádku matice  $C$ . Pak platí  $\det A = \det B + \det C$ .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1+v_1 & \dots & u_n+v_n \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1 & \dots & u_n \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ v_1 & \dots & v_n \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

—————konec 15. přednášky 13.4.2018—————

**Věta 41** (determinant a elementární transformace). Necht'  $A, A' \in M(n \times n)$ .

- (i) Jestliže matice  $A'$  vznikne z  $A$  tak, že v  $A$  jeden řádek vynásobíme reálným číslem  $\mu$ , pak platí  $\det A' = \mu \det A$ .
- (ii) Jestliže matice  $A'$  vznikne z  $A$  tak, že v  $A$  vyměníme dva řádky mezi sebou (tj. provedeme elementární řádkovou úpravu prvního druhu), pak platí  $\det A' = -\det A$ .
- (iii) Jestliže matice  $A'$  vznikne z  $A$  tak, že v  $A$  přičteme  $\mu$ -násobek jednoho řádku k jinému řádku (tj. provedeme elementární řádkovou úpravu třetího druhu), pak platí  $\det A' = \det A$ .

**Důsledek 42** (determinant a transformace). (i) Necht'  $\mathcal{T}$  je transformace aplikovatelná na matice typu  $n \times n$ . Pak existuje nenulové číslo  $\alpha_{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}$  takové, že pro každou matici  $A \in M(n \times n)$  platí  $\det \mathcal{T}(A) = \alpha_{\mathcal{T}} \det A$ .

(ii) Jestliže matice  $A'$  vznikne ze čtvercové matice  $A$  jistou transformací, pak  $\det A \neq 0$ , právě když  $\det A' \neq 0$ .

*Poznámka.* Determinant matice s nulovým řádkem je roven nule. Determinant matice, která má dva řádky shodné, je také roven nule.

**Definice.** Necht'  $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$ . Řekneme, že  $A$  je *horní trojúhelníková matice*, jestliže platí  $a_{ij} = 0$  pro  $i > j$ ,  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ . Řekneme, že  $A$  je *dolní trojúhelníková matice*, jestliže platí  $a_{ij} = 0$  pro  $i < j$ ,  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ .

**Věta 43.** Necht'  $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$  je horní (resp. dolní) trojúhelníková matice. Pak platí

$$\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

—————konec 16. přednášky 18.4.2018—————

**Věta 44.** Necht'  $A \in M(n \times n)$ . Pak  $A$  je regulární, právě když  $\det A \neq 0$ .

**Věta 45** (determinant součinu). Pro  $A, B \in M(n \times n)$  platí  $\det AB = \det A \cdot \det B$ .

**Věta 46** (determinant a transpozice). Pro  $A \in M(n \times n)$  platí  $\det A^T = \det A$ .

**Věta 47.** Necht'  $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$ ,  $k \in \{1, \dots, n\}$ . Pak

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det A_{ik} \quad (\text{rozvoj podle } k\text{-tého sloupce}),$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det A_{kj} \quad (\text{rozvoj podle } k\text{-tého řádku}).$$

## VI.4. Řešení soustav lineárních rovnic

Soustava  $m$  rovnic o  $n$  neznámých  $x_1, \dots, x_n$ :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned} \tag{S}$$

kde  $a_{ij} \in \mathbb{R}$ ,  $b_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, m$ ,  $j = 1, \dots, n$ . Maticový zápis

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

kde  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M(m \times n)$ , se nazývá *matice soustavy*,  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M(m \times 1)$  vektor pravých stran a  $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M(n \times 1)$  vektor neznámých.

**Definice.** Matici

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left( \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

nazýváme *rozšířenou maticí soustavy* (S).

**Tvrzení 48.** Necht'  $\mathbf{A} \in M(m \times n)$ ,  $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$  a  $\mathcal{T}$  je transformace matic s  $m$  řádky. Označme  $\mathbf{A}' = \mathcal{T}(\mathbf{A})$  a  $\mathbf{b}' = \mathcal{T}(\mathbf{b})$ . Pak pro  $\mathbf{y} \in M(n \times 1)$  platí  $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , právě když  $\mathbf{A}'\mathbf{y} = \mathbf{b}'$ , neboli soustavy  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$  a  $\mathbf{A}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$  mají stejnou množinu řešení.

**Věta 49** (Rouchéova-Fontenéova). Soustava (S) má řešení právě tehdy, když matice této soustavy má stejnou hodnotu jako rozšířená matice této soustavy.

—————konec 17. přednášky 20.4.2018————— **Soustavy  $n$  rovnic o  $n$  neznámých**

**Věta 50.** Necht'  $\mathbf{A} \in M(n \times n)$ . Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) matice  $\mathbf{A}$  je regulární,
- (ii) soustava (S) má pro každé  $\mathbf{b} \in M(n \times 1)$  právě jedno řešení,
- (iii) soustava (S) má pro každé  $\mathbf{b} \in M(n \times 1)$  alespoň jedno řešení.

**Věta 51** (Cramerovo pravidlo). Necht'  $\mathbf{A} \in M(n \times n)$  je regulární matice,  $\mathbf{b} \in M(n \times 1)$ ,  $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$  a  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . Pak

$$x_j = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det \mathbf{A}}$$

pro  $j = 1, \dots, n$ .

## VI.5. Matice a lineární zobrazení

**Definice.** Řekneme, že zobrazení  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  je *lineární*, pokud platí:

- (i)  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$ ,
- (ii)  $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\lambda \mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u})$ .

**Definice.** Necht'  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Vektor s  $n$  složkami

$$\mathbf{e}^i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots i\text{-tá souřadnice}$$

nazýváme  *$i$ -tým kanonickým bázovým vektorem* prostoru  $\mathbb{R}^n$ . Množinu  $\{\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n\}$  všech kanonických bázových vektorů v  $\mathbb{R}^n$  nazýváme *kanonickou bází* prostoru  $\mathbb{R}^n$ .

Vlastnosti kanonické báze:

- (i)  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n: \mathbf{x} = x_1 \cdot \mathbf{e}^1 + \dots + x_n \cdot \mathbf{e}^n$ ,
- (ii) vektory  $\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n$  jsou lineárně nezávislé.

**Věta 52** (reprezentace lineárních zobrazení). *Zobrazení  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  je lineární právě tehdy, když existuje matice  $\mathbf{A} \in M(m \times n)$  taková, že*

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u}) = \mathbf{A}\mathbf{u}.$$

*Poznámka.* Matice  $\mathbf{A}$  z předchozí věty je určena jednoznačně a nazývá se *reprezentující maticí* zobrazení  $f$ .

**Věta 53.** *Necht' zobrazení  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  je lineární. Pak jsou následující tvrzení ekvivalentní:*

- (i)  $f$  je bijekce (tj.  $f$  je prosté zobrazení  $\mathbb{R}^n$  na  $\mathbb{R}^n$ ),
- (ii)  $f$  je prosté zobrazení,
- (iii)  $f$  je zobrazení  $\mathbb{R}^n$  na  $\mathbb{R}^n$ .

—————konec 18. přednášky 25.4.2018—————

**Věta 54** (skládání lineárních zobrazení). *Necht'  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  je lineární zobrazení reprezentované maticí  $\mathbf{A} \in M(m \times n)$  a  $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$  je lineární zobrazení reprezentované maticí  $\mathbf{B} \in M(k \times m)$ . Potom složené zobrazení  $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  je lineární a je reprezentováno maticí  $\mathbf{BA}$ .*

## VII. Číselné řady

### VII.1. Základní pojmy

**Definice.** Necht'  $\{a_n\}$  je posloupnost reálných čísel. Symbol  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  nazýváme *nekonečnou řadou*. Pro  $m \in \mathbb{N}$  položme

$$s_m = a_1 + a_2 + \dots + a_m.$$

Číslo  $s_m$  nazveme *m-tým částečným součtem* řady  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . Prvek  $a_n$  budeme nazývat *n-tým členem* řady  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . *Součtem* nekonečné řady  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  nazveme limitu posloupnosti  $\{s_m\}$ , pokud tato limita existuje. Součet řady budeme značit symbolem  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . Řekneme, že řada *konverguje*, je-li její součet reálné číslo. V opačném případě řekneme, že řada *diverguje*.

**Věta 55** (nutná podmínka konvergence řady). *Jestliže řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konverguje, potom  $\lim a_n = 0$ .*

*Poznámka.* Necht'  $\alpha \in \mathbb{R}$  a řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konverguje. Pak konverguje i řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$  a platí  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . Jestliže řady  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  a  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  konvergují, pak konverguje i řada  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  a platí  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .

### VII.2. Řady s nezápornými členy a absolutní konvergence

**Věta 56** (srovnávací kritérium). *Necht'  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  a  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  jsou dvě řady splňující  $0 \leq a_n \leq b_n$  pro každé  $n \in \mathbb{N}$ .*

- (i) *Je-li  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  konvergentní, je rovněž  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergentní.*
- (ii) *Je-li  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  divergentní, je rovněž  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  divergentní.*

**Věta 57.** *Necht'  $\{a_n\}$  je posloupnost reálných čísel. Jestliže konverguje řada  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ , konverguje i řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .*

**Definice.** Řekneme, že řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  je *absolutně konvergentní*, pokud řada  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  konverguje. Je-li řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergentní, ale není absolutně konvergentní, pak ji nazýváme *neabsolutně konvergentní*.

*Poznámka.* Necht' pro každé  $n \in \mathbb{N}$  platí  $|a_n| \leq b_n$ . Jestliže je řada  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  konvergentní, je i řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergentní (dokonce absolutně konvergentní).

—————konec 19. přednášky 27.4.2018—————

**Věta 58** (limitní srovnávací kritérium). *Necht'  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  a  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  jsou řady s nezápornými členy a necht' existuje limita*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \in \mathbb{R}^*.$$

- *Je-li  $c \in (0, +\infty)$ , pak konvergence  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  je ekvivalentní konvergenci  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .*
- *Je-li  $c = 0$ , pak z konvergence  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  plyne konvergence  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .*
- *Je-li  $c = +\infty$ , pak z divergence  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  plyne divergence  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .*

**Věta 59** (Cauchyovo odmocninové kritérium). *Budiž  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  řada. Potom platí:*

- (i) *Je-li  $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ , je  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolutně konvergentní.*
- (ii) *Je-li  $\lim \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ , je  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  divergentní.*

**Věta 60** (d' Alembertovo podílové kritérium). *Budiž  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  řada s nenulovými členy. Potom platí:*

- (i) *Je-li  $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ , je  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolutně konvergentní.*
- (ii) *Je-li  $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ , je  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  divergentní.*

**Věta 61.** *Necht'  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$  konverguje právě tehdy, když  $\alpha > 1$ .*

—————konec 20. přednášky 2.5.2018—————

### VII.3. Alternující řady

**Věta 62** (Leibnizovo kritérium). *Mějme řadu  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ . Necht' platí*

- $a_n \geq a_{n+1}$  pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

*Potom  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  konverguje.*

### VII.4. Hlubší vlastnosti absolutně konvergentních řad

**Definice.** Budiž  $\{k_n\}$  posloupnost přirozených čísel taková, že každé přirozené číslo je v ní obsaženo právě jednou. Řadu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$  nazveme *přerovnáním řady  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .*

**Věta 63** (přerovnávání absolutně konvergentních řad). *Necht' řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  je absolutně konvergentní. Potom každé její přerovnání  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$  je absolutně konvergentní a platí*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}.$$

*Poznámka* (Riemannova věta). Je-li řada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  neabsolutně konvergentní, pak pro libovolné  $s \in \mathbb{R}^*$  existuje její přerovnání, jehož součet je  $s$ , a existuje její přerovnání, které nemá součet.

## VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

### VIII.1. Riemannův integrál

**Definice.** Konečnou posloupnost  $\{x_j\}_{j=0}^n$  nazýváme *dělením intervalu*  $\langle a, b \rangle$ , jestliže platí

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Body  $x_0, \dots, x_n$  nazýváme *dělicími body*.

Řekneme, že dělení  $D'$  intervalu  $\langle a, b \rangle$  je *zjemněním dělení*  $D$  intervalu  $\langle a, b \rangle$ , jestliže každý dělicí bod  $D$  je i dělicím bodem  $D'$ .

**Definice.** Necht'  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , funkce  $f$  je omezená na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a  $D = \{x_j\}_{j=0}^n$  je dělení  $\langle a, b \rangle$ . Označme

$$\overline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n M_j(x_j - x_{j-1}), \text{ kde } M_j = \sup\{f(x); x \in \langle x_{j-1}, x_j \rangle\},$$

$$\underline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n m_j(x_j - x_{j-1}), \text{ kde } m_j = \inf\{f(x); x \in \langle x_{j-1}, x_j \rangle\},$$

$$\int_a^b f = \inf\{\overline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle\},$$

$$\int_a^b f = \sup\{\underline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle\}.$$

**Definice.** Řekneme, že funkce  $f$  má *Riemannův integrál* na intervalu  $\langle a, b \rangle$ , pokud  $\int_a^b f = \int_a^b f$ . Hodnota integrálu funkce  $f$  přes interval  $\langle a, b \rangle$  je pak rovná společné hodnotě  $\int_a^b f = \int_a^b f$ . Značíme ji  $\int_a^b f$ . Pokud  $a > b$ , definujeme  $\int_a^b f = -\int_b^a f$ , v případě,

že  $a = b$ , definujeme  $\int_a^b f = 0$ .

*Poznámka.* Necht'  $D, D'$  jsou dělení intervalu  $\langle a, b \rangle$ ,  $D'$  zjemňuje  $D$  a necht'  $f$  je funkce omezená na intervalu  $\langle a, b \rangle$ . Pak platí

$$\underline{S}(f, D) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D).$$

Mějme nyní dvě dělení  $D_1, D_2$  intervalu  $\langle a, b \rangle$  a dělení  $D'$  zjemňující dělení  $D_1$  i dělení  $D_2$ . Pak platí

$$\underline{S}(f, D_1) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D_2).$$

Odtud lze snadno odvodit  $\int_a^b f \leq \int_a^b f$ .

—————konec 21. přednášky 4.5.2018—————

**Lemma 64** (kritérium existence Riemannova integrálu). *Necht'  $f$  je funkce omezená na intervalu  $\langle a, b \rangle$ .*

(a)  $\int_a^b f = I \in \mathbb{R}$  právě tehdy, když ke každému  $\varepsilon \in \mathbb{R}$ ,  $\varepsilon > 0$  existuje dělení  $D$  intervalu  $\langle a, b \rangle$  takové, že

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < I + \varepsilon.$$

(b) *Funkce  $f$  má na  $\langle a, b \rangle$  Riemannův integrál právě tehdy, když ke každému  $\varepsilon \in \mathbb{R}$ ,  $\varepsilon > 0$  existuje dělení  $D$  intervalu  $\langle a, b \rangle$  takové, že*

$$\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon.$$

**Věta 65.** (i) *Necht' funkce  $f$  má Riemannův integrál na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a necht'  $\langle c, d \rangle \subset \langle a, b \rangle$ . Pak  $f$  má Riemannův integrál i na intervalu  $\langle c, d \rangle$ .*

(ii) *Necht'  $c \in (a, b)$  a funkce  $f$  má Riemannův integrál na intervalech  $\langle a, c \rangle$  a  $\langle c, b \rangle$ . Pak  $f$  má Riemannův integrál na  $\langle a, b \rangle$  a platí*

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f. \quad (1)$$

*Poznámka.* Vzorec (1) platí pro všechna  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , pokud existuje integrál funkce  $f$  přes interval  $\langle \min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\} \rangle$ .



**Věta 66** (linearita Riemannova integrálu). *Necht'  $f$  a  $g$  jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a necht'  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Potom*

(i) *funkce  $\alpha f$  má Riemannův integrál na  $\langle a, b \rangle$  a platí*

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

(ii) *funkce  $f + g$  má Riemannův integrál na  $\langle a, b \rangle$  a platí*

$$\int_a^b f + g = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

**Věta 67.** *Necht'  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , a necht'  $f$  a  $g$  jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu  $\langle a, b \rangle$ . Potom platí:*

(i) *Je-li  $f(x) \leq g(x)$  pro každé  $x \in \langle a, b \rangle$ , pak*

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

(ii) *Funkce  $|f|$  má Riemannův integrál na  $\langle a, b \rangle$  a platí*

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

**Definice.** Řekneme, že funkce  $f$  je *stejněměrně spojitá* na intervalu  $I$ , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x, y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

**Věta 68.** *Je-li funkce  $f$  je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu  $\langle a, b \rangle$ , pak je stejněměrně spojitá na  $\langle a, b \rangle$ .*

**Věta 69.** *Necht' funkce  $f$  je spojitá na intervalu  $\langle a, b \rangle$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Pak  $f$  má Riemannův integrál na  $\langle a, b \rangle$ .*

**Věta 70.** *Necht'  $f$  je spojitá funkce na intervalu  $(a, b)$  a necht'  $c \in (a, b)$ . Označíme-li  $F(x) = \int_c^x f(t) dt$  pro  $x \in (a, b)$ , pak  $F'(x) = f(x)$  pro každé  $x \in (a, b)$ .*