

## Kapitola 9

# Determinanty

Začneme pomocnou definicí.

**Definice 9.1** *Vzájemně jednoznačné zobrazení  $p : X \rightarrow X$  nazýváme permutace na množině  $X$ . Je-li  $p$  permutace na množině  $X$ , pak inverzní zobrazení  $p^{-1} : X \rightarrow X$  nazýváme inverzní permutace k permutaci  $p$ . Jsou-li  $p, q$  dvě permutace na množině  $X$ , pak složené zobrazení, tj. permutaci,  $q \circ p : X \rightarrow X$  nazýváme složení permutací  $p$  a  $q$  (v tomto pořadí). Identické zobrazení  $\iota : X \rightarrow X$ , pro které platí  $\iota(x) = x$  pro každé  $x \in X$ , nazýváme identická permutace na množině  $X$ .*

Zřejmě platí

- $p \circ \iota = \iota \circ p = p$  pro každou permutaci  $p$  na množině  $X$ ,
- $p \circ p^{-1} = p^{-1} \circ p = \iota$  pro každou permutaci  $p$  na množině  $X$ ,
- $r \circ (q \circ p) = (r \circ q) \circ p$  pro každé tři permutace  $p, q, r$  na množině  $X$ .

Budeme se zabývat výhradně permutacemi na množině  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Množinu všech permutací na  $\{1, 2, \dots, n\}$  budeme nazývat *grupa všech permutací* na množině  $\{1, 2, \dots, n\}$  a budeme ji označovat  $S_n$ .

Permutace můžeme zapisovat různým způsobem. V případě permutací na konečné množině  $X = \{1, 2, \dots, n\}$  je můžeme zapsat pomocí tabulky. Do tabulky napíšeme do horního řádku čísla  $1, 2, \dots, n$  a pod každé číslo  $i$  napíšeme hodnotu  $p(i)$ . Tak například

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 2 & 9 & 4 & 1 & 8 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

je permutace na množině  $\{1, 2, \dots, 9\}$ .

Pokud se domluvíme, že v horním řádku budeme psát čísla vždy ve stejném pořadí  $1, 2, \dots, n$ , tak stačí zapsat pouze druhý řádek této tabulky  $(3, 5, 2, 9, 4, 1, 8, 7, 6)$ .

Permutace můžeme zapisovat rovněž graficky. V rovině si zvolíme body  $1, 2, \dots, n$ , a pokud permutace  $p$  zobrazuje prvek  $i$  do prvku  $j = p(i)$ , pak nakreslíme šipku z bodu  $i$  do bodu  $j = p(i)$ . Takovému obrázku říkáme *graf permutace*  $p$ . Graf permutace je charakterizován vlastnostmi

- z každého bodu  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  vychází právě jedna šipka, neboť hodnota  $p(i)$  je určena jednoznačně pro každý bod  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,
- do každého bodu  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  vede právě jedna šipka, neboť pro každý bod  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  existuje právě jeden bod  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  takový, že  $j = p(i)$ .

Z grafu permutace je ihned vidět, že každá permutace se skládá z několika cyklů. Tak například uvedená permutace  $p$  na množině  $\{1, 2, \dots, 9\}$  se skládá ze dvou cyklů. Jeden je na bodech  $1, 3, 2, 5, 4, 9$ , má délku 6, a druhý je na bodech  $7, 8$ , má délku 2. Permutaci tak můžeme zapsat v *cyklickém zápisu* jako

$$p = (1, 3, 2, 5, 4, 9), (7, 8).$$

Každý bod z množiny  $\{1, 2, \dots, 9\}$  se zobrazí do bodu, který v zápisu následuje těsně za ním ve stejné závorce. Poslední bod v nějaké závorce se zobrazí do prvního bodu v téže závorce.

Pro obecnou permutaci  $p$  na nějaké konečné množině  $X$  najdeme cyklus obsahující bod  $i_1 \in X$  tak, že postupně zapisujeme, kam se permutací  $p$  zobrazuje. Proto  $i_2 = p(i_1)$ ,  $i_3 = p(i_2)$ ,  $\dots$ , tj.  $i_{k+1} = p(i_k)$  pro libovolné  $k > 0$ . Protože je množina  $X$  konečná, musí se v posloupnosti  $i_1, i_2, \dots$  nějaký prvek opakovat. Označme  $k + 1$  nejmenší index takový, že  $i_{k+1}$  se rovná některému z předcházejících prvků posloupnosti  $i_1, \dots, i_k$ . To znamená, že  $p(i_k) = i_{k+1} \in \{i_1, \dots, i_k\}$ . To znamená, že  $p(i_k) = i_j$  pro nějaké  $j \leq k$ . Pokud by bylo  $j > 1$ , platilo by  $p(i_k) = p(i_{j-1}) = p_j$ . Protože  $i_{k+1}$  byl první prvek posloupnosti  $i_1, i_2, \dots$ , který se rovnal některému z předchozích prvků, bylo by  $i_k \neq i_{j-1}$ , což je ve sporu se vzájemnou jednoznačností permutace  $p$ . Proto  $j = 1$ , tj.  $p(i_k) = i_1$ . Cyklus permutace  $p$  obsahující bod  $i_1$  se proto rovná  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ . Počet jeho prvků, tj. číslo  $k$ , se nazývá *délka* tohoto cyklu. Je také dobré uvědomit si, že permutace  $p \in S_n$  se rovná identické permutaci  $i$  právě když má všechny cykly délky 1.

Cyklický zápis rovněž popisuje permutaci  $p$  jednoznačně stejně jako tabulka nebo graf. Pokud jsou v permutaci nějaké cykly délky 1, tak je obvykle

v cyklickém zápisu vynecháváme. V tom případě mluvíme o *redukovaném cyklickém zápisu* permutace. Tak například cyklický zápis permutace

$$q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

se rovná

$$q = (1), (2), (3, 4, 5, 6, 7, 8), (9)$$

a redukovaný cyklický zápis téže permutace  $q$  je

$$q = (3, 4, 5, 6, 7, 8).$$

V případě redukovaného cyklického zápisu musíme být předem domluveni, na jaké množině je permutace  $q$  definovaná.

### Skládání permutací

Nejdříve si ukážeme, jak najít tabulku složené permutace  $q \circ p$ , známe-li tabulky permutací  $p$  a  $q$ . Vezmeme například výše uvedené permutace  $p, q$ . Uděláme si tabulku o třech řádcích tak, že horní dva řádky budou tvořit tabulku permutace  $p$  a dolní dva řádky tabulku permutace  $q$ . Dostaneme tak

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 2 & 9 & 4 & 1 & 8 & 7 & 6 \\ 4 & 6 & 2 & 9 & 5 & 1 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

V každém sloupci máme pod prvkem  $i$  ve druhém řádku prvek  $p(i)$  a ve třetím řádku prvek  $q(p(i))$ . Tabulku složené permutace  $q \circ p$  nyní dostaneme tak, že vynecháme druhý řádek:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 6 & 2 & 9 & 5 & 1 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Také graf složení dvou permutací snadno získáme z grafů obou permutací. Pro obě permutace použijeme stejnou množinu bodů v rovině. Máme-li najít graf složené permutace  $q \circ p$  najdeme napřed šipku v grafu  $p$ , která vede z bodu  $i$  do bodu  $p(i)$  a potom navážeme šipkou v grafu permutace  $q$ , která vede z bodu  $p(i)$  do bodu  $q(p(i))$ . V grafu složené permutace  $q \circ p$  pak vede šipka z bodu  $i$  do bodu  $q \circ p(i) = q(p(i))$ .

O něco složitější je najít cyklický zápis a redukovaný cyklický zápis složené permutace  $q \circ p$ , známe-li odpovídající zápisy permutací  $p$  a  $q$ . Pro různé úlohy o permutacích je třeba zvolit vždy ten zápis, který je pro řešení příslušné úlohy nejvhodnější.

**Definice 9.2** Permutace  $t \in S_n$  se nazývá transpozice, pokud má jeden cyklus délky 2 a ostatní cykly délky 1.

Pro zápis transpozic používáme nejčastěji redukovaný cyklický zápis  $t = (i, j)$ .

**Lemma 9.3** Každou permutaci  $p \in S_n$ , kde  $n \geq 2$ , lze vyjádřit jako složení transpozic.

**Důkaz.** Budeme předpokládat, že  $p \neq \iota$ . V permutaci  $p$  tak existuje aspoň jeden cyklus délky aspoň 2. Označíme si jej  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ . Složíme permutaci  $p$  s transpozicí  $(i_1, i_2)$ . Dostaneme tak permutaci  $(i_1, i_2) \circ p$ . V této složené permutaci se cyklus  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$  rozpadne na dva cykly  $(i_1)$  a  $(i_2, \dots, i_k)$ , a všechny ostatní cykly zůstanou beze změny.

V permutaci  $(i_2, i_3) \circ (i_1, i_2) \circ p$  se tak původní cyklus  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$  rozpadne do tří cyklů  $(i_1)$ ,  $(i_2)$  a  $(i_3, \dots, i_k)$ . Jednoduchou indukcí podle  $k$  tak dokážeme, že v permutaci

$$(i_{k-1}, i_k) \circ (i_{k-2}, i_{k-1}) \circ \dots \circ (i_1, i_2) \circ p$$

se původní cyklus  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$  rozpadne na  $k$  cyklů délky 1 a všechny ostatní cykly permutace  $p$  zůstanou beze změny.

Opakujeme-li celý postup s dalším cyklem  $(j_1, \dots, j_l)$ , dostaneme permutaci

$$(j_{l-1}, j_l) \circ (j_{l-2}, j_{l-1}) \circ \dots \circ (j_1, j_2) \circ (i_{k-1}, i_k) \circ (i_{k_2}, i_{k-1}) \circ \dots \circ (i_1, i_2) \circ p,$$

ve které se dva cykly  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$  a  $(j_1, \dots, j_l)$  původní permutace  $p$  rozpadnou na cykly délky 1 a všechny ostatní cykly zůstávají beze změny. Postupně rozkládáme tímto způsobem další cykly permutace  $p$  na cykly délky 1, dokud nedostaneme identickou permutaci  $\iota$ . Existují proto transpozice  $t_1, \dots, t_m$ , pro které platí

$$t_m \circ \dots \circ t_1 \circ p = \iota.$$

Protože pro každou transpozici  $t$  platí  $t = t^{-1}$ , tj.  $t \circ t = \iota$ , můžeme poslední rovnost složit z transpozicí  $t_m$  zleva a dostaneme tak

$$t_{m-1} \circ \dots \circ t_1 \circ p = t_m.$$

Postupným skládáním s transpozicemi  $t_{m-1}, \dots, t_1$  zleva tak dostaneme rovnost

$$p = t_1 \circ t_2 \circ \dots \circ t_m,$$

což znamená, že jsme permutaci  $p$  vyjádřili jako složení transpozic. V případě identické permutace stačí vzít vyjádření  $\iota = t \circ t$  pro libovolnou transpozici  $t \in S_n$ .  $\square$

**Lemma 9.4** *Počet cyklů v permutaci  $p \in S_n$  a permutaci  $t \circ p$ , kde  $t \in S_n$  je libovolná transpozice, se liší o 1. Rovněž počty cyklů v permutacích  $p$  a  $p \circ t$  se liší o 1.*

**Důkaz.** Označíme  $t = (i, j)$ . Napřed budeme předpokládat, že prvky  $i, j$  leží ve stejném cyklu  $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$  permutace  $p$  a  $i = i_1, j = j_1$ . Pak platí, že v permutaci  $t \circ p$  se tento cyklus rozpadne na dva cykly  $(i_1, \dots, i_k)$  a  $(j_1, \dots, j_l)$  a ostatní cykly zůstanou beze změny. Počet cyklů v permutaci  $t \circ p$  je tak o 1 větší, než počet cyklů v permutaci  $p$ .

Jsou-li prvky  $i, j$  z různých cyklů  $(i = i_1, \dots, i_k)$  a  $(j = j_1, \dots, j_l)$  permutace  $p$ , potom ve složení  $t \circ p$  se oba cykly propojí do jednoho cyklu  $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$  a ostatní cykly zůstanou beze změny, počet cyklů v permutaci  $t \circ p$  je proto o 1 menší než počet cyklů v permutaci  $p$ .

Zcela stejně dokážeme, že také počet cyklů v permutaci  $p \circ t$  se liší o 1 od počtu cyklů v permutaci  $p$ .  $\square$

**Lemma 9.5** *Jsou-li  $p = t_1 \circ \dots \circ t_k$  a  $p = u_1 \circ \dots \circ u_l$  dvě různá vyjádření permutace  $p \in S_n$  jako složení transpozic, pak jsou obě čísla  $k, l$  buď současně sudá nebo jsou současně lichá.*

**Důkaz.** Z rovnosti  $t_1 \circ \dots \circ t_k = u_1 \circ \dots \circ u_l$  dostaneme postupným skládáním s transpozicemi  $t_1, \dots, t_k$  zleva rovnost

$$t_k \circ \dots \circ t_1 \circ u_1 \circ \dots \circ u_l = \iota.$$

To znamená, že počet cyklů v obou permutacích  $\iota$  a  $t_k \circ \dots \circ t_1 \circ u_1 \circ \dots \circ u_l$  je stejný a rovná se  $n$ . Podle předchozího Tvzení 9.4 se počet cyklů v jakékoliv permutaci změní o 1, pokud ji složíme s transpozicí. Proto musí být počet transpozic  $k + l$  ve složení  $t_k \circ \dots \circ t_1 \circ u_1 \circ \dots \circ u_l$  sudý, a tedy jsou čísla  $k, l$  buď obě sudá nebo obě lichá.  $\square$

**Definice 9.6** *Permutace  $p \in S_n$  se nazývá sudá, pokud ji lze vyjádřit jako složení sudého počtu transpozic. Nazývá se lichá, pokud ji lze vyjádřit jako složení lichého počtu transpozic. Definujeme také znaménko permutace  $p$  jako 1, pokud je  $p$  sudá permutace, a jako  $-1$ , pokud je  $p$  lichá permutace. Znaménko permutace  $p$  označujeme jako  $\text{sgn } p$ .*

**Tvrzení 9.7** Složení dvou sudých permutací nebo dvou lichých permutací je sudá permutace. Složení sudé permutace s lichou (v jakémkoliv pořadí) je lichá permutace. Speciálně, pro každou permutaci  $p \in S_n$  a každou transpozici  $t \in S_n$  platí

$$\operatorname{sgn}(t \circ p) = \operatorname{sgn}(p \circ t) = -\operatorname{sgn} p.$$

**Důkaz.** Plyne okamžitě z předchozího Tvrzení 9.5. Pokud  $p = t_1 \circ \dots \circ t_k$  a  $q = u_1 \circ \dots \circ u_l$ , pak  $q \circ p = (u_1 \circ \dots \circ u_l) \circ (t_1 \circ \dots \circ t_k)$ , permutaci  $q \circ p$  proto dostaneme jako složení  $k + l$  transpozic.  $\square$

**Lemma 9.8** Je-li  $k$  počet cyklů permutace  $p \in S_n$ , pak  $\operatorname{sgn} p = (-1)^{n-k}$ .

**Důkaz.** Permutaci  $p$  vyjádříme jako složení transpozic  $p = (t_1 \circ \dots \circ t_l) \circ \iota$ . Přidáním identické permutace  $\iota$  se složení nezmění. Identická permutace  $\iota$  má  $n$  cyklů, zatímco permutace  $p$  má  $k$  cyklů. To znamená, že číslo  $l$  musí mít stejnou paritu jako číslo  $n - k$  (to znamená, že obě čísla musí být současně sudá nebo současně lichá). Z Definice 9.6 tak plyne

$$\operatorname{sgn} p = (-1)^l = (-1)^{n-k}.$$

$\square$

**Cvičení 9.1** Dokažte, že permutace  $p \in S_n$  je sudá právě když má sudý počet cyklů sudé délky a je lichá právě když má lichý počet cyklů sudé délky.

**Úloha 9.1** Charakterizace řešitelných a neřešitelných pozic u hry "15".

## Determinanty

**Definice 9.9** Je-li  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  čtvercová matice řádu  $n$  s prvky z tělesa  $\mathbf{T}$ , pak definujeme determinant matice  $\mathbf{A}$  jako číslo

$$\det \mathbf{A} = \sum_{p \in S_n} \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \in \mathbf{T}.$$

Determinant matice  $\mathbf{A}$  označujeme rovněž  $|\mathbf{A}|$ .

Pro zjednodušení zápisu jsme v definici determinantu použili označení  $p_i = p(i)$  pro  $i = 1, 2, \dots, n$  a  $p \in S_n$ .

**Úloha 9.2** Spočítejte determinant matice řádu 2 a matice řádu 3. Spočítejte determinant horní trojúhelníkové matice.

**Řešení.** Matice řádu 2

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

má determinant  $\det \mathbf{A} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ .

Matice řádu 3

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

má determinant

$$\begin{aligned} \det \mathbf{B} &= b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} \\ &\quad - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{13}b_{22}b_{31}. \end{aligned}$$

Matice  $\mathbf{C} = (c_{ij})$  řádu  $n$  je horní trojúhelníková právě když  $c_{ij} = 0$  kdykoliv  $i > j$ . V součtu definujícím  $\det \mathbf{C}$  dostaneme pro  $p = i$  součin  $\operatorname{sgn} i \cdot c_{11}c_{22} \cdots c_{nn} = c_{11}c_{22} \cdots c_{nn}$ . Ukážeme si, že pro jakoukoliv permutaci  $p \neq i$  je součin  $c_{1p_1}c_{2p_2} \cdots c_{np_n} = 0$ . V permutaci  $p$  je aspoň jeden cyklus délky větší než 1. Ukážeme si, že v tomto cyklu existuje prvek  $j$ , pro který platí  $j > p(j)$ , a tedy  $c_{jp_j} = 0$ . Má-li tento cyklus délku  $m \geq 2$  a je-li  $i = i_1$  nějaký prvek tohoto cyklu, pak všechny ostatní prvky můžeme vyjádřit induktivně jako  $i_{k+1} = p(i_k)$  pro  $k = 1, 2, \dots, m-1$ . Kromě toho rovněž  $p(i_m) = i_1$ . Nemůže platit  $i_1 < i_2 < \cdots < i_m < i_1$ . Proto existuje  $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ , pro které platí  $i_k > p(i_k)$ . Pro toto  $j = i_k$  pak platí  $c_{jp_j} = 0$  a tedy  $\operatorname{sgn} p \cdot c_{1p_1}c_{2p_2} \cdots c_{np_n} = 0$ . Všechny členy součtu definujícího determinant  $\det \mathbf{C}$  určené permutacemi  $p \neq i$  jsou tak rovné 0, proto

$$\det \mathbf{C} = c_{11}c_{22} \cdots c_{nn}.$$

□

Absolutní hodnota determinantu reálné matice  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  řádu 2 má jasný geometrický význam. Nakreslíme-li si v rovině dva vektory  $(a_{11}, a_{12})$  a  $(a_{21}, a_{22})$ , a doplníme je na rovnoběžník, pak plocha tohoto rovnoběžníku se rovná  $|\det \mathbf{A}|$  (spočtete si to!). Číslo  $\det \mathbf{A}$  je kladné, pokud je úhel mezi vektory  $(a_{11}, a_{12})$  a  $(a_{21}, a_{22})$  měřený v kladném směru (tj. proti směru hodinových ručiček) menší než  $\pi$  a je záporný, pokud je tento úhel větší než  $\pi$ . Pokud se rovná tento úhel 0 nebo  $\pi$ , tj. jsou-li řádky matice  $\mathbf{A}$  lineárně závislé, platí  $\det \mathbf{A} = 0$ , jak se můžete sami přesvědčit přímo z definice determinantu.

Podobný geometrický význam má rovněž determinant reálné matice  $\mathbf{B} = (b_{ij})$  řádu 3. Řádkové vektory  $\mathbf{b}_1 = (b_{11}, b_{12}, b_{13})$ ,  $\mathbf{b}_2 = (b_{21}, b_{22}, b_{23})$  a  $\mathbf{b}_3 = (b_{31}, b_{32}, b_{33})$  určují v třidimenzionálním prostoru rovnoběžnostěn a jeho objem se rovná  $|\det \mathbf{B}|$ . Determinant  $\det \mathbf{B}$  je kladný, pokud je posloupnost vektorů  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  pravotočivá, tj. pokud umístíme pravou ruku tak, aby prsty ukazovaly od vektoru  $\mathbf{b}_1$  k vektoru  $\mathbf{b}_2$  ve směru, ve kterém je úhel mezi těmito vektory menší než  $\pi$ , pak palec ukazuje do poloprostoru, do kterého také míří vektor  $\mathbf{b}_3$ . Determinant  $\det \mathbf{B}$  je záporný, pokud palec ukazuje do opačného poloprostoru než kam míří vektor  $\mathbf{b}_3$ , tj. pokud je posloupnost  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  levotočivá.

V případě reálných prostorů dimenze větší než 3 můžeme naopak pomocí determinantu definovat, kdy je posloupnost vektorů  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$  pravotočivá nebo levotočivá, a co je to objem zobecněného rovnoběžnostěnu určeného vektory  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ .

**Tvrzení 9.10** Pro každou čtvercovou matici  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  řádu  $n$  platí

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}^T.$$

**Důkaz.** Označme si transponovanou matici  $\mathbf{A}^T = \mathbf{B} = (b_{ij})$ . Pro libovolnou permutaci  $p = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in S_n$  (zápis tabulkou) je součin  $a_{1p_1} a_{1p_2} \cdots a_{np_n} = b_{p_1 1} b_{p_2 2} \cdots b_{p_n n}$ . Součin  $a_{1p_1} a_{1p_2} \cdots a_{np_n}$  se při výpočtu  $\det \mathbf{A}$  vyskytuje se znaménkem  $\operatorname{sgn} p$ , zatímco tentýž součin  $b_{p_1 1} b_{p_2 2} \cdots b_{p_n n}$  odpovídá při výpočtu  $\det \mathbf{B}$  permutaci  $p^{-1}$  a má tedy znaménko  $\operatorname{sgn} p^{-1} = \operatorname{sgn} p$ . V součtech definujících  $\det \mathbf{A}$  a  $\det \mathbf{B}$  se tak vyskytují stejné součiny se stejným znaménkem, proto  $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B} = \det \mathbf{A}^T$ .  $\square$

**Tvrzení 9.11** Má-li matice  $\mathbf{A}$  řádu  $n$  dva stejné řádky, pak  $\det \mathbf{A} = 0$ .

**Důkaz.** Předpokládáme, že  $\mathbf{A}_{i*} = \mathbf{A}_{j*}$  pro  $i < j$ , tj.  $a_{ik} = a_{jk}$  pro  $k = 1, 2, \dots, n$ . Označme  $t = (i, j)$  transpozici, která prohazuje  $i$ -tý a  $j$ -tý řádek. Zvolíme libovolnou permutaci  $p \in S_n$  a podíváme se, jaké součiny v součtu definujícím  $\det \mathbf{A}$  určují permutace  $p$  a  $q = p \circ (i, j) = p \circ t$ . Platí  $q(i) = p(j)$ ,  $q(j) = p(i)$  a  $q(k) = p(k)$  pro  $k \neq i, j$ . Permutace  $p$  určuje součin

$$\operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n},$$

zatímco permutace  $q = p \circ t$  určuje součin

$$\begin{aligned} & \operatorname{sgn} q \cdot a_{1q_1} \cdots a_{iq_i} \cdots a_{jq_j} \cdots a_{nq_n} = \\ & = \operatorname{sgn} (p \circ t) \cdot a_{1q_1} \cdots a_{iq_i} \cdots a_{jq_j} \cdots a_{nq_n} = \\ & = -\operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{np_n} = \\ & = -\operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n}. \end{aligned}$$



Je  $q = p \circ t \neq p$  neboť jedna z permutací  $p, q$  je sudá a druhá lichá podle Tvzení 9.7. Součet součinů určených permutacemi  $p, q$  se tak rovná

$$\operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} + \operatorname{sgn} q \cdot a_{1q_1} \cdots a_{iq_i} \cdots a_{jq_j} \cdots a_{nq_n} = 0.$$

Celou množinu indexů, tj. symetrickou grupu  $S_n$ , rozložíme do disjunktních dvojic permutací  $\{p, p \circ t\}$ . Tyto dvojice jsou skutečně disjunktní. Z rovnosti permutací  $p = r$  plyne rovnost  $p \circ t = r \circ t$ . Podobně z rovnosti  $p \circ t = r \circ t$  vyplývá  $p = (p \circ t) \circ t = (r \circ t) \circ t = r$  a rovnost  $p = r \circ t$  platí právě když  $p \circ t = (r \circ t) \circ t = r$ . Pokud se tedy dvě dvojice  $\{p, p \circ t\}$  a  $\{r, r \circ t\}$  protínají, musí se rovnat. Celý součet

$$\sum_{p \in S_n} \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \in \mathbf{T}.$$

definující  $\det \mathbf{A}$  tak můžeme rozložit do neprotínajících se dvojic, z nichž součet každé dvojice se rovná 0. Proto také

$$\det \mathbf{A} = \sum_{p \in S_n} \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \in \mathbf{T} = 0.$$

□

**Věta 9.12** Předpokládáme, že  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  je čtvercová matice řádu  $n$  a  $\mathbf{B} = (b_{ij})$  je matice, kterou dostaneme z matice  $\mathbf{A}$  nějakou elementární řádkovou úpravou, pak

- $\det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}$ , pokud jsme  $\mathbf{B}$  dostali z  $\mathbf{A}$  prohozením dvou řádků,
- $\det \mathbf{B} = c \cdot \det \mathbf{A}$ , pokud jsme  $\mathbf{B}$  dostali z  $\mathbf{A}$  vynásobením některého řádku prvkem  $0 \neq c \in \mathbf{T}$ ,
- $\det \mathbf{B} = \det \mathbf{A}$ , pokud jsme dostali  $\mathbf{B}$  z  $\mathbf{A}$  pomocí třetí elementární řádkové úpravy.

**Důkaz.** V případě první elementární úpravy platí  $\mathbf{B}_{i*} = \mathbf{A}_{j*}$  a  $\mathbf{B}_{j*} = \mathbf{A}_{i*}$  pro nějaké indexy  $i < j$ , a  $\mathbf{B}_{k*} = \mathbf{A}_{k*}$  pro  $k \neq i, j$ . Porovnáme součin určený nějakou permutací  $p \in S_n$  v součtu definujícím  $\det \mathbf{A}$  a součin určený permutací  $q = p \circ t$  v součtu definujícím  $\det \mathbf{B}$ . Stejně jako v důkazu předchozího tvrzení označuje  $t$  transpozici  $(i, j)$ . Platí

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} q \cdot b_{1q_1} \cdots b_{iq_i} \cdots b_{jq_j} \cdots b_{nq_n} &= \operatorname{sgn}(p \circ t) \cdot a_{1p_1} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n} = \\ &= -\operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n}. \end{aligned}$$

V součtech definujících  $\det \mathbf{B}$  a  $\det \mathbf{A}$  se tak vyskytují stejné součiny, ale s opačnými znaménky. Proto  $\det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}$ .

Pro důkaz druhého tvrzení si připomeňme, že v matici  $\mathbf{B}$  platí  $\mathbf{B}_{i*} = c\mathbf{A}_{i*}$  pro nějaké  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , a  $\mathbf{B}_{k*} = \mathbf{A}_{k*}$  pro  $k \neq i$ . Platí proto  $b_{ij} = ca_{ij}$  a  $b_{kj} = a_{kj}$  pro libovolné  $j$  a  $k \neq i$ . Permutace  $p \in S_n$  tak určuje v součtu definujícím  $\det \mathbf{B}$  součin

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} p \cdot b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{ip_i} \cdots b_{np_n} &= \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots ca_{ip_i} \cdots a_{np_n} = \\ &= c \cdot \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n}. \end{aligned}$$

Součin určený permutací  $p$  v definici  $\det \mathbf{B}$  tak dostaneme ze součinu určitého stejnou permutací  $p$  v definici  $\det \mathbf{A}$  vynásobením skalárem  $c$ . Protože to platí pro každou permutaci  $p \in S_n$ , dostáváme rovnost  $\det \mathbf{B} = c \cdot \det \mathbf{A}$ .

Konečně třetí elementární úpravou k  $i$ -tému řádku matice  $\mathbf{A}$  přičítáme  $c$ -násobek  $j$ -tého řádku. Budeme opět předpokládat  $i < j$ , případ  $i > j$  se dokáže zcela stejně. V tomto případě máme  $b_{ik} = a_{ik} + ca_{jk}$  pro každé  $k = 1, 2, \dots, n$ . Dále  $b_{lk} = a_{lk}$  pro každé  $l \neq i$  a  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Permutace  $p \in S_n$  určuje v definici  $\det \mathbf{B}$  součin

$$\begin{aligned} b_{1p_1} \cdots b_{ip_i} \cdots b_{jp_j} \cdots b_{np_n} &= a_{1p_1} \cdots (a_{ip_i} + ca_{jp_i}) \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} = \\ &= a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} + a_{1p_1} \cdots (ca_{jp_i}) \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} = \\ &= a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} + c \cdot a_{1p_1} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n}. \end{aligned}$$

První sčítanec v závěrečném součtu se rovná součinu určenému permutací  $p$  v  $\det \mathbf{A}$ , zatímco druhý sčítanec se rovná  $c$ -násobku součinu určeného permutací  $p$  v determinantu matice, jejíž  $i$ -tý řádek se rovná  $j$ -tému řádku. Taková matice má determinant rovný 0 podle Tvrzení 9.11. Proto

$$\det \mathbf{B} = \sum_{p \in S_n} \operatorname{sgn} p \cdot b_{1p_1} \cdots b_{np_n} = \sum_{p \in S_n} \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} \cdots a_{np_n} = \det \mathbf{A}.$$

□

Všimněte si, že v případě, kdy charakteristika tělesa  $\mathbf{T}$  je různá od 2, plyne Tvrzení 9.11 z první části Věty 9.12. Jsou-li v matici  $\mathbf{A}$  dva řádky –  $i$ -tý a  $j$ -tý – stejné, pak prohozením těchto dvou řádků dostaneme matici  $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ . Podle první části Věty 9.12 platí  $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}$ , tj.  $\det \mathbf{A} + \det \mathbf{A} = 0$ . Protože má těleso  $\mathbf{T}$  charakteristiku různou od 2, plyne odtud  $\det \mathbf{A} = 0$ . Pouze v případě, kdy má těleso  $\mathbf{T}$  charakteristiku rovnou 2, z rovnosti  $\det \mathbf{A} + \det \mathbf{A} = 0$  nevyplývá  $\det \mathbf{A} = 0$ . V takovém případě je nutné použít Tvrzení 9.11.

**Důsledek 9.13** *Pro determinanty elementárních matic řádu  $n$  platí*

- $\det \mathbf{E}_{ij} = -1$ ,
- $\det \mathbf{E}_i(c) = c$ ,
- $\det \mathbf{E}_{ij}(d) = 1$ .

Pro každou elementární matici  $\mathbf{E}$  a libovolnou matici  $\mathbf{A}$  téhož řádu  $n$  platí

$$\det \mathbf{EB} = \det \mathbf{E} \cdot \det \mathbf{B}.$$

**Důkaz.** Každou elementární matici dostaneme z jednotkové matice  $\mathbf{I}$  odpovídající elementární řádkovou úpravou. Protože  $\det \mathbf{I} = 1$  neboť jednotková matice je horní trojúhelníková, plynou dodnoty determinantů všech elementárních matic z Věty 9.12.

Odtud rovněž plyne druhá část důsledku za využití Věty 9.12.  $\square$

**Věta 9.14** Čtvercová matice  $\mathbf{A}$  je regulární právě když  $\det \mathbf{A} \neq 0$ .

**Důkaz.** Podle Důsledku 9.13 platí rovnost

$$\det(\mathbf{EB}) = \det \mathbf{E} \cdot \det \mathbf{B}$$

pro každou elementární matici  $\mathbf{E}$  a čtvercovou matici  $\mathbf{B}$  stejného řádu  $n$ . Matici  $\mathbf{A}$  převedeme Gaussovou eliminací pomocí elementárních řádkových úprav do matice  $\mathbf{D}$  v řádkově odstupňovaném tvaru. To znamená, že existují elementární matice  $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_k$ , pro které platí  $\mathbf{D} = \mathbf{E}_k \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{A}$ . S využitím předchozí rovnosti dostáváme

$$\begin{aligned} \det \mathbf{D} = \det(\mathbf{E}_k \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{A}) &= \det \mathbf{E}_k \cdot \det(\mathbf{E}_{k-1} \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{A}) = \\ &= \det \mathbf{E}_k \cdot \det \mathbf{E}_{k-1} \cdot \det(\mathbf{E}_{k-2} \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{A}) = \\ &\quad \vdots \\ &= \det \mathbf{E}_k \cdot \det \mathbf{E}_{k-1} \cdots \det \mathbf{E}_1 \cdot \det \mathbf{A}. \end{aligned}$$

Determinanty elementárních matic jsou nenulové podle Důsledku 9.13, platí proto

$$\det \mathbf{A} \neq 0 \quad \text{právě když} \quad \det \mathbf{D} \neq 0.$$

Podle Věty 3.9 je matice  $\mathbf{A}$  regulární právě když  $\mathbf{D}$  neobsahuje žádný nulový řádek, což je právě když  $\det \mathbf{D} \neq 0$ , neboť matice  $\mathbf{D}$  je horní trojúhelníková matice, a to je podle právě dokázané ekvivalence právě když  $\det \mathbf{A} \neq 0$ .  $\square$

Pomocí předchozí věty snadno dokážeme následující důležitou větu o součinu determinantů.

**Věta 9.15** Pro každé dvě čtvercové matice  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  řádu  $n$  platí

$$\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$$

**Důkaz.** Je-li matice  $\mathbf{A}$  singulární, platí  $r(\mathbf{A}) < n$ , a proto také podle Důsledku 6.20  $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A}) < n$ , součin  $\mathbf{AB}$  je proto také singulární matice. Z rovnosti  $\det \mathbf{A} = 0$  tak plyne  $\det(\mathbf{AB}) = 0$  a dokazovaná rovnost  $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$  tak platí v případě, že  $\mathbf{A}$  je singulární matice.

Pokud je  $\mathbf{A}$  regulární matice, můžeme ji podle Tvrzení 3.12 vyjádřit jako součin elementárních matic  $\mathbf{A} = \mathbf{E}_k \cdots \mathbf{E}_1$ . Potom platí

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{AB}) &= \det(\mathbf{E}_k \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{B}) = \det \mathbf{E}_k \cdots \det \mathbf{E}_1 \cdot \det \mathbf{B} = \\ &= \det(\mathbf{E}_k \cdots \mathbf{E}_1) \cdot \det \mathbf{B} = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}. \end{aligned}$$

□

Nyní se budeme věnovat základní metodě výpočtu determinantů – rozvoji determinantu podle řádku případně podle sloupce.

**Definice 9.16** Je-li  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  čtvercová matice řádu  $n$ , pak pro  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$  označujeme  $\mathbf{M}_{ij}$  čtvercovou matici řádu  $n - 1$ , kterou dostaneme z  $\mathbf{A}$  vynecháním  $i$ -tého řádku a  $j$ -tého sloupce. Nazýváme ji minor matice  $\mathbf{A}$  odpovídající místu  $(i, j)$ . Číslo  $m_{ij} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{M}_{ij}$  nazýváme kofaktor matice  $\mathbf{A}$  určený místem  $(i, j)$ . Matici  $\mathbf{M} = (m_{ij})$  nazýváme kofaktorová matice určená maticí  $\mathbf{A}$  a transponovanou maticí  $\mathbf{M}^T$  nazýváme adjungovaná matice k matici  $\mathbf{A}$ . Adjungovanou maticí k matici  $\mathbf{A}$  budeme označovat  $\text{adj } \mathbf{A}$ .

**Věta 9.17** Pro každou čtvercovou matici  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  řádu  $n$  a každé  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$  platí

- $\det \mathbf{A} = a_{i1}m_{i1} + a_{i2}m_{i2} + \cdots + a_{in}m_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}m_{ik},$
- $\det \mathbf{A} = a_{1j}m_{1j} + a_{2j}m_{2j} + \cdots + a_{nj}m_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{kj}m_{kj}.$

**Důkaz.** Dokážeme první z obou tvrzení o rozvoji determinantu podle  $i$ -tého řádku. Druhé tvrzení o rozvoji determinantu podle  $j$ -tého sloupce pak vyplyne z rozvoje podle  $j$ -tého řádku a z Tvrzení 9.10.

Začneme tím, že se podíváme na všechny součiny v součtu definujícím  $\det \mathbf{A}$ , které obsahují činitele  $a_{nn}$ . Tyto součiny jsou určeny permutacemi  $p \in S_n$ , pro které platí  $p(n) = n$ . Každý takový součin má tvar

$$\text{sgn } p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{n-1p_{n-1}} a_{nn}.$$

Součet všech těchto součinů se potom rovná

$$\sum_{p(n)=n} \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{n-1p_{n-1}} a_{nn} = a_{nn} \cdot \sum_{p(n)=n} \operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{n-1p_{n-1}}.$$

Pokud každou permutaci  $p \in S_n$ , pro kterou platí  $p(n) = n$ , zúžíme na množinu  $\{1, 2, \dots, n-1\}$ , dostaneme permutaci  $q \in S_{n-1}$ . Permutace  $q$  působí na množině, která má o jeden prvek méně, a sama má také o jeden cyklus méně, než permutace  $p$ . Proto  $\operatorname{sgn} q = \operatorname{sgn} p$ . Každou permutaci  $q \in S_{n-1}$  můžeme naopak jednoznačně rozšířit do permutace  $p \in S_n$  tak, že dodefinujeme  $p(n) = n$ . Každý člen  $\operatorname{sgn} p \cdot a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{n-1p_{n-1}}$  v druhém součtu v poslední rovnosti se proto rovná  $\operatorname{sgn} q \cdot a_{1q_1} a_{2q_2} \cdots a_{n-1q_{n-1}}$ , kde  $q$  je zúžení permutace  $p$  na množinu  $\{1, 2, \dots, n-1\}$ . Druhá suma v poslední rovnosti se proto rovná

$$\sum_{q \in S_{n-1}} \operatorname{sgn} q \cdot a_{1q_1} a_{2q_2} \cdots a_{n-1q_{n-1}} = \det \mathbf{M}_{nn},$$

součet všech součinů v  $\det \mathbf{A}$  obsahujících prvek  $a_{nn}$  se tak rovná součinu  $a_{nn} \cdot \det \mathbf{M}_{nn}$ .

Nyní se podíváme, jak vypadají všechny součiny v  $\det \mathbf{A}$  obsahující prvek  $a_{ij}$ . K tomu účelu postupně zaměníme  $i$ -tý řádek matice  $\mathbf{A}$  s  $(i+1)$ -ním řádkem, potom s  $(i+2)$ -hým řádkem, atd. až s  $n$ -tým řádkem. Dostaneme tak matici, jejíž  $n$ -tý řádek se rovná  $i$ -tému řádku matice  $\mathbf{A}$  a pořadí ostatních řádků se nezměnilo. Speciálně, prvek na místě  $(n, j)$  nové matice se rovná  $a_{ij}$ .

Dále pokračujeme tak, že postupně prohazujeme  $j$ -tý sloupec s  $(j+1)$ -ním sloupcem, pak s  $(j+2)$ -hým sloupcem, a tak dále až nakonec s  $n$ -tým sloupcem. Dostaneme tak nakonec matici  $\mathbf{B} = (b_{ij})$ , pro kterou platí  $b_{nn} = a_{ij}$ , a dále minor  $\mathbf{N}_{nn}$  matice  $\mathbf{B}$  odpovídající místu  $(n, n)$  se rovná minoru  $\mathbf{M}_{ij}$  matice  $\mathbf{A}$  odpovídajícímu místu  $(i, j)$ . Součet všech součinů v  $\det \mathbf{B}$  obsahujících prvek  $b_{nn}$  se podle předchozích dvou odstavců proto rovná  $b_{nn} \cdot \det \mathbf{N}_{nn} = a_{ij} \cdot \det \mathbf{M}_{ij}$ .

Matici  $\mathbf{B}$  jsme dostali z matice  $\mathbf{A}$  pomocí  $n-i+1$  elementárních řádkových úprav prvního druhu a dále pomocí  $n-j+1$  elementárních sloupcových úprav prvního druhu. Každá z těchto úprav mění znaménko  $\det \mathbf{A}$  podle Věty 9.12 a Tvrzení 9.10, platí proto

$$\det \mathbf{B} = (-1)^{2n-i-j-2} \det \mathbf{A} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{A}.$$

Protože  $\det \mathbf{A} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{B}$ , součet všech součinů v  $\det \mathbf{A}$  obsahujících prvek  $a_{ij}$  se proto rovná součtu všech součinů v  $\det \mathbf{B}$  obsahujících

prvek  $b_{nn} = a_{ij}$  s koeficientem  $(-1)^{i+j}$ . Podle předchozího odstavce se tak součet všech součinů v  $\det \mathbf{A}$  obsahujících  $a_{ij}$  rovná

$$(-1)^{i+j} b_{nn} \cdot \det \mathbf{N}_{nn} = a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \det \mathbf{M}_{ij} = a_{ij} m_{ij},$$

kde  $m_{ij}$  je podle Definice 9.10 kofaktor matice  $\mathbf{A}$  určený místem  $(i, j)$ .

Protože v každém součinu v součtu definujícím  $\det \mathbf{A}$  se vyskytuje právě jeden prvek z  $i$ -tého řádku matice  $\mathbf{A}$ , platí

$$\det \mathbf{A} = a_{i1}m_{i1} + a_{i2}m_{i2} + \dots + a_{in}m_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}m_{ik} = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det \mathbf{M}_{ik}.$$

□

**Úloha 9.3** Spočítejte determinant Vandermondovy matice a rozhodněte, kdy je Vandermondova matice regulární.

**Řešení.** Označíme

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \begin{vmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & \dots & t_0^n \\ 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_n & t_n^2 & \dots & t_n^n \end{vmatrix}$$

determinant Vandermondovy matice řádu  $n$  určené prvky  $t_0, t_1, \dots, t_n \in \mathbf{T}$ . Pokud se dva z prvků  $t_0, t_1, \dots, t_n$  rovnají, má Vandermondova matice dva stejné řádky a její determinant se proto rovná 0 podle Tvzení 9.11. Budeme proto nadále předpokládat, že všechny prvky  $t_0, t_1, \dots, t_n$  jsou navzájem různé.

Napřed odečteme první řádek od všech ostatních. Determinant se podle Věty 9.12 nezmění, dostaneme tak

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \begin{vmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & \dots & t_0^n \\ 0 & t_1 - t_0 & t_1^2 - t_0^2 & \dots & t_1^n - t_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & t_n - t_0 & t_n^2 - t_0^2 & \dots & t_n^n - t_0^n \end{vmatrix}.$$

Nyní determinant rozvineme podle prvního sloupce a dostaneme vyjádření

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \begin{vmatrix} t_1 - t_0 & t_1^2 - t_0^2 & \dots & t_1^n - t_0^n \\ t_2 - t_0 & t_2^2 - t_0^2 & \dots & t_2^n - t_0^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_n - t_0 & t_n^2 - t_0^2 & \dots & t_n^n - t_0^n \end{vmatrix}.$$

Dále použijeme známý algebraický rozklad

$$t_i^j - t_0^j = (t_i - t_0)(t_i^{j-1} + t_i^{j-2}t_0 + \cdots + t_it_0^{j-2} + t_0^{j-1}) = (t_i - t_0)c_{ij},$$

kde jsme pro jednoduchoost označili

$$c_{ij} = t_i^{j-1} + t_i^{j-2}t_0 + \cdots + t_it_0^{j-2} + t_0^{j-1} = \sum_{k=0}^{j-1} t_i^k t_0^{j-1-k}.$$

Speciálně platí  $c_{i1} = 1$  pro libovolné  $i = 1, \dots, n$ . S použitím tohoto označení dostáváme

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \begin{vmatrix} (t_1 - t_0)c_{11} & (t_1 - t_0)c_{12} & \cdots & (t_1 - t_0)c_{1n} \\ (t_2 - t_0)c_{21} & (t_2 - t_0)c_{22} & \cdots & (t_2 - t_0)c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (t_n - t_0)c_{n1} & (t_n - t_0)c_{n2} & \cdots & (t_n - t_0)c_{nn} \end{vmatrix}.$$

Z  $i$ -tého řádku můžeme vytknout  $t_i - t_0$  pro každé  $i = 1, \dots, n$  a dosadit  $c_{i1} = 1$ , proto

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \prod_{i=1}^n (t_i - t_0) \begin{vmatrix} 1 & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 1 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

Nyní  $c_{i2} = t_i + t_0$  pro každé  $i = 1, \dots, n$ . Pokud tedy odečteme od druhého sloupce  $t_0$ -násobek prvního sloupce, dostaneme

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \prod_{i=1}^n (t_i - t_0) \begin{vmatrix} 1 & t_1 & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\ 1 & t_2 & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_n & c_{n3} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

Podobně  $c_{i3} = t_i^2 - t_it_0 + t_0^2$  pro každé  $i = 1, \dots, n$ . Odečteme tedy od třetího sloupce  $t_0^2$ -násobek prvního sloupce a  $t_0$ -násobek druhého sloupce. Potom

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \prod_{i=1}^n (t_i - t_0) \begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & c_{14} & \cdots & c_{1n} \\ 1 & t_2 & t_2^2 & c_{24} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 1 & t_n & t_n^2 & c_{n4} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

Postupně tak dostaneme

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \prod_{i=1}^n (t_i - t_0) \cdot V_{t_1, \dots, t_n}$$

Poslední výraz je rekurentní formule, pomocí které již vypočítáme hodnotu  $V_{t_0, t_1, \dots, t_n}$  Vandermonodova determinantu řádu  $n + 1$ . Začneme hodnotami pro malá  $n$ .

$$V_{t_0} = 1, \quad V_{t_0, t_1} = t_1 - t_0, \quad V_{t_0, t_1, t_2} = (t_2 - t_0)(t_2 - t_1)(t_1 - t_0).$$

Pokud induktivně předpokládáme, že

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_{n-1}} = \prod_{\substack{i>j \\ i, j=0, \dots, n-1}} (t_i - t_j),$$

potom pomocí již dokázané rekurentní formule dostaneme

$$\begin{aligned} V_{t_0, t_1, \dots, t_n} &= \left( \prod_{i=1}^n (t_i - t_0) \right) V_{t_1, \dots, t_n} = \prod_{i=1}^n (t_i - t_0) \prod_{\substack{i>j \\ i, j=1, \dots, n}} (t_i - t_j) = \\ &= \prod_{\substack{i>j \\ i, j=0, \dots, n}} (t_i - t_j). \end{aligned}$$

Tím je hodnota Vandermonodova determinantu dokázána pomocí matematické indukce. Všimněte si, že rovnost

$$V_{t_0, t_1, \dots, t_n} = \prod_{\substack{i>j \\ i, j=0, \dots, n}} (t_i - t_j)$$

platí i v případě, kdy se dva z prvků  $t_0, t_1, \dots, t_n \in \mathbf{T}$  rovnají. Vandermonodova matice je tak regulární právě když jsou prvky  $t_0, t_1, \dots, t_n \in \mathbf{T}$  navzájem různé.  $\square$

**Tvrzení 9.18** *Je-li  $\mathbf{A}$  regulární matice, pak*

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \text{adj } \mathbf{A}.$$

**Důkaz.** Adjungovaná matice  $\text{adj } A = (n_{ij})$ , kde  $n_{ij} = m_{ji}$ , minor matice  $\mathbf{A}$  určený místem  $(j, i)$ . V součinu  $\mathbf{A} \cdot \text{adj } \mathbf{A}$  se prvek na místě  $(i, i)$  na hlavní diagonále rovná součtu

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} n_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ik} m_{ik} = \det \mathbf{A}$$



podle Věty 9.17. Prvek na místě  $(i, j)$  mimo hlavní diagonálu v součinu  $\mathbf{A} \cdot \text{adj } \mathbf{A}$ , tj. pro  $i \neq j$ , se rovná

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} n_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} m_{jk}.$$

Poslední součet se rovná rozvoji determinantu podle  $i$ -tého řádku v matici, kterou dostaneme z matice  $\mathbf{A}$  nahrazením  $j$ -tého řádku  $\mathbf{A}_{j*}$  řádkem  $\mathbf{A}_{i*}$ . Minory  $m_{jk}$  pro  $k = 1, \dots, n$  se tak nezmění a nová matice má dva stejné řádky. Její determinant se proto rovná 0 podle Tvzení 9.11. Proto platí rovněž

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} m_{jk} = 0.$$

Součin  $\mathbf{A} \cdot \text{adj } \mathbf{A}$  má proto nenulové prvky pouze na hlavní diagonále, a ty se všechny rovnají  $\det \mathbf{A}$ . Platí tak  $\mathbf{A} \cdot \text{adj } \mathbf{A} = \det \mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_n$ , neboli

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \text{adj } \mathbf{A}.$$

□

A nakonec vzoreček pro řešení soustavy lineárních rovnic s regulární maticí. Tomuto vzorečku se říká *Cramerovo pravidlo*.

**Tvrzení 9.19** *Je-li  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$  soustava  $n$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých s regulární maticí  $\mathbf{A}$ , pak pro  $j = 1, 2, \dots, n$  platí*

$$x_j = \frac{\det \mathbf{A}_j}{\det \mathbf{A}},$$

kde  $\mathbf{A}_i = [\mathbf{A}_{*1} | \dots | \mathbf{A}_{*j-1} | \mathbf{b} | \mathbf{A}_{*j+1} | \dots | \mathbf{A}_{*n}]$  je matice, kterou dostaneme z matice  $\mathbf{A}$  nahrazením  $i$ -tého sloupce sloupcem pravých stran  $\mathbf{b}$ .

**Důkaz.** Soustava má jediné řešení  $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ . Dosadíme za inverzní matici  $\mathbf{A}^{-1}$  její vyjádření podle předchozí Věty 9.18

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \text{adj } \mathbf{A}.$$

Dostaneme tak rovnost

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \text{adj } \mathbf{A} \cdot \mathbf{b}.$$

Pro  $j$ -tou souřadnici řešení  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$  pak platí

$$x_j = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot [\text{adj } \mathbf{A}]_{j*} \mathbf{b} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \sum_{k=1}^n m_{kj} b_k,$$

kde  $b_k$  je  $k$ -tá souřadnice vektoru  $\mathbf{b}$  pravých stran. Součet

$$\sum_{k=1}^n b_k m_{kj}$$

je rozvojem podle  $j$ -tého sloupce determinantu matice  $\mathbf{A}_j$ , kterou dostaneme z matice  $\mathbf{A}$  nahrazením sloupce  $\mathbf{A}_{*j}$  vektorem pravých stran  $\mathbf{b}$ .  $\square$