

## 5. PERMUTACE A DETERMINANTY

**5.1.** Zapište v cyklickém zápisu a redukovaném cyklického zápisu permutace  $p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 6 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in S_6$ .

Postupně vyčerpáme všechny prvky z množiny  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , abychom zapsali cykly permutací  $p = (13)(246)(5)$  a  $q = (1)(2365)(4)$ . V redukovaném cyklickém zápisu vynecháme všechny jednocykly, tedy pevné body daného zobrazení, a proto  $p = (13)(246)$  a  $q = (2365)$ .  $\square$

**5.2.** Mějme permutace  $p = (1298)(36)(574)$  a  $q = (34875)$  z množiny  $S_9$  v redukovaném cyklickém zápisu. Určete jejich maticový zápis.

Z cyklického zápisu permutace  $p$  vidíme, že  $p(1) = 2$ ,  $p(2) = 9$ ,  $p(9) = 8$ ,  $p(8) = 1$ ,  $p(3) = 6$ ,  $p(6) = 3$ ,  $p(5) = 7$ ,  $p(7) = 4$  a  $p(4) = 5$ . Nyní snadno tyto údaje zaznamenejme do matice

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 9 & 6 & 5 & 7 & 3 & 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Snadno rozšíříme redukovaný cyklický zápis permutace  $q$  na neredukovaný zápis  $q = (34875)(1)(2)(6)(9)$  a obdobným způsobem jako u permutace  $p$  najdeme matici

$$q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 3 & 6 & 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

 $\square$ 

**5.3.** Nechť  $p = (135)(4798)(26)$  a  $q = (18)(247693)$  jsou dvě permutace z  $S_9$ . Určete permutace  $p \circ q$ ,  $q \circ p$ .

Přímo použitím definice snadno zjistíme hodnoty (skládáme zprava doleva):

$$p \circ q = (1495)(27)(368), \quad q \circ p = (129)(3587)(46).$$

 $\square$ 

**5.4.** Napište permutace  $p = (13475)$  a  $q = (19)(267)(3548)$  z  $S_9$  jako součin transpozic.

Připomeňme, že transpozice je permutace, která vyměňuje právě dva prvky, tj. můžeme ji v redukovaném cyklickém zápisu zapsat ve tvaru  $(ab)$ . Řešení úlohy pro permutaci  $p$  je zřejmé z Věty 6.9, konkrétně

$$(13475) = (15) \circ (17) \circ (14) \circ (13) = (13) \circ (34) \circ (47) \circ (75).$$

Přímo z definice cyklického zápisu vidíme, že  $(19)(267)(3548) = (19) \circ (267) \circ (3548)$ , tedy nejprve úlohu vyřešíme pro každý z cyklů  $(19)$ ,  $(267)$  a  $(3548)$  pomocí Věty 6.9 a poté nalezené transpozice složíme, tedy

$$(19)(267)(3548) = (19) \circ (267) \circ (3548) =$$

$$= (19) \circ (27) \circ (26) \circ (38) \circ (34) \circ (35) = (19) \circ (26) \circ (67) \circ (35) \circ (54) \circ (48).$$

□

**5.5.** Určete znaménka permutací  $p$  a  $q$  z předchozí úlohy.

Podle definice má permutace znaménko 1 (tj. jde o sudou permutaci), právě když ji můžeme napsat jako součin sudého počtu transpozic a permutace má znaménko  $-1$  (tj. je to lichá permutace), můžeme-li ji napsat jako součin lichého počtu transpozic. V předchozím příkladu jsme vyjádřili permutaci  $p$  jako součin 4 transpozic, proto  $\text{zn}p = 1$ . Permutaci  $q$  jsme dostali jako součin 6 transpozic, tedy opět  $\text{zn}p = 1$ . □

**5.6.** Určete znaménka permutací  $(17)(36)(2458)$ ,  $(245)(3687)$ ,  $(13)(2675) \in S_8$ .

Ke zjištění znamének permutací tentokrát užijeme Větu 6.15 z přednášky, která říká, že znaménko permutace je rovno znaménku součinu nezávislých cyklů a znaménko cyklu liché délky je 1 a znaménko cyklu sudé délky je  $-1$ . To znamená, že

$$\text{zn}((17)(36)(2458)) = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1,$$

$$\text{zn}((245)(3687)) = 1 \cdot (-1) = -1,$$

$$\text{zn}((13)(2675)) = (-1) \cdot (-1) = 1.$$

□

**5.7.** Spočítejte  $((135)(4798)(26))^{-1}$  a  $((18)(247693))^{-1}$  pro permutace z  $S_9$ .

Při hledání inverzních permutací si uvědomme, že stačí cykly (redukovaného) cyklického zápisu původních permutací „zrcadlově převrátit“, tedy

$$((135)(4798)(26))^{-1} = (531)(8974)(62), \quad ((18)(247693))^{-1} = (81)(396742).$$

□

**5.8.** Spočítejte nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  determinant matice  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Postupujeme přímo podle definice. Rozmyslíme si, že  $S_2 = \{\text{Id}, (12)\}$ . a proto  $\det(\mathbf{A}) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$  nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ . Obvyklá úvaha o počítání v tělesech  $\mathbf{Z}_p$  nám umožní využít výsledku spočítaného v tělese reálných (či racionálních) čísel, který nakonec stačí upravit modulo  $p$ . To znamená, že  $\det(\mathbf{A}) = (5) \bmod 5 = 0$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det(\mathbf{A}) = (5) \bmod 7 = 5$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$ . □

9./15.12.

**5.9.** Spočítejte nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  determinant matice  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ .

I tentokrát budeme fakticky postupovat podle definice. Sudým permutacím Id, (123) a (132) z  $S_3$  odpovídají po řadě součiny  $1 \cdot 0 \cdot 1$ ,  $2 \cdot 3 \cdot 2$  a  $1 \cdot 4 \cdot 3$  (vždy bereme

nejprve hodnotu z prvního řádku, poté z druhého a nakonec z třetího) a lichým permutacím (12), (13) a (23) odpovídají součiny  $2 \cdot 4 \cdot 1$ ,  $1 \cdot 0 \cdot 2$  a  $1 \cdot 3 \cdot 3$ , proto

$$\det(\mathbf{B}) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \cdot 3 - (2 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot 3).$$

Tedy  $\det(\mathbf{B}) = 7$  nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\det(\mathbf{B}) = 2$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det(\mathbf{B}) = 0$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$ .  $\square$

**5.10.** Určete nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  determinanty matic

$$\mathbf{C}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{C}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinant matice  $\mathbf{C}_1 = (c_{ij})$  můžeme opět spočítat podle definice, uvědomíme-li si, že pro každou neidentickou permutaci  $\sigma \in S_5$  bude existovat aspoň jedno  $j$ , pro něž  $j > \sigma(j)$ , a proto  $c_{j\sigma(j)} = 0$  a  $c_{1\sigma(1)} \cdots c_{5\sigma(5)} = 0$ . Tedy determinant Gaussovy čtvercové matice  $\mathbf{C}_1$  je právě součin hodnot na hlavní diagonále, tj.  $\det(\mathbf{C}_1) = 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 2 = 48$  nad tělesy  $\mathbf{Q}$  a  $\mathbf{R}$ ,  $\det(\mathbf{C}_1) = (48) \bmod 5 = 3$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det(\mathbf{C}_1) = (48) \bmod 7 = 6$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$ .

Nyní si všimněme, že matici  $\mathbf{C}_2$  dostaneme z matice  $\mathbf{C}_1$  výměnou 1. a 4. řádku. Proto podle Věty 7.6 je  $\det(\mathbf{C}_2) = -\det(\mathbf{C}_1)$ , tudíž  $\det(\mathbf{C}_2) = -48$  nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\det(\mathbf{C}_2) = (-48) \bmod 5 = 2$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det(\mathbf{C}_2) = (-48) \bmod 7 = 1$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$ .  $\square$

**5.11.** Spočítejte nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  determinant matice  $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

Připomeňme, že Věty 7.6, 7.12 a 7.14 nám říkají, jak se změní determinant matice, provedeme-li některou z řádkových úprav. V předchozí úloze jsme si navíc uvědomili, že je velmi snadné určit determinant Gaussovy matice jako součin hodnot na hlavní diagonále. Budeme-li tedy standardními prostředky pomocí elementárních úprav řádků převádět matici  $\mathbf{D}$  na její Gaussovu matici, budeme v každém kroku znát, jak jsme původní determinant změnili. Tedy upravujeme a počítáme:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{D}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 1 = 5. \end{aligned}$$

Tedy zjistili jsme, že  $\det(\mathbf{D}) = 5$  nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\det(\mathbf{D}) = 0$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det(\mathbf{D}) = 5$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$ .  $\square$

**5.12.** Spočítejte nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  determinant matice  $\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ .

Tentokrát k výpočtu použijeme Větu 7.11 a budeme determinant rozvíjet podle 2. řádku:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{G}) &= (-1)^{2+1} \cdot 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} + \\ &+ (-1)^{2+3} \cdot 3 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} + (-1)^{2+4} \cdot 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= -3 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = -3 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 4 \cdot 2) = 18. \end{aligned}$$

Tedy jako obvykle  $\det(\mathbf{G}) = 18$  nad  $\mathbf{Q}$  a  $\mathbf{R}$ ,  $\det(\mathbf{G}) = 3$  nad  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det(\mathbf{G}) = 4$  nad  $\mathbf{Z}_7$ .  $\square$

Poznamenejme, že jsme determinanty ani další členy rozvoje, které přísluší nulovému prvku z řádku, podle nějž determinant rozvíjíme, vůbec nemuseli psát. Navíc si uvědomme, že tato metoda je vhodná právě v případě, kdy některý z řádků (nabo sloupců, využijeme-li pozorování  $\det(\mathbf{G}) = \det(\mathbf{G}^T)$  Věty 7.3) obsahuje „hodně“ nul.

16./22.12.

**5.13.** Spočítejte determinant matice  $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 7 & 5 & -9 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}$  nad tělesem

racionálních čísel.

V matici  $\mathbf{H}$  sice žádný řádek ani sloupec neobsahuje větší počet nul, ovšem první a čtvrtý sloupec se liší jen na jedné pozici. Víme, že odečteme-li od jednoho z těchto sloupců druhý, nezmění se podle Vět 7.3 a 7.14 hodnota determinantu. Po této úpravě už ovšem můžeme použít metodu rozvoje podle sloupce (tedy kombinaci Vět 7.3 a 7.11):

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{H}) &= \det\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 7 & 5 & -9 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 7 & 5 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \\ &= (-1) \cdot (-2) \cdot \det\begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nyní odečteme od prvního řádku upravené matice trojnásobek druhého řádku. Na prvním řádku zůstanou dva nenulové prvky, podle nichž determinant rozvedeme a snadno dopočítáme:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{H}) &= 2 \cdot \det\left(\begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}\right) = 2 \cdot \det\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}\right) = \\ &= 2 \cdot (-5) \cdot \det\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 7 \end{pmatrix}\right) - 2 \cdot 1 \cdot \det\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}\right) = \\ &= -10 \cdot (14 - 1 + 3 + 14) - 2 \cdot (4 + 1 + 12 + 4 + 4 - 3) = -344. \end{aligned}$$

□

**5.14.** Najděte nad tělesem racionálních čísel rekurentní vzorec pro výpočet determinantu obecné čtvercové matice  $\mathbf{C}_n = (c_{ij})$  stupně  $n$ , kde  $c_{ii} = 1$ ,  $c_{ii+1} = -1$  a

$$c_{ii+1} = 1 \text{ a jinde je } c_{ij} = 0, \text{ tj. } \mathbf{C}_n = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rozvedeme-li matici  $\mathbf{C}_n$  podle prvního řádku, dostaneme  $\det \mathbf{C}_n = \det \mathbf{C}_{n-1} + \det \mathbf{A}_{n-1}$ , kde matici  $\mathbf{A}_{n-1}$  získáme z  $\mathbf{C}_n$  vypuštěním prvního řádku a druhého sloupce. Rozvojem podle prvního sloupce matice  $\mathbf{A}_{n-1}$  zjistíme, že  $\det \mathbf{A}_{n-1} = \det \mathbf{C}_{n-2}$ . Tedy platí rekurentní vzorec  $\det \mathbf{C}_n = \det \mathbf{C}_{n-1} + \det \mathbf{C}_{n-2}$  a přímým výpočtem zjistíme, že  $\det \mathbf{C}_1 = 1$  a že  $\det \mathbf{C}_2 = 2$ . Vidíme, že hodnota  $\det \mathbf{C}_n$  je právě  $n + 2$ . členem Fibonacciovy posloupnosti. □

**5.15.** Spočítejte nad tělesem racionálních čísel determinant čtvercové matice  $\mathbf{D}_n = (d_{ij})$  stupně  $n$ , kde  $d_{ii} = 1$ ,  $d_{ii+1} = d_{i+1i} = 1$  a jinde je  $d_{ij} = 0$ , tj.  $\mathbf{D}_n =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Stejným postupem jako v předchozí úloze zjistíme, že  $\det \mathbf{D}_n = \det \mathbf{D}_{n-1} - \det \mathbf{D}_{n-2}$ . Dále snadno spočítáme hodnoty  $\det \mathbf{D}_1 = 1$ ,  $\det \mathbf{D}_2 = 0$  a poté pomocí rekurentního vzorce  $\det \mathbf{D}_3 = -1$ ,  $\det \mathbf{D}_4 = -1$ ,  $\det \mathbf{D}_5 = 0$ ,  $\det \mathbf{D}_6 = 1$ ,  $\det \mathbf{D}_7 = 1$  a  $\det \mathbf{D}_8 = 0$ . Vidíme, že je posloupnost  $\{\det \mathbf{D}_n\}_n$  periodická s periodou 6. Dodefinujeme-li  $\det \mathbf{D}_0 = 1$ , pak dostáváme vztah  $\det \mathbf{D}_n = \det \mathbf{D}_{n \bmod 6}$ . □

**5.16.** Spočítejte determinant matice  $\mathbf{D}_{500}$  z předchozí úlohy.

Stačí použít nerekurentní vztah  $\det \mathbf{D}_{500} = \det \mathbf{D}_{500 \bmod 6} = \det \mathbf{D}_2 = 0$ . □

## 6. REGULÁRNÍ MATICE

6.1. Rozhodněte, zda je nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  regulární matice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \text{ a } \mathbf{A}^{555}.$$

Díky Větě 8.4 stačí zjistit, zda jsou determinanty jednotlivých matic nenulové. Spočítejme nejprve determinanty matic  $\mathbf{A}$  a  $\mathbf{B}$ :

$$\det \mathbf{A} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} = -5$$

nad  $\mathbf{Q}$ ,  $\det \mathbf{A} = 0$  nad  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det \mathbf{A} = 2$  nad  $\mathbf{Z}_7$ , což znamená, že je  $\mathbf{A}$  regulární nad  $\mathbf{Q}$  a  $\mathbf{Z}_7$  a  $\mathbf{A}$  je singulární nad  $\mathbf{Z}_5$ . Podobně

$$\det \mathbf{B} = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6$$

nad  $\mathbf{Q}$ ,  $\det \mathbf{B} = 1$  nad  $\mathbf{Z}_5$  a  $\det \mathbf{B} = 6$  nad  $\mathbf{Z}_7$ , tedy  $\mathbf{B}$  je regulární nad všemi tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$ . Použijeme-li Větu 7.21, která říká, že  $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$ , pak vidíme, že  $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \neq 0$  právě když  $\det \mathbf{A} \neq 0$  a  $\det \mathbf{B} \neq 0$ . Tudíž matice  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$  je regulární nad  $\mathbf{Q}$  a  $\mathbf{Z}_7$  a není regulární nad  $\mathbf{Z}_5$ . Konečně indukčním rozšířením Věty 7.21 dostaneme, že  $\det(\mathbf{A}^{555}) = \det(\mathbf{A})^{555}$ , a proto je matice  $\mathbf{A}^{555}$  regulární právě nad tělesy  $\mathbf{Q}$  a  $\mathbf{Z}_7$ .  $\square$

6.2. Rozhodněte pro která reálná  $a$  jsou reálné matice  $\mathbf{P}(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{Q}(a) =$

$$\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ a-1 & 1 & 1 \\ a+1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{P}(a) \cdot \mathbf{Q}(a) \text{ regulární.}$$

$$\text{Nejprve spočítáme determinanty } \det(\mathbf{P}(a)) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix} = a - a^2, \quad a$$

$$\det(\mathbf{Q}(a)) = \det \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ a-1 & 1 & 1 \\ a+1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2a-1 & 0 & 0 \\ a-1 & 1 & 1 \\ a+1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 - 2a.$$

Věta 8.4 z přednášky říká, že je matice regulární, právě když je její determinant nenulový. Determinanty matic  $\mathbf{P}(a)$  a  $\mathbf{Q}(a)$  už jsme spočítali, zbývá nám s využitím Věty 7.21 spočítat  $\det(\mathbf{P}(a) \cdot \mathbf{Q}(a)) = \det(\mathbf{P}(a)) \cdot \det(\mathbf{Q}(a)) = a(1-a)(1-2a)$ . Vidíme, že je matice  $\mathbf{P}(a)$  regulární, právě když  $a \in \mathbf{R} \setminus \{0, 1\}$ , matice  $\mathbf{Q}(a)$  je regulární, právě když  $a \in \mathbf{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$  a součin  $\mathbf{P}(a) \cdot \mathbf{Q}(a)$  je regulární, právě když  $a \in \mathbf{R} \setminus \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ .  $\square$

**6.3.** Rozhodněte pro která  $x \in \mathbf{Z}_5$  je matice  $\begin{pmatrix} 2x & x+3 & 2x+1 \\ x+4 & 3x+2 & 3 \\ x+1 & x & 4x \end{pmatrix}$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_5$  singulární.

Opět nejprve spočítáme determinant matice  $\mathbf{A}(x) = \begin{pmatrix} 2x & x+3 & 2x+1 \\ x+4 & 3x+2 & 3 \\ x+1 & x & 4x \end{pmatrix}$ , nejprve přičteme třetí sloupec k druhému a pak rozvedeme podle třetího řádku:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 2x & x+3 & 2x+1 \\ x+4 & 3x+2 & 3 \\ x+1 & x & 4x \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 2x & 3x+4 & 2x+1 \\ x+4 & 3x & 3 \\ x+1 & 0 & 4x \end{pmatrix} = \\ &= (x+1) \cdot (4x^2 + x + 2) + 4x \cdot (3x^2 + 4x + 4) = x^3 + x^2 + 4x + 2. \end{aligned}$$

Stejně jako v předchozí úloze potřebujeme najít  $x \in \mathbf{Z}_5$ , pro něž je hodnota  $\det(\mathbf{A}(x)) = x^3 + x^2 + 4x + 2 = 0$ , což snadno zjistíme dosazováním jednotlivých prvků tělesa  $\mathbf{Z}_5$ :

$$\det(\mathbf{A}(0)) = 2, \det(\mathbf{A}(1)) = 1^3 + 1^2 + 4 \cdot 1 + 2 = 3, \det(\mathbf{A}(2)) = 2^3 + 2^2 + 4 \cdot 2 + 2 = 2,$$

$$\det(\mathbf{A}(3)) = 3^3 + 3^2 + 4 \cdot 3 + 2 = 0, \det(\mathbf{A}(4)) = 4^3 + 4^2 + 4 \cdot 4 + 2 = 3.$$

Zjistili jsme, že je matice  $\mathbf{A}(x)$  singulární, právě když je  $x = 3$ .  $\square$

**6.4.** Vyřešte nad reálnými čísly soustavu rovnic  $\mathbf{A}\mathbf{x}^T = (1, 0, 0)^T$  s reálným parametrem  $a$ , kde  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2a+1 & a & 2a \\ a & 1 & a+1 \\ 2a & 0 & 2a \end{pmatrix}$ .

Pro počítání použijeme Cramerovo pravidlo. Nejdříve určíme  $\det \mathbf{A} = 2a \cdot (a+1)$ . To znamená, že Cramerovo pravidlo můžeme využít pro parametr  $a \in \mathbf{R} \setminus \{0, -1\}$ , t.j. je-li matice  $\mathbf{A}$  regulární. Dále určíme determinanty matic  $\mathbf{A}_i$ , které vzniknou z matice  $\mathbf{A}$  nahrazením  $i$ -tého sloupce sloupcem pravých stran vektorem, tedy  $(1, 0, 0)^T$ :

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A}_1 &= \det \begin{pmatrix} 1 & a & 2a \\ 0 & 1 & a+1 \\ 0 & 0 & 2a \end{pmatrix} = 2a, \det \mathbf{A}_2 = \det \begin{pmatrix} 2a+1 & 1 & 2a \\ a & 0 & a+1 \\ 2a & 0 & 2a \end{pmatrix} = 2a \text{ a} \\ \det \mathbf{A}_3 &= \det \begin{pmatrix} 2a+1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 2a & 0 & 0 \end{pmatrix} = -2a. \end{aligned}$$

Nyní pomocí Cramerova pravidla (Věta 8.13) spočítáme hodnotu  $i$ -té neznámé jako  $x_i = (\det \mathbf{A})^{-1} \cdot \det \mathbf{A}_i$ . Tedy  $x_1 = x_2 = \frac{2a}{2a(a+1)} = \frac{1}{a+1}$  a  $x_3 = \frac{-2a}{2a(a+1)} = -\frac{1}{a+1}$ . Konečně standardním postupem zjistíme, že soustava pro  $a = -1$  nemá řešení a pro  $a = 0$  leží všechna řešení v množině  $(1, 0, 0) + \langle (0, 1, -1) \rangle$ .  $\square$

**6.5.** Existuje-li, najděte inverzní matici k reálné matici  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ .

Využijeme Větu 8.8 z přednášky a budeme elementárními úpravami upravovat matici  $\mathbf{B}$  rozšířenou o jednotkovou matici, tedy matici  $(\mathbf{B}|\mathbf{E})$  tak, abychom dostali

matici  $(\mathbf{E}|\mathbf{C})$ . Podaří-li se nám to, bude matice  $\mathbf{C}$  právě inverzní maticí k matici  $\mathbf{B}$ :

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -13 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Zjistili jsme, že  $\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} -13 & -2 & 5 \\ 8 & 1 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . □

**6.6.** Existuje-li, spočítejte nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$  matici  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}^{-1}$ .

Postupujeme stejně jako v předchozím příkladě:

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 0 & 6 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 & 2 \end{array} \right).$$

Dostali jsme  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 6 & 2 \end{pmatrix}$ . □

5./6.1.

**6.7.** Spočítejte součin reálných matic  $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Označme  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  a  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ . Rozšíříme-li matici  $\mathbf{A}$  o matici  $\mathbf{B}$  a budeme-li vzniklou matici  $(\mathbf{A}|\mathbf{B})$  upravovat stejně jako v předchozích dvou úlohách takovými elementárními úpravami, abychom vlevo obdrželi jednotkovou matici, snadno nahlédneme, že

$$(\mathbf{A}|\mathbf{B}) \sim \mathbf{A}^{-1} \cdot (\mathbf{A}|\mathbf{B}) = (\mathbf{E}|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}),$$

Tedy vpravo dostaneme hledaný součin  $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ . Počítejme:

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{cc|cccc} 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left( \begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 3 & 3 & -5 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 5 & -3 & -4 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & 3 & 3 & -5 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Spočítali jsme, že  $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -4 & 7 \\ -3 & 3 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ . □

**6.8.** Spočítejte součin reálných matic  $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1}$ .



Označme  $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  a  $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ . Uvědomíme-li si, že  $(\mathbf{C} \cdot \mathbf{D}^{-1})^T = (\mathbf{D}^{-1})^T \cdot \mathbf{C}^T = (\mathbf{D}^T)^{-1} \cdot \mathbf{C}^T$ , můžeme postupovat stejným způsobem jako v minulém příkladu, ovšem pro součin transponovaných matic v obráceném pořadí:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & | & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & | & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & 8 & | & 8 & -4 & 4 \\ 12 & 9 & | & 0 & 9 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & | & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & | & -8 & 13 & 2 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & | & 18 & -27 & -3 \\ 0 & 1 & | & -8 & 13 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 6 & -9 & -1 \\ 0 & 1 & | & -8 & 13 & 2 \end{pmatrix}.$$

Zjistili jsme, že  $(\mathbf{D}^T)^{-1} \cdot \mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 6 & -9 & -1 \\ -8 & 13 & 2 \end{pmatrix}$ , a proto  $\mathbf{C} \cdot \mathbf{D}^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ -9 & 13 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .  $\square$

**6.9.** Najděte nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$  adjungovanou matici k maticím  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{B} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Postupujme nejprve podle definice, na  $i$ -tém řádku a v  $j$ -tém sloupci adjungované matice se nachází subdeterminant původní matice, v níž vyškrtneme  $j$ -tý řádek a  $i$ -tý sloupec, vynásobený hodnotou  $(-1)^{i+j}$ :

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \text{adj}(\mathbf{B}) = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \text{adj}(\mathbf{C}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

U poslední matice, o níž z příkladu 6.6 víme, že je regulární, a známe její inverz, stačí abychom spočetli determinant  $\det(\mathbf{D}) = 5$  a využili Věty 8.12, která říká, že  $\mathbf{D} \cdot \text{adj}(\mathbf{D}) = \det(\mathbf{D}) \cdot \mathbf{E}$ , proto  $\text{adj}(\mathbf{D}) = \det(\mathbf{D}) \cdot \mathbf{D}^{-1}$ , tedy  $\text{adj}(\mathbf{D}) = 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 6 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .  $\square$

**6.10.** Spočítejte adjungovanou matici ke čtvercové matici stupně 100, která má hodnotu 98.

Uvážíme-li, že matice, kterou dostaneme z původní vyškrtnutím  $i$ -tého řádku a  $j$ -tého sloupce má hodnotu nejvýše 98, je taková matice singularní a má tedy determinant rovný nule. To znamená, že hledaná adjungovaná matice je nulová.  $\square$

## 7. HOMOMORFISMY VEKTOROVÝCH PROSTORŮ

**7.1.** Necht  $f : \mathbf{Z}_5^3 \rightarrow \mathbf{Z}_5^2$  je zobrazení dané předpisem  $f(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ . Rozhodněte, zda jde o homomorfismus.

Podle Věty 4.7 z přednášky zobrazení dané násobením sloupcového vektoru (tedy matice typu  $(n, 1)$ ) maticí splňuje axiomy homomorfismu, tedy

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} \quad \text{a} \quad (r \cdot \mathbf{u}) \cdot \mathbf{A} = r \cdot (\mathbf{u} \cdot \mathbf{A})$$

pro každé  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{Z}_5^3$  a  $r \in \mathbf{Z}_5$ . □

**7.2.** Pro homomorfismus  $f$  z předchozího příkladu popište podprostory  $\text{Ker} f$  a  $\text{Im} f$ .

Připomeňme, že  $\text{Ker} f = \{\mathbf{v} \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}\}$ . Tedy  $\text{Ker} f$  je právě množina všech řešení homogenní soustavy s maticí  $\mathbf{A}$ . Snadno spočítáme, že  $\text{Ker} f = \langle (2, 0, 1) \rangle$ .

Vezmeme-li libovolnou generující množinu  $G$  vektorového prostoru  $\mathbf{Z}_5^3$  (například kanonickou bázi), potom  $f(G)$  tvoří generující množinu podprostoru  $\text{Im} f = f(\mathbf{Z}_5^3)$ . Vidíme, že  $f((1, 0, 0)) = (4, 1)$ ,  $f((0, 1, 0)) = (1, 2)$  a  $f((0, 0, 1)) = (2, 3)$  (tj. obrazy vektorů kanonické báze tvoří právě sloupce matice  $\mathbf{A}$ ). Zbývá si všimnout, že  $\langle (4, 1), (1, 2), (2, 3) \rangle = \mathbf{Z}_5^2$ . □

Označujme  $K_n$  kanonickou bázi libovolného aritmetického vektorového prostoru  $T^n$  nad tělesem  $T$  a její  $i$ -tý vektor  $\mathbf{e}_i$ .

**7.3.** Najděte matici homomorfismu  $f$  z předchozí úlohy vzhledem ke kanonickým bázím.

Podle definice nejprve potřebujeme zjistit souřadnice vektorů  $f(\mathbf{e}_i)$  vzhledem ke kanonické bázi prostoru  $\mathbf{Z}_5^2$ :  $\{f(\mathbf{e}_1)\}_{K_2} = \{(4, 1)\}_{K_2} = (4, 1)$ ,  $\{f(\mathbf{e}_2)\}_{K_2} = \{(1, 2)\}_{K_2} = (1, 2)$ ,  $\{f(\mathbf{e}_3)\}_{K_2} = \{(2, 3)\}_{K_2} = (2, 3)$ .

Nyní zbývá souřadnicové vektory uspořádat do sloupců matice homomorfismu vzhledem ke kanonickým bázím  $[f]_{K_3 K_2} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ . □

**7.4.** Necht  $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$  je zobrazení určené předpisem  $g((x_1, x_2)) = (x_1 + 2x_2, 4x_1 - x_2, 2x_2)$ . Dokažte, že se jedná o homomorfismus.

Snadno zjistíme, že lze předpis definující zobrazení  $g$  vyjádřit jako součin matice a aritmetického vektoru:  $g((x_1, x_2)) = (x_1, x_2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ . Proto jde podle Věty 4.7 o homomorfismus. □

**7.5.** Najděte matici vzhledem ke kanonickým bázím homomorfismu  $g$  z předchozího příkladu.

Postupujeme stejně jako v Příkladu 7.3. Stačí tedy dosadit vektory kanonické báze do  $g$  a seřadíme je do sloupců matice  $[g]_{K_2 K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ .  $\square$

**7.6.** Mějme  $A = ((1, 4), (3, 1))$  bázi prostoru  $\mathbf{Z}_7^2$  a  $B = ((1, 1, 2), (1, 0, 3), (6, 0, 5))$  bázi prostoru  $\mathbf{Z}_7^3$ . Najděte matici homomorfismu  $h : \mathbf{Z}_7^2 \rightarrow \mathbf{Z}_7^3$  vzhledem k bázím  $A$  a  $B$ , známe-li matici  $h$  vzhledem ke kanonickým bázím  $[h]_{K_2 K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ .

Dvojí aplikací Věty 10.6 můžeme vyjádřit hledanou matici  $[h]_{AB}$  jakou součin matic:

$$[h]_{AB} = [1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{K_3 B} \cdot [h]_{AK_3} = [1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{K_3 B} \cdot [h]_{K_2 K_3} \cdot [1_{\mathbf{Z}_7^2}]_{AK_2}.$$

Snadno určíme přímo podle definice matice přechodu od kanonické báze k bázi  $A$  resp.  $B$ , tj. do sloupečků sepíšeme bázi  $A$  resp.  $B$ :

$$[1_{\mathbf{Z}_7^2}]_{AK_2} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad [1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{BK_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Konečně zbývá uvážit, že  $[1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{BK_3} \cdot [1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{K_3 B} = [1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{K_3 K_3} = \mathbf{E}$ , tedy  $[1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{K_3 B} = [1_{\mathbf{Z}_7^3}]_{BK_3}^{-1}$ . Dokončení úlohy je už jen rutinním počítáním s maticemi:

$$[h]_{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 4 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Hledaný součin matic dopočítáme způsobem prezentovaným v 6.7:

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 5 & 5 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 6 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 6 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Zjistili jsme, že  $[h]_{AB} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 0 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ .  $\square$

**7.7.** Buď  $A = ((1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0))$  báze vektorového prostoru  $\mathbf{Z}_3^3$  a  $B = ((1, 2), (1, 1))$  báze vektorového prostoru  $\mathbf{Z}_3^2$ . Najděte matici homomorfismu  $\psi : \mathbf{Z}_3^3 \rightarrow \mathbf{Z}_3^2$  vzhledem ke kanonickým bázím, má-li matici  $[\psi]_{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  vzhledem k bázím  $A$  a  $B$ .

Postupujeme standardní cestou s využitím Věty 10.6 (či speciální Věty 10.13):

$$[\psi]_{K_3 K_2} = [1_{\mathbf{Z}_3^2}]_{BK_2} \cdot [\psi]_{AB} \cdot [1_{\mathbf{Z}_3^3}]_{K_3 A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}.$$

a některým ze známých způsobů dopočítáme  $[\psi]_{K_3 K_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .  $\square$

**7.8.** Najděte matici endomorfismu  $\varphi$  vektorového prostoru  $\mathbf{R}^2$  vzhledem ke kanonické bázi, víte-li, že  $\varphi((1, 2)) = (3, 0)$  a  $\varphi((2, 1)) = (3, 3)$ .

Protože  $B = ((1, 2), (2, 1))$  tvoří bázi  $\mathbf{R}^2$ , zaručuje nám Věta 9.22, že daná podmínka určuje homomorfismus  $f$  jednoznačně, a bezprostředně z definice dostaneme matici  $[\varphi]_{BK_3} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Dále postupujeme obvyklým způsobem:

$$\begin{aligned} [\varphi]_{K_2} &= [\varphi]_{K_2 K_2} = [\varphi]_{BK_2} \cdot [1_{\mathbf{R}^2}]_{K_2 B} = [\varphi]_{BK_2} \cdot [1_{\mathbf{R}^2}]_{BK_2}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$\square$

**7.9.** Najděte ve vektorovém prostoru  $\mathbf{Z}_3^2$  nad tělesem  $\mathbf{Z}_3$  matici přechodu od báze  $M = ((2, 1), (1, 1))$  k bázi  $N = ((1, 1), (0, 1))$ .

Uvědomíme si, že matice přechodu od báze  $M$  k bázi  $N$  je právě maticí  $[1_{\mathbf{Z}_3}]_{NM}$  identického homomorfismu vzhledem k bázím  $N$  a  $M$ . Nyní opět použijeme Větu 5.6, abychom dostali:  $= [1_{\mathbf{Z}_3}]_{NM} = [1_{\mathbf{Z}_3}]_{K_2 M} \cdot [1_{\mathbf{Z}_3}]_{NK_2} = [1_{\mathbf{Z}_3}]_{MK_2}^{-1} \cdot [1_{\mathbf{Z}_3}]_{NK_2} =$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

**7.10.** Je-li  $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$  matice homomorfismu  $f : \mathbf{Z}_7^4 \rightarrow \mathbf{Z}_7^3$  vzhledem k bázím  $M = ((1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 0))$  a  $N = ((3, 1, 4), (3, 3, 0), (2, 1, 6))$ . Určete dimenze jádra  $\text{Ker } f$  a obrazu  $\text{Im } f$ .

Nejprve standardní cestou určíme hodnotu matice  $[f]_{MN} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$  a

zjistíme, že  $h([f]_{MN}) = 2$ . Nyní využijeme Větu 10.19, která říká, že  $\dim(\text{Im } f) = h([f]_{MN}) = 2$  a Větu 9.27, která říká, že  $\dim(\text{Im } f) + \dim(\text{Ker } f) = \dim(\mathbf{Z}_7^4) = 4$ , a proto  $\dim(\text{Ker } f) = 4 - \dim(\text{Im } f) = 2$ .  $\square$

**7.11.** Uvažujme reálný vektorový prostor  $\mathbf{R}[x]$  všech reálných polynomů. Dokažte, že první derivace  $'$  tvoří homomorfismus  $\mathbf{R}[x]$  do  $\mathbf{R}[x]$ . Jak vypadá jádro  $\text{Ker}(')$  a obraz  $\text{Im}(')$ ?

Tvrzení, že  $(p+q)' = p' + q'$  a  $(c.p)' = c.p'$  je dokázáno na přednášce matematické analýzy (nejen) pro všechny polynomy  $p$  a  $q$  a každou reálnou konstantu  $c$ . Tedy první derivace je homomorfismus. Snadno nahlédneme, že  $\text{Ker}(')$  obsahuje právě všechny konstantní funkce a  $\text{Im}(') = \mathbf{R}[x]$ .  $\square$

## 8. LINEÁRNÍ FORMY

**8.1.** Dokažte, že je zobrazení  $f : \mathbf{Z}_7^4 \rightarrow \mathbf{Z}_7$  definované vztahem  $f((x_1, x_2, x_3, x_4)) = 2x_1 + 3x_2 + 4x_4$  lineární forma a najděte souřadnice  $f$  vzhledem ke kanonické bázi  $K_4$  a vzhledem k bázi  $B = ((1, 1, 1, 1), (2, 0, 2, 2), (1, 1, 0, 1), (4, 4, 4, 0))$ .

Vidíme, že hodnotu  $f(\mathbf{v})$  dostaneme jako součin vektoru  $\mathbf{v}$  a sloupcového vektoru  $(2, 3, 0, 4)^T$ , jde tedy o homomorfismus vektorového prostoru  $\mathbf{Z}_7^4$  do  $\mathbf{Z}_7$ , tj. jde podle definice o lineární formu na prostoru  $\mathbf{Z}_7^4$ .

Souřadnice  $f$  vzhledem k jakékoli bázi dostaneme dosazením jednotlivých bázeckých vektorů a jejich seřazením do řádku (v případě lineárních forem na aritmetickém vektorovém prostoru jde zřejmě právě o matici homomorfismu  $f$ ), tedy  $\{f\}_{K_4} = [f]_{K_4 1} = (2, 3, 0, 4)$  a  $\{f\}_B = [f]_{B 1} = (2, 5, 2, 6)$ .  $\square$

**8.2.** Nechtě  $\{g\}_B = (3, 4, 2, 1)$  jsou souřadnice lineární formy  $g : \mathbf{Z}_7^4 \rightarrow \mathbf{Z}_7$  vzhledem k bázi  $B = ((1, 1, 1, 1), (2, 0, 2, 2), (1, 1, 0, 1), (4, 4, 4, 0))$ . Najděte souřadnice  $g$  analytické vyjádření  $g$  vzhledem ke kanonické bázi  $K_4$  a

Hledáme-li vektor  $\{g\}_{K_4}$  stačí si uvědomit, že vlastně jedná o matici homomorfismu, a poté využít Větu 10.6, protože

$$\{g\}_{K_4} = [g]_{K_4 1} = [g]_{B 1} \cdot [1_{\mathbf{Z}_7^4}]_{K_4 B} = (3, 4, 2, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Vidíme, že nám stačí vyřešit nehomogenní soustavu s maticí

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Standardním postupem tedy najdeme vektor  $(0, 1, 1, 1)$ , který je právě hledaným souřadnicovým vektorem  $\{g\}_{K_4}$ .  $\square$

**8.3.** Najděte souřadnice lineární formy  $f$  chápané jako vektor duálního vektorového prostoru vzhledem duální bázi ke kanonické bázi a vzhledem k duální bázi k bázi  $B$ , kde  $f$  a  $B$  bereme z Příkladu 8.1.  $\square$

Označme  $(f_1, f_2, f_3, f_4)$  hledanou duální bázi. Z definice víme, že  $f_i(\mathbf{e}_j) = 0$ , je-li  $i \neq j$ , a  $f_i(\mathbf{e}_i) = 1$ . To přímo podle definice znamená, že  $\{f_i\}_{K_4} = \mathbf{e}_i$ , a proto  $f_i(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_i$ .

Označme  $\tilde{K}_4$ , respektive  $\tilde{B}$  duální báze k bázím  $K_4$  a  $B$ . Nejprve přímo podle definice a předchozí úlohy vidíme, že  $\{f\}_{\tilde{K}_4} = (2, 3, 0, 4)$ . Využijeme-li dále Větu 11.7 z přednášky, pak snadno určíme souřadnice lineární formy vzhledem k duální bázi  $\tilde{B}$  bez toho, že bychom  $\tilde{B}$  museli hledat, neboť platí  $\{f\}_{\tilde{B}} = \{f\}_B = (2, 5, 2, 6)$ .  $\square$

**8.4.** Mějme bázi  $B = ((1, 0, 1), (3, 2, 2), (2, 0, 4))$  vektorového prostoru  $\mathbf{Z}_5^3$ . Určete analytické vyjádření lineárních forem duální báze k bázi  $B$ .

Potřebujeme najít souřadnice lineárních forem duální báze vzhledem ke kanonické bázi, z nichž už snadno dostaneme analytický tvar. Označme  $\tilde{B} = (f_1, f_2, f_3)$  duální bázi k bázi  $B$  a souřadnice forem:  $\{f_i\}_{K_3} = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3})$  pro  $i = 1, 2, 3$ . Uvědomme si, že požadavek na duální bázi lze v maticovém zápisu vyjádřit následovně:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hledáme tedy obvyklým způsobem inverzní matici ke známé matici, snadno, tedy spočítáme, že

$$\begin{pmatrix} \{f_1\}_{K_3} \\ \{f_2\}_{K_3} \\ \{f_3\}_{K_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Zbývá sepsat analytické vyjádření forem:  $f_1(x, y, z) = 2x + 3y + 4z$ ,  $f_2(x, y, z) = 3y$ ,  $f_3(x, y, z) = 2x + 4y + 3z$ .  $\square$

**8.5.** Uvažujme bázi  $M = ((1, -1), (-1, 2))$  aritmetického vektorového prostoru  $\mathbf{R}^2$ . Najděte souřadnice vzhledem k  $M$  a vzhledem ke kanonické bázi lineárních forem duální báze k bázi  $M$ .

Označme  $\tilde{M} = (g_1, g_2)$  duální bázi k bázi  $M$ . Okamžitě z definice vidíme, že  $\{g_1\}_M = (1, 0)$  a  $\{g_2\}_M = (0, 1)$ , tedy souřadnice jsou právě vektory kanonické báze. Při hledání souřadnic  $\{g_i\}_{K_2}$  můžeme postupovat stejně jako v předchozím příkladu nebo podle Věty 11.9. V obou případech nám zbývá najít inverzní matici:

$$\begin{pmatrix} \{g_1\}_{K_2} \\ \{g_2\}_{K_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tedy  $\{g_1\}_{K_2} = (2, 1)$  a  $\{g_2\}_{K_2} = (1, 1)$ .  $\square$

**8.6.** Uvažujme  $h_1(x) = 4x^2 + 4x^3$ ,  $h_2(x) = 4x^1 + 2x^2 + x^3$  a  $h_3(x) = 3x^1 + 3x^2$  lineární formy na vektorovém prostoru  $\mathbf{Z}_5^3$ . Ověřte, že  $(h_1, h_2, h_3)$  tvoří bázi duálního vektorového prostoru, a najděte bázi  $B$  prostoru  $\mathbf{Z}_5^3$  tak, aby  $(h_1, h_2, h_3)$  byla duální bázi k bázi  $B$ .

Řešíme duální úlohu k předchozím dvěma příkladům. Známe tentokrát souřadnice lineárních forem vzhledem ke kanonické bázi a potřebujeme najít vektory  $\mathbf{u}_i$  tak, aby součin  $\mathbf{u}_i \{g_j\}_{K_3}^T = \delta_{ij}$ , což snadno vyjádříme pomocí matic:

$$\begin{pmatrix} \{\mathbf{u}_1\}_{K_3} \\ \{\mathbf{u}_2\}_{K_3} \\ \{\mathbf{u}_3\}_{K_3} \end{pmatrix} \cdot (\{g_1\}_{K_3}^T, \{g_2\}_{K_3}^T, \{g_3\}_{K_3}^T) = \mathbf{E}$$

Tedy opět se úkol redukuje na nalezení inverzní matice. Navíc teprve při hledání inverzní matice můžeme zodpovědět otázku existence báze  $B$ . Jestliže by neexistovala inverzní matice k dané matici (tj. pokud by souřadnice lineárních forem  $h_i$  byly lineárně závislé), pak by lineární formy  $h_i$  netvořili bázi, v opačném případě bázi budou. Dopočítáme tedy:

$$\begin{pmatrix} \{\mathbf{u}_1\}_{K_3} \\ \{\mathbf{u}_2\}_{K_3} \\ \{\mathbf{u}_3\}_{K_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Zjistili jsme, že  $\mathbf{u}_1 = (2, 3, 1)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (2, 3, 2)$  a  $\mathbf{u}_3 = (1, 1, 4)$  a  $(h_1, h_2, h_3)$  je duální bázi vzhledem k bázi  $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ .  $\square$

### Další úlohy

- (1) Mějme  $p = (174)(256)$ ,  $q = (134765) \in S_7$ . Určete permutace  $p \circ q$ ,  $q \circ p$ ,  $p^{-1} \circ q$  a  $q^{-1} \circ p^{-1}$  a  $q \circ q$  najděte u všech těchto permutací jejich rozklad na transpozice.
- (2) Mějme  $p = (1278)(356)$ ,  $q = (13)(4765) \in S_8$ . Určete znaménka permutací  $p \circ q$ ,  $q \circ p$ ,  $p^{-1} \circ q$  a  $q^{-1} \circ p^{-1}$  a  $q \circ q$  najděte u všech těchto permutací jejich rozklad na transpozice.

- (3) Spočítejte determinant matic  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,

$\mathbf{A}^{-1}$ ,  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$  a  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}^{-1}$  nad tělesy  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{Z}_3$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$ .

- (4) Najděte pro libovolná  $a \in \mathbf{Q}$  nad  $\mathbf{Q}$  rekurentní vzorec pro výpočet determinant čtvercové matice  $\mathbf{G}_n = (g_{ij})$  stupně  $n$ , kde  $g_{ii} = 1$ ,  $g_{i+1} = a$  a  $g_{i+1i} = b$  a jinde je  $g_{ij} = 0$ .
- (5) Rozhodněte, zda jsou nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{Z}_3$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  regulární matice  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  a  $\mathbf{B}^3$ .

- (6) Najděte nad tělesy  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{Z}_3$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$  adjungované matice k maticím z předchozí úlohy.

- (7) Rozhodněte, pro která  $a \in \mathbf{Z}_7$  je nad  $\mathbf{Z}_7$  matice  $\begin{pmatrix} a & 2+a & 1 \\ 3a+2 & 1 & a \\ 2a^2 & a+6 & 2+a \end{pmatrix}$  regulární.

- (8) Najděte pro všechna  $a \in \mathbf{Z}_7$ , pro něž je to možné, inverzní matici k matici z předchozí úlohy.

- (9) Spočítejte  $\left( \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right)^{-1}$  nad tělesy  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Z}_5$  a  $\mathbf{Z}_7$ .

- (10) Uvažujme zobrazení  $f, g, h : \mathbf{Z}_7^4 \rightarrow \mathbf{Z}_7^3$  vektorových prostorů nad tělesem  $\mathbf{Z}_7$ , kde  $f$  je určené předpisem  $f((x_1, x_2, x_3, x_4)) = (x_2 + 3x_3 + 5x_4, 4x_1 + x_3, x_1 + 6x_3 + x_4)$ , dále  $g$  je určené svou maticí vzhledem ke kanonickým

bázím  $[g]_{K_4 K_3} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$  a  $h$  je určené předpisem  $h(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}) + 3 \cdot$

$g(\mathbf{v})$  pro každé  $\mathbf{v} \in \mathbf{Z}_7^4$ .

- a) Dokažte, že je  $h$  homomorfismus.

- b) Najděte matice  $g$  a  $h$  vzhledem ke kanonickým bazím.
- c) Najděte matice  $f$ ,  $g$  a  $h$  vzhledem k bazím  $M = ((1, 1, 2, 3), (1, 1, 1, 0), (5, 0, 1, 0), (4, 0, 2, 0))$  a  $N = ((3, 1, 2), (1, 2, 0), (6, 6, 0))$ .
- d) Určete jádro a obraz homomorfismů  $f$ ,  $g$  a  $h$ .
- e) Rozhodněte, zda existuje  $\mathbf{v} \in \mathbf{Z}_7^4$ , pro které  $f(\mathbf{v}) = (1, 0, 3)$ .
- f) Rozhodněte, zda existuje  $\mathbf{v} \in \mathbf{Z}_7^4$ , pro které  $f(\mathbf{v}) = (1, 0, 3)$ .
- g) Najděte matice  $\psi \circ f$ ,  $\psi \circ g$  a  $\psi \circ h$  vzhledem ke kanonickým bazím je-li  $\psi$  endomorfismus daný maticí  $[\psi]_{AB} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$  vzhledem k bazím  $A = ((0, 1, 2), (2, 0, 1), (1, 2, 0))$  báze vektorového prostoru  $\mathbf{Z}_3^3$  a  $B = ((2, 5), (1, 2))$ .
- (11) Dokažte, že je endomorfismus  $\varphi$  z Příkladu 7.8 izomorfismus a najděte matice  $\varphi^{-1}$  vzhledem ke kanonické bázi.