

Statistika

(MD360P03Z, MD360P03U)
ak. rok 2007/2008

Karel Zvára

karel.zvara@mff.cuni.cz
<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zvara>

(naposledy upraveno 7. ledna 2008)



Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

literatura

- ▶ K. Zvára: Biostatistika, Karolinum Praha, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006
- ▶ Z. Pavlík, K. Kühnl: Úvod do kvantitativních metod pro geografy, SPN Praha, 1981
- ▶ T. H. Wonnacot, R. J. Wonnacot: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing Praha, 1992
- ▶ slajdy přednášky na adrese <http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zvara> (celý semestr, může dojít k úpravám)
- ▶ postupně doplňované slajdy uskutečněných přednášek

cvičení, zápočet, zkouška

- ▶ cvičení v počítačových učebnách
 - ▶ PUA (suterén Albertov 6)
 - ▶ Z3 (Albertov 6, u schodů do suterénu)
 - ▶ B5 (Viničná 7, 1. patro)
- ▶ MS Excel
- ▶ volně šířitelný program R (<http://cran.r-project.org/>)
- ▶ (aktivní účast na cvičení, maximálně dvě absence) & (napsání zápočtového testu) ⇒ zápočet
- ▶ obsah cvičení více přizpůsoben studovanému oboru
- ▶ přednášky formulovány obecněji
- ▶ zkouška nejspíš písemná, kombinovaná s ústní, zápočet **musí** zkoušeče **předcházet**; přihlašování ke zkoušce přes SIS

prehled témat

- ▶ popisná statistika (měřítka, charakteristiky polohy, variability, souvislost znaků)
- ▶ statistika v geografických/demografických/sociálních vědách
- ▶ pravděpodobnost (základní kombinatorické pojmy, klasická definice, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost)
- ▶ náhodná veličina (rozdelení, střední hodnota, rozptyl, hustota, distribuční funkce)
- ▶ důležitá rozdelení (normální, binomické, Poissonovo)
- ▶ statistické usuzování (populace a výběr, parametry a jejich odhad, interval spolehlivosti, volba rozsahu výběru)
- ▶ testování hypotéz (chyba 1. druhu, 2. druhu, hladina testu, síla testu, *p*-hodnota)
- ▶ testy (o populačním průměru, populačním podílu či podílech, nezávislosti, regresních koeficientech)
- ▶ regrese, kontingenční (čtyřpolní) tabulky

příklad statistického zjišťování I

- ▶ zjišťování se týká 200 mužů středního věku
- ▶ v souboru je 80 kuřáků a 120 nekuřáků
- ▶ 85 mužů má oči modré, 25 hnědé, 90 jiné barvy
- ▶ 27 mužů má jen základní vzdělání, 44 neúplné střední, 65 maturitu, 64 vysokoškolské
- ▶ 22 se jich narodilo v roce 1942, 19 v roce 1943, 25 v roce 1944, ..., 18 v roce 1951
- ▶ hmotnosti jednotlivých mužů jsou 83, 92, ..., 63 kg
- ▶ výška jednotlivých mužů jsou 172, 176, ..., 178 cm
- ▶ Co mají tyto údaje společného? Čím se údaje v jednotlivých podskupinách liší? Souvisí kouření a vzdělání? Souvisí příjem se vzděláním? Je tato souvislost stejná, jako v zemi XY?

příklad statistického zjišťování II

- ▶ zjišťování se týká příjmů obyvatel
- ▶ hodnotíme hrubý příjem za rok
- ▶ přihlížíme k místu trvalého bydliště (velikost obce, který kraj)
- ▶ přihlížíme k vzdělání (druh, doba školní docházky)
- ▶ přihlížíme k věku a pohlaví
- ▶ Co mají tyto údaje společného? Čím se údaje liší?

co a jak měříme (zjišťujeme)

- ▶ měříme na mnoha **statistických jednotkách** (osoba, domácnost, obec, okres, stát, pokusné pole ...)
- ▶ měříme (zjišťujeme) hodnoty **znaků**
- ▶ zjištěnou hodnotu vyjadřujeme ve zvoleném **měřítku** (stupnici)
- ▶ na jedné jednotce můžeme měřit několik znaků (závislost)
- ▶ měříme na skupinách jednotek – **souborech**
- ▶ zajímají nás **hromadné** vlastnosti ve velkých souborech
- ▶ můžeme **porovnávat** vlastnosti znaku **mezi soubory**

měřítka

- ▶ **nula-jedničkové** (muž/žena, kuřák/nekuřák)
- ▶ **nominální** (země původu, barva očí) jednoznačně dané hodnoty
- ▶ **ordinální** (dosažené vzdělání, stupeň bolesti) jednoznačně dané hodnoty, možné hodnoty jsou *uspořádané*
- ▶ **intervalové** (teplota v Celsiusově stupnici, rok narození) konstantní vzdálenosti mezi sousedními hodnotami, nula jen konvence; o kolik stupňů je dnes tepleji, než bylo vloni?
- ▶ **poměrové** (hmotnost, výška, HDP, počet obyvatel, věk) násobek zvolené jednotky, nula = neexistence měřené vlastnosti kolikrát je A starší (vyšší ...) než B

měřítka (stručnější dělení)

- ▶ **kvalitativní:** nula-jedničkové, nominální, často i ordinální
- ▶ u kvalitativních se zpravidla udávají **četnosti** jednotlivých hodnot (kolikrát která hodnota nastala)
- ▶ **kvantitativní** (spojité): intervalové, poměrové, někdy ordinální (není spojité)
- ▶ hodnoty kvantitativních – čísla
- ▶ zařazení znaku k určitému měřítku může záviset na účelu šetření

veličina

- ▶ číselně vyjádřený výsledek měření
- ▶ *hodnoty* znaků v intervalovém, poměrovém měřítku jsou husté – **spojitá veličina**
- ▶ *četnosti hodnot* znaků v nula-jedničkovém, nominálním (či ordinálním) měřítku – **diskrétní veličina**
- ▶ pro veličiny máme charakteristiky některých jejich hromadných vlastností (**charakteristiky polohy, variability, tvaru rozdělení**)
- ▶ popisné charakteristiky (statistiky) mají jedním číslem vyjádřit danou vlastnost

příklad: 100 hodů kostkou

počty puntíků coby různé obrázky – nominální znak

kostka A												kostka B											
4	2	5	6	3	1	1	2	2	2	2	2	1	4	6	2	3	2	6	1	5	2	2	
2	4	5	3	1	1	3	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	4	2	4	5	6	1	
4	3	2	5	5	5	2	2	5	2	3	3	6	3	6	5	6	1	3	5	1	2	3	
2	6	5	5	2	3	6	6	4	6	6	6	2	1	1	2	6	3	2	3	2	3	1	
5	4	1	4	2	2	4	5	2	5	4	4	1	6	6	2	6	3	2	6	1	2	3	
5	5	3	3	5	3	6	6	6	5	2	6	1	2	6	1	5	5	6	5	6	5	4	
3	5	4	5	1	1	4	3	2	4	6	6	5	1	6	6	6	1	2	6	1	2	3	
1	2	4	6	6	3	4	6	1	2	6	2	5	6	2	6	6	5	6	4	6	5	4	
6	6	1	2	6	2	4	3	2	3	6	1	2	6	2	1	6	6	6	6	6	6	6	
1	1	6	5	2	6	4	4	6	3	6	5	1	5	6	6	1	6	6	6	6	6	6	


hody kostkou jako hromadný jev

- ▶ chceme 100 zjištěných hodnot (počtu puntíků) vyjádřit názorně, aby vypovídaly o vlastnostech kostky
- ▶ n_j (absolutní) **četnost** [frequency] hodnoty – kolikrát nastala
- ▶ $f_j = \frac{n_j}{n}$ **relativní četnost** hodnoty (lze vyjádřit v %)
– v jakém dílu měření nastala (nutně platí $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{j=1}^k n_j$)
- ▶ tabulka četností (absolutních, relativních)
- ▶ grafické vyjádření četností – **histogram** [histogram] (velikost plochy je úměrná četnosti)
- ▶ rozhodování o kvalitě kostky (zda je symetrická) je úlohou **statistické indukce** [inference] – později

zpracování četností (kostka A)

j	n_j	$f_j = n_j/n$
1	12	0,12
2	21	0,21
3	14	0,14
4	15	0,15
5	21	0,21
6	17	0,17


$n = 100$ **1,00**



zpracování četností (kostka B)

j	n_j	$f_j = n_j/n$
1	15	0,15
2	16	0,16
3	7	0,07
4	6	0,06
5	15	0,15
6	41	0,41

$n = 100$



příklad: věk 99 matek

99 zjištěných hodnot – soubor naměřených hodnot

26	35	21	25	27	24	24	30	23	18
35	21	25	26	26	19	29	22	21	27
26	30	28	28	27	29	27	26	21	23
24	21	28	25	34	24	21	28	25	28
22	26	32	22	32	25	21	25	24	32
24	22	31	33	23	30	26	27	25	24
24	23	25	23	26	28	24	25	25	26
28	28	22	23	20	20	21	31	24	21
29	28	26	38	20	23	25	37	33	23
27	23	21	25	21	33	22	29	21	

[► Jdi k variační řadě](#)

variační řada, pořadí

- x_1, x_2, \dots, x_n původní (neuspořádaná) data – hodnoty znaku v měřítku aspoň ordinálním uvedené v původním pořadí, bez ohledu na případná opakování
- **variační řada** $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ [sort(x)] data uspořádána tak, aby hodnoty neklesaly
- proto **závorky u indexů**
- **pořadí [rank]** – umístění pozorování ve variační řadě; shodným hodnotám dáváme průměrné pořadí [rank(x)]

x_j	22	15	17	15	21	13	18
pořadí R_j	7	2,5	4	2,5	6	1	5

příklad: věk 99 matek – variační řada

uspořádaný soubor hodnot – variační řada

18	19	20	20	20	21	21	21	21	21
21	21	21	21	21	21	21	22	22	22
22	22	22	23	23	23	23	23	23	23
23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	26	26	26	26	26	26
26	26	26	26	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	29
29	29	29	30	30	30	31	31	32	32
32	33	33	33	34	35	35	37	38	

▶ Jdi k původním pozorováním

věk matek – třídní četnosti

$k = 7$

interval	x_j^*	n_j	$f_j = n_j/n$	N_j	N_j/n
do 20	19	5	0,051	5	0,051
21 až 23	22	27	0,273	32	0,324
24 až 26	25	32	0,322	64	0,646
27 až 29	28	19	0,192	83	0,838
30 až 32	31	8	0,081	91	0,919
33 až 35	34	6	0,061	97	0,980
36 a více	37	2	0,020	99	1,000

▶ Jdi k histogramu věku matek

▶ Jdi k míram polohy věku matek

třídění, třídní četnosti

- ▶ spojité veličina s velkým počtem naměřených hodnot
- ▶ obor hodnot rozdělíme na nepřekrývající se třídy (intervaly), nejlépe stejné délky (ne vždy je to praktické či možné)
- ▶ všechna pozorování z daného intervalu nahradíme zástupnou hodnotou (zpravidla středem intervalu) x_j^*
- ▶ zjistíme (**absolutní**) **četnosti** n_1, \dots, n_k jednotlivých tříd
- ▶ **kumulativní četnosti** udávají počet hodnot v dané třídě a třídách předcházejících ($1 \leq j \leq k$) [cumsum()]

$$N_j = n_1 + n_2 + \dots + n_j = \sum_{i=1}^j n_i$$

grafické znázornění třídních četností


- ▶ **histogram** je založen na třídění do intervalů, výjimečně zobrazuje přímo četnosti jednotlivých hodnot (barplot) [hist()]
- ▶ každé třídě odpovídá obdélník o **ploše úměrné četnosti** (absolutní nebo relativní)
- ▶ při stejných šírkách intervalů h odpovídají četnostem výšky obdélníků (protože základny jsou stejně dlouhé)
- ▶ počet intervalů k : volí se 5–15 tak, aby středy byly okrouhlé
- ▶ pomůckou Sturgesovo pravidlo

$$k \approx 1 + 3,3 \cdot \log_{10} n = 1 + \log_2 n$$


- ▶ příklad věk matek: $k \approx 1 + 3,3 \cdot \log_{10} 99 \approx 7,6$

příklad (věk matek): histogram, $h = 3$ ($k = 7$)

```
[hist(vek.m,seq(17,38,by=3),col="yellow")]
```



příklad (věk matek): kumulativní relativní četnosti



▶ Jdi k četnostem věku matek

třídění při nestejně dlouhých intervalech

- ▶ někdy jsou data nepravidelně rozmištěna
- ▶ zpravidla jsou soustředěna u levého okraje intervalu hodnot (věkové či příjmové složení obyvatelstva)
- ▶ pak vhodné zvolit nestejně dlouhé intervaly
- ▶ je vhodné zvolit délky intervalů tak, aby delší byly násobkem kratších
- ▶ při nestejně dlouhých intervalech musí zjištěné četnosti odpovídat **plocha**, nikoliv výška; pak se na svislou osu nanáší **relativní četnosti**

příklad: tolary
měsíční příjmy 99 osob v tolarech

četnosti


x_j^*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_j	7	14	16	10	6	3	9	3	1	5	3
x_j^*	21	22	24	26	27	28	32	35	36	40	43
n_j	4	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1

třídní četnosti

třída	10	11	12	13–16	17–20	21–30	31–50	celkem
x_j^*	10	11	12	14,5	18,5	25,5	40,5	
n_j^*	7	14	16	28	12	14	8	99
hustota	7	14	16	7	3	1,4	0,4	

▶ Jdi k hodnocení tolerů

příklad (tolary): histogram



kvartily, percentily

- ▶ **dolní (horní) kvartil** Q_1 (Q_3) [lower (upper) quartile] vyděluje čtvrtinu nejmenších (největších) hodnot
- ▶ kvartil – speciální případ percentilu
- ▶ **percentil** [percentile] x_p vyděluje $100p\%$ nejmenších hodnot od ostatních
- ▶ výpočet percentilů – mnoho vzorečků
- ▶ medián je také percentilem, totiž $x_{0,5}$
- ▶ podobně $Q_1 = x_{1/4} = x_{0,25}$, $Q_3 = x_{3/4} = x_{0,75}$ [quantile(x,probs=c(1/4,3/4))]

výběrové charakteristiky polohy: medián snaha charakterizovat úroveň jediným číslem

- ▶ medián je číslo, které dělí data na dvě stejně velké části (větších hodnot a menších hodnot)
- ▶ **medián** [median] (prostřední hodnota) \tilde{x} [median(x)]

$$\tilde{x} = x_{(\frac{n+1}{2})} \quad \text{pro } n \text{ liché}$$

$$\tilde{x} = \frac{1}{2} (x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}) \quad \text{pro } n \text{ sudé}$$

- ▶ závorky u indexů jsou nutné: znamenají, že hodnoty byly předem uspořádány do variační řady
- ▶ 5, 3, 4, 7, 6 $\tilde{x} = 5$ $(3 < 4 < 5 < 6 < 7)$

výpočet percentilů (jako v R), jen pro ilustraci jedna z možných definic – Gumbel(1939)

- ▶ najde se celé číslo k splňující

$$\frac{k-1}{n-1} \leq p < \frac{k}{n-1}$$

- ▶ tedy $k = \lfloor 1 + (n-1) \cdot p \rfloor (\lfloor x \rfloor)$ znamená celou část z x
- ▶ provede se lineární interpolace mezi $x_{(k)}$ a $x_{(k+1)}$ ($\{x\}$ znamená zlomkovou část x , o kolik přesahuje celé číslo)

$$q = \{1 + (n-1) \cdot p\} = (1 + (n-1) \cdot p) - k$$

$$x_p = (1 - q) \cdot x_{(k)} + q \cdot x_{(k+1)}$$

- ▶ např. pro $n = 99, p = 0,25$ bude

$$k = \lfloor 1 + (99-1) \cdot 0,25 \rfloor = \lfloor 25,5 \rfloor = 25$$

$$Q_1 = x_{0,25} = 0,5 \cdot x_{(25)} + 0,5 \cdot x_{(26)}$$

příklad: věk 99 matek – variační řada

variační řada, medián $\tilde{x} = 25$


kvartily $Q_1 = (23+23)/2 = 23$, $Q_3 = (28+28)/2 = 28$

18	19	20	20	20	21	21	21	21	21	21
21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22
22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26
26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29
29	29	29	30	30	30	31	31	32	32	32
32	33	33	33	34	35	35	37	38		

▶ Návrat míry var. věku matek

příklad: tolary ($\tilde{x} = 14$, $Q_1 = 12$, $Q_3 = 19,5$)


10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
14	14	14	15	15	15	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	17	17	17	18	19	
19	19	19	19	20	20	20	21	21	21	
21	22	22	22	24	24	24	26	27	27	
28	32	35	36	36	40	43	45	47		



krabicový diagram

- ▶ **krabicový diagram** [box-plot] zobrazuje kvartily, medián, minimum, maximum, případně odlehlá pozorování: od bližšího kvartilu dál než $3/2 \cdot (Q_3 - Q_1)$ [boxplot(x)]

- ▶ příklad: věk matek ($Q_1 = 23$, $\tilde{x} = 25$, $Q_3 = 28$, dvě odlehlá pozorování)



průměr

- ▶ **průměr** [mean] (kdyby bylo všech n hodnot stejných) [mean(x)]

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- ▶ **vážený průměr:** [weighted mean] založen na četnostech

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (n_1 x_1^* + \dots + n_k x_k^*) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j^* = \sum_{j=1}^k \frac{n_j}{n} x_j^* = \frac{\sum_{j=1}^k n_j x_j^*}{\sum_{j=1}^k n_j}$$

- ▶ obecněji s vahami w_1, \dots, w_k hodnot x_1^*, \dots, x_k^*

$$\frac{\sum_{j=1}^k w_j x_j^*}{\sum_{j=1}^k w_j}$$

váhy musí být nezáporné ($w_j \geq 0$)

příklad: vážený průměr známek

předmět	známka	kredity	součin
A	1	6	6
B	1	6	6
C	2	4	8
D	3	4	12
celkem	7	20	32

► průměr (nevážený): $\bar{x} = 7/4 = 1,75$

► vážený průměr (vahami kredity): $\bar{x} = 32/20 = 1,6$

průměr pro nula-jedničkovou veličinu

- ▶ u nula-jedničkového měřítka: průměr = relativní četnost jedniček
- ▶ počet jedniček/počet všech hodnot (nul i jedniček)
- ▶ procento jedniček mezi všemi hodnotami (nulami a jedničkami)
- ▶ procento jedinců s danou vlastností
- ▶ pozor, nejde o pravděpodobnost, nanejvýš jde o její odhad!

modus

- ▶ **modus** \hat{x} [mode] nejčastější hodnota (lze počítat také pro nominální či ordinální měřítko)
- ▶ modus nemusí být určen jednoznačně, např. věk matek:

x_j^*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
n_j	1	1	3	12	6	9	10	12	10	6
x_j^*	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
n_j	9	4	3	2	3	3	1	2	1	1

příklad – věk matek

- ▶ již známe $\bar{x} = 25, Q_1 = 23, Q_3 = 28$
- ▶ modus není určen jednoznačně: $\hat{x} = 21, \hat{x} = 25$
- ▶ průměr

$$\bar{x} = \frac{1}{99} (26 + 35 + \dots + 21 + 23) = \frac{2544}{99} \doteq 25,7$$

- ▶ vážený průměr založený na třídění

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{5 \cdot 19 + 27 \cdot 22 + 32 \cdot 25 + 19 \cdot 28 + 8 \cdot 31 + 6 \cdot 34 + 2 \cdot 37}{5 + 27 + 32 + 19 + 8 + 6 + 2} \\ &= \frac{2547}{99} \doteq 25,7\end{aligned}$$

příklad – tolary

► průměr

$$\bar{x} = \frac{1}{99} (26 + 20 + \dots + 12 + 10) = \frac{1687}{99} \doteq 17,04$$

► vážený průměr založený na četnostech jednotlivých hodnot

$$\bar{x} = \frac{7 \cdot 10 + 14 \cdot 11 + 16 \cdot 12 + \dots + 1 \cdot 47}{7 + 14 + 16 + \dots + 1} = \frac{1687}{99} \doteq 17,04$$

► vážený průměr založený na třídních četnostech (obr. 24)

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{7 \cdot 10 + 14 \cdot 1 + 16 \cdot 12 + 28 \cdot 14,5 + \dots + 8 \cdot 40,5}{7 + 14 + 16 + 28 + 12 + 14 + 8} \\ &= \frac{1725}{99} \doteq 17,42\end{aligned}$$

► modus: $\hat{x} = 12$

[Jdi k četnostem tolářů](#)

příklad (věk matek):useknutý průměr

(průměr počítán pouze z černých čísel)

vyloučí se $[0,1 \cdot 99] = [9,9] = 9$ ($\lfloor x \rfloor$ znamená celou část z x)
nejmenších a 9 největších hodnot

18	19	20	20	20	21	21	21	21	21
21	21	21	21	21	21	21	22	22	22
22	22	22	23	23	23	23	23	23	23
23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	26	26	26	26	26	26
26	26	26	26	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	29
29	29	29	30	30	30	31	31	32	32
32	33	33	33	34	35	35	37	38	

useknutý průměr

také míra polohy

- alfa-useknutý průměr [trimmed mean]: nejprve se oddělí (usekne) 100α % nejmenších a 100α % největších hodnot, ze zbytku se spočítá průměr
- je robustní (necitlivý) vůči odlehlym hodnotám
- volí se zpravidla $\alpha = 0,1$ (0,15)
- příklad: věk matek [mean(vek.m,trim=0.1)]

$$\frac{1}{99 - 18} (x_{(10)} + x_{(11)} + \dots + x_{(89)} + x_{(90)}) = 25,3$$

vlastnosti charakteristik polohy

- změníme-li všechny hodnoty x_i tak, že přidáme ke každé stejnou konstantu a , změní se o tutéž konstantu také charakteristika polohy (posunutí)
- změníme-li všechny hodnoty x_i tak, že je vynásobíme kladnou konstantou b , toutéž konstantou musíme vynásobit původní charakteristiku polohy, abychom dostali charakteristiku polohy pro upravená data (změna měřítka)
- obecně pro míru polohy $m(x)$

$$\begin{aligned}m(a+x) &= a + m(x), \\ m(b \cdot x) &= b \cdot m(x), \quad b > 0\end{aligned}$$

- v obou případech míra polohy reaguje

charakteristiky variability

- měří nestejnost (**variabilitu**) hodnot spojité veličiny
- obecně pro míru variability $s(x)$

$$\begin{aligned}s(a + x) &= s(x), \\ s(b \cdot x) &= b \cdot s(x), \quad b > 0\end{aligned}$$

- přičtením stejných konstant a (posunutím) se charakteristika variability nezmění (nezávisí na poloze)
- vynásobení kladnou konstantou znamená, že stejnou konstantou nutno vynásobit charakteristiku variability
- **rozpětí** [range] $R = x_{(n)} - x_{(1)}$
- **kvartilové rozpětí** [quartile range] $R_Q = Q_3 - Q_1$

směrodatná odchylka

- rozptyl měří průměrný čtverec vzdálenosti od průměru
- **směrodatná odchylka** [std. deviation]: odmocnina z rozptylu **[SMODCH.VÝBĚR]** $[sd(x)]$

$$s_x = \sqrt{s_x^2}$$

- zcela vyhovuje požadavkům na míry variability
- výhoda směrodatné odchylky: stejný fyzikální rozdíl jako původní data
- výběrový rozptyl z *třídních* četností: Sheppardova korekce (jsou-li všechny intervaly délky h):

$$\text{odečti } \frac{h^2}{12}$$

rozptyl (variance)

- (výběrový) **rozptyl** (variance) [variance] **[VAR.VÝBĚR]** $[var(x)]$
(nevyhovuje druhému požadavku, místo toho: $s_{a+b \cdot x}^2 = b^2 \cdot s_x^2$)

$$\begin{aligned}s_x^2 &= \frac{1}{n-1} ((x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \cdot \bar{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k n_j (x_j^* - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{j=1}^k n_j x_j^{*2} - n \cdot \bar{x}^2 \right)\end{aligned}$$

- nechť $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 8$, pak je
 $\bar{x} = (1+3+8)/3 = 12/3 = 4$

$$s_x^2 = \frac{1}{3-1} ((1-4)^2 + (3-4)^2 + (8-4)^2) = \frac{26}{2} = 13 \doteq 3,6^2$$

příklad – věk matek

- rozpětí: $R = 38 - 18 = 20$
- kvartilové rozpětí: $R_Q = 28 - 23 = 5$
- rozptyl

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{98} \left((26^2 + 35^2 + \dots + 21^2 + 23^2) - 99 \cdot \left(\frac{2544}{99} \right)^2 \right) \\ &= 16,97 \doteq 4,12^2\end{aligned}$$

- směrodatná odchylka je 4,12

► Var. řada věku matek

příklad – věk matek 2

- pomocí třídních četností

$$s^2 = \frac{1}{98} \left((5 \cdot 19^2 + 27 \cdot 22^2 + \dots + 2 \cdot 37^2) - 99 \cdot \left(\frac{2547}{99} \right)^2 \right)$$

$$= 16,36 = (4,05)^2$$

- navíc Sheppardova korekce

$$s^2 = 16,36 - \frac{3^2}{12} = (3,95)^2$$

střední odchylka

- **střední odchylka** [mean deviation]: průměr odchylek od mediánu (někdy od průměru) $[mean(abs(x-median(x)))]$

$$d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

- **střední diference**: průměr vzájemných vzdáleností všech n^2 dvojic

$$\Delta = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|$$

$$= \frac{2}{n^2} \sum_{j>i} \sum_{i,j} (x_{(j)} - x_{(i)})$$

normované charakteristiky rozptýlenosti

- dosud zavedené charakteristiky variability závisejí na volbě měřítka (např. délka v m nebo v km)
- hledáme charakteristiky nezávislé na měřítku, nutně *poměrové měřítko, kladné hodnoty*
- umožní **porovnání** z různých souborů
- **variační koeficient** $[sd(x)/mean(x)]$

$$v = \frac{s_x}{\bar{x}}$$

- **(Giniho) koeficient koncentrace**

$$G = \frac{\Delta}{2\bar{x}} \left(= \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot x_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n} \right)$$

například měří nerovnoměrnost příjmů, velikostí územních jednotek, souvisí s plochou u Lorenzovy křivky

z -skór, standardizace

- variační koeficient v , Giniho koeficient G – příklady bezrozměrných veličin (zásluhou průměru ve jmenovateli závisí G i v na posunutí!)
- z -skóry $[STANDARDIZE(x;průměr(x);smodch.výběr(x))]$
 $*[(x-mean(x))/sd(x)]$ nebo $[c(scale(x))]$

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s_x}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- dostaneme nulový průměr ($\bar{z} = 0$), jednotkový rozptyl ($s_z = 1$)
- z -skóry jsou bezrozměrné \Rightarrow umožní hodnotit vlastnosti nezávislé na poloze a variabilitě, např. tvar rozdělení
- $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3 \Rightarrow \bar{x} = 2, s_x = 1$
 $z_1 = \frac{1-2}{1} = -1, z_2 = \frac{2-2}{1} = 0, z_3 = \frac{3-2}{1} = 1$

charakteristiky tvaru: šíkmost

- invariantní vůči posunutí i změně měřítka:

$$\gamma(a + x) = \gamma(x)$$

$$\gamma(b \cdot x) = \gamma(x) \quad b > 0$$

- **šíkmost** $\sqrt{b_1}$ – **průměr** z 3. mocnin z-skórů

[SKEW()] [mean(scale(x)^3)]

$$\sqrt{b_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right)^3$$

- pro symetrický histogram $\sqrt{b_1}$ blízké nule
- doprava protažený histogram pro $\sqrt{b_1} >> 0$
- doleva protažený histogram pro $\sqrt{b_1} << 0$

přehled závislostí

- abychom mohli vyšetřovat závislost, musíme na jedné statistické jednotce měřit aspoň dva znaky
- postupy (i grafické) závisí na měřících obou znaků
 - kvalitativní – kvalitativní (vzdělání – pracovní zařazení)
 - kvalitativní – kvantitativní (vzdělání – roční příjem)
 - kvantitativní – kvantitativní (věk – roční příjem)
- zatím popisné charakteristiky a grafy, prokazování závislosti později

charakteristiky tvaru: špičatost

- **špičatost** b_2 – **průměr** ze 4. mocnin z-skórů

(někdy se odečítá 3) [KURT()]

[mean(scale(x)^4)]

$$b_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right)^4$$

- někdy se počítají odhadы populační šíkmosti a špičatosti jinak (Excel: s_x jinak, Fisherovo g_1, g_2 – pro zajímavost)

$$g_1 = \frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} \sqrt{b_1}, \quad g_2 = \frac{(n+1)(n-1)}{(n-2)(n-3)} \left(b_2 - \frac{3(n-1)}{n+1} \right)$$

- šíkmost a špičatost slouží k hodnocení, zda lze předpokládat normální rozdělení (bude zavedeno později)

kvalitativní – kvalitativní


- kvalitativní data – znak v nominálním (ordinálním) měřítku
- hodnoty vyjadřujeme pomocí četnosti
- dva znaky – četnosti možných **dvojic hodnot** n_{ij} (**sdružené četnosti**)
- zapisujeme do **kontingenční tabulky** [contingency table] [table(x,y)] nebo [xtabs(~x+y)]
- doplňujeme **marginální četnosti** [marginal frequencies]
 - součty po řádcích a po sloupcích
 - četnosti jednotlivých hodnot každého ze znaků zvlášť
- oba znaky nula-jedničkové – kontingenční tabulka 2×2 , **čtyřpolní tabulka** [fourfold table]

příklad – vzdělání matek

(pozor na orientaci grafu!)

vzdělání	porodnice		celkem
	Praha	venkov	
základní	23	11	34
střední	30	17	47
VŠ	17	1	18
celkem	70	29	99

vzdělání	porodnice		celkem
	Praha	venkov	
základní	32,9 %	37,9 %	34,3 %
střední	42,8 %	58,6 %	47,5 %
VŠ	24,3 %	3,5 %	18,2 %
celkem	100 %	100 %	100 %




příklad – vzdělání matek

(pozor na orientaci)

vzdělání	porodnice		celkem
	Praha	venkov	
základní	23	11	34
střední	30	17	47
VŠ	17	1	18
celkem	70	29	99

vzdělání	porodnice		celkem
	Praha	venkov	
základní	67,6 %	32,4 %	100 %
střední	63,8 %	36,2 %	100 %
VŠ	94,4 %	6,6 %	100 %
celkem	70,7 %	29,3 %	100 %



kvalitativní – kvantitativní

- ▶ podle kvalitativní proměnné rozdělíme hodnoty kvantitativní proměnné do dílčích souborů
- ▶ porovnáme charakteristiky dílčích souborů (zejména charakteristiky polohy) mezi sebou, pokud se hodně liší, svědčí to pro závislost
- ▶ celkový průměr = vážený průměr dílčích souborů
- ▶ celkový rozptyl $\hat{=}$ vážený průměr rozptylů + vážený rozptyl průměrů (přesně jen pro populační rozptyly s n ve jmenovateli)
- ▶ snáze jako **rozklad součtu čtverců**

příklad: platy u tří skupin zaměstnanců

skup.	příjem	n_j	\bar{x}_j	s_j	s_j^2
žlutí	200 150	2	175,00	35,4	1250,0
modří	80 70 60 60	4	67,50	9,6	91,7
černí	20 20 18 18 15 15 10 10	8	15,75	4,0	16,2
celkem	746	14	53,29	57,7	3334,4

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 175,0 + 4 \cdot 67,50 + 8 \cdot 15,75}{2 + 4 + 8} = 53,29$$

$$s^2 = 3334,4 > \frac{2 \cdot 1250,0 + 4 \cdot 91,7 + 8 \cdot 16,2}{2 + 4 + 8} = 214,0$$

- ▶ nevážený (nesmyslný) průměr by byl 86,08!
- ▶ rozptyl celkem je mnohem větší, než jsou rozptyly ve skupinách
- ▶ příčina: nestejně průměry

rozklad součtu čtverců

- velikost kolísání **všech** platů (celková variabilita):

$$\begin{aligned} SST = & (200 - 53,29)^2 + (150 - 53,29)^2 + (80 - 53,29)^2 + \dots \\ & + (10 - 53,29)^2 = 43\ 346,86 \end{aligned}$$

- velikost kolísání **uvnitř** skupin:

$$\begin{aligned} SSE = & (200 - 175)^2 + (150 - 175)^2 + (80 - 67,5)^2 + \dots \\ & + (10 - 15,75)^2 = 1\ 638,5 \end{aligned}$$

- kolísání průměrů (**mezi** skupinami):


$$\begin{aligned} SSA = & 2 \cdot (175 - 53,29)^2 + 4 \cdot (67,5 - 53,29)^2 \\ & + 8 \cdot (15,75 - 53,29)^2 = 41\ 708,36 \end{aligned}$$

- kontrola: $1\ 638,5 + 41\ 708,36 = 43\ 346,86$

kvantitativní – kvantitativní


[plot(iq~zn7,data=iq,col=1+divka,pch="+")]

záporná korelace



$$r = -0,69$$

kladná korelace



$$r = 0,45$$

rozklad součtu čtverců obecně

- x_{ij} j -tá hodnota v i -té skupině (plat j -té osoby v i -té skupině)
- n_i počet hodnot v i -té skupině, k počet skupin
- $\bar{x}_{i\bullet}$ průměr v i -té skupině (průměrný plat v i -té skupině)
- $\bar{x}_{\bullet\bullet}$ celkový průměr (průměr všech platů)

$$\begin{aligned} SST &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_{\bullet\bullet})^2 \\ &= \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_{i\bullet} - \bar{x}_{\bullet\bullet})^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_{i\bullet})^2 \\ &= SSA + SSE \end{aligned}$$

popis závislosti spojitéhých veličin

- (výběrová) **kovariance** [covariance] [cov(vek.o, vek.m)]

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

► zřejmě je $s_{xx} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x}) = s_x^2$, $s_{yy} = s_y^2$

► (Pearsonův, momentový) **korelační koeficient**
[(Pearson, product-moment) correlation coefficient]

► lze zapsat pomocí z -skóru[cor(vek.o, vek.m)]

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \cdot \frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \right)$$

příklad: hmotnost a délka dětí (24. týden věku)

- ▶ délka [cm]: $\bar{x} = 68,5 \quad s_x = 3,28$
- ▶ hmotnost [g]: $\bar{y} = 7690, \quad s_y = 845$
- ▶ kovariance [cm · g]: $s_{xy} = 1257$
- ▶ korelační koeficient: $r = \frac{1257}{3,28 \cdot 845} = 0,45$
- ▶ hmotnost [kg]: $\bar{y} = 7,69 \quad s_y = 0,845$
- ▶ kovariance [cm · kg]: $s_{xy} = 1,257$
- ▶ korelační koeficient: $r = \frac{1,257}{3,28 \cdot 0,845} = 0,45$
- ▶ které charakteristiky závisí na použitém měřítku?

vlastnosti Pearsonova korelačního koeficient

- ▶ vypovídá o směru závislosti
- ▶ při $r < 0$ s rostoucím x v průměru y klesá (např. IQ a známky)
- ▶ při $r > 0$ s rostoucím x v průměru y roste (např. váha a výška)
- ▶ platí $-1 \leq r \leq 1$
- ▶ $|r| = 1$ jedině tehdy, když body $[x; y]$ leží na přímce
- ▶ vzájemné nezávislosti x, y odpovídají r blízká nule (upřesníme!)
- ▶ nemusí zachytit křivočarou (nelineární) závislost

charakteristiky polohy v geografii/demografii

- ▶ často známe jen průměry v dílčích souborech a četnosti: průměry se použijí jako x_j^* , četnosti standardně
- ▶ příklad: věk nových profesorů a docentů UK 2002:
41 profesorů, průměrný věk 51,1 ($n_1 = 41, x_1^* = 51,1$)
77 docentů, průměrný věk 47,8 ($n_2 = 77, x_2^* = 47,8$)
celkový průměr (**vážený průměr**):

$$[\text{weighted.mean}(\text{c}(51.1, 47.8), \text{c}(41, 77))]$$

$$\frac{41 \cdot 51,1 + 77 \cdot 47,8}{41 + 77} = 48,9$$

nikoliv

$$[\text{mean}(\text{c}(51.1, 47.8))]$$

$$\frac{51,1 + 47,8}{2} = 49,4$$

charakteristiky polohy v geografii/demografii (2)

- ▶ **geografický střed**
 - ▶ bod
 - ▶ průsečík průměrné zeměpisné šířky a průměrné zeměpisné délky; průměry vážené velikostí sledovaného jevu
- ▶ **geografický medián** – obdoba mediánu,
 - ▶ čára, která rozděluje geografické objekty do dvou disjunktních skupin
 - ▶ hodnocená vlastnost určí váhy objektů
 - ▶ uspořádání hodnocení znaků dáno zvolenou geografickou vlastností (např. zeměpisnou délkou)

míry nerovnoměrnosti

- **Giniho index** charakterizuje nerovnoměrnost rozdělení bohatství (příjmů, ...) jedním číslem $G = \Delta/(2\bar{x})$
- průměrný rozdíl v bohatství vztažený k dvojnásobku průměru
- mají-li všichni stejně ($x_{(1)} = \dots = x_{(n)} > 0$), je nutné $\Delta = 0$ a tedy $G = 0$
- má-li jeden všechno, ostatní nic ($0 = x_{(1)} = \dots = x_{(n-1)} < x_{(n)} = a$), pak je

$$\bar{x} = \frac{a}{n}$$

$$\Delta = \frac{2(n-1)a}{n^2}$$

$$G = \frac{2(n-1)a}{n^2} \cdot \frac{n}{2a} = \frac{n-1}{n}$$

- Lorenzova křivka je jemnějším nástrojem

příklad: tolary (rozdělení příjmů)

jaké procento nejchudších získá **polovinu** celkového bohatství?
četnosti (celkový měsíční příjem je 1687)

x_j	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_j	7	14	16	10	6	3	9	3	1	5	3
x_j	21	22	24	26	27	28	32	35	36	40	43
n_j	4	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1

sčítajme příjmy nejchudších, dokud nenasčítáme 50 % z 1687

$$(7 \cdot 10 + \dots + 9 \cdot 16 + 17)/1687 = 836/1687 = 0,4956 = 49,56 \%$$

$$(7 \cdot 10 + \dots + 9 \cdot 16 + 2 \cdot 17)/1687 = 853/1687 = 0,5056 = 50,56 \%$$

u jaké části z 99 osob jsme sčítali příjmy?

$$(7 + \dots + 9 + 1)/99 = 66/99 = 0,6667 = 66,67 \%$$

$$(7 + \dots + 9 + 2)/99 = 67/99 = 0,6768 = 67,68 \%$$

příklad: tolary (rozdělení příjmů)

jaké procento nejchudších získá **desetinu** celkového bohatství?
četnosti 99 osob (celkový měsíční příjem je 1687)

x_j	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_j	7	14	16	10	6	3	9	3	1	5	3
x_j	21	22	24	26	27	28	32	35	36	40	43
n_j	4	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1

sčítajme příjmy nejchudších, dokud nenasčítáme 10 % z 1687

$$(7 \cdot 10 + 8 \cdot 11)/1687 = 158/1687 = 0,0937 = 9,37 \%$$

$$(7 \cdot 10 + 9 \cdot 11)/1687 = 169/1687 = 0,1002 = 10,02 \%$$

u jaké části z 99 osob jsme sčítali příjmy?

$$(7 + 8)/99 = 15/99 = 0,152 = 15,2 \%$$

$$(7 + 9)/99 = 16/99 = 0,162 = 16,2 \%$$

příklad: tolary (rozdělení příjmů)

jaké procento získají čtyři (tj. asi 4 %) nejbohatší resp. nejchudší?
četnosti (celkový měsíční příjem je 1687)

x_j	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_j	7	14	16	10	6	3	9	3	1	5	3
x_j	21	22	24	26	27	28	32	35	36	40	43
n_j	4	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1


sečteme příjmy oněch čtyř nejbohatších

$$(47 + 45 + 43 + 40)/1687 = 175/1687 = 0,1037 = 10,37 \%$$

čtyři nejbohatší tedy dostanou přes 10 % bohatství,
kdežto čtyři nejchudší dostanou

$$(4 \cdot 10)/1687 = 40/1687 = 0,0237 = 2,37 \%$$

Lorenzova křivka (Tolary)




3. přednáška 15. října 2007

Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

umělý příklad

 $x_1, \dots, x_5: 1, 2, 3, 4, 5$

j	j/n	$x_{(j)}$	X_j	X_j/X_n
0	0,0	0	0	0,000
1	0,2	1	1	0,067
2	0,4	2	3	0,200
3	0,6	3	6	0,400
4	0,8	4	10	0,667
5	1,0	5	15	1,000



3. přednáška 15. října 2007

Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

Lorenzova křivka

- ▶ variační řada: $0 < x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ $[sort(x)]$
- ▶ kumulativní součty pro $j = 0, 1, \dots, n$ $[cumsum(sort(x))]$
(kolik patří celkem j nejchudším)

$$X_0 = 0 \quad X_j = x_{(1)} + x_{(2)} + \dots + x_{(j)} = \sum_{i=1}^j x_{(i)}$$

- ▶ úsečkami spojit body $[j/n; X_j/X_n]$, $0 \leq j \leq n$
- ▶ zajímá nás plocha nad touto lomenou čarou a pod úhlopříčkou jednotkového čtverce
- ▶ plocha měří nerovnoměrnost rozdělení nějakého zdroje
- ▶ kdyby dostal každý stejně, bude velikost plochy nulová
- ▶ Giniho koeficient koncentrace je dvojnásobkem této plochy

3. přednáška 15. října 2007

Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

příklad - pokračování výpočet Giniho koeficientu ($n = 5$)

$$\begin{aligned} 5^2 \cdot \Delta &= |1-1| + |1-2| + |1-3| + |1-4| + |1-5| \\ &\quad + |2-1| + |2-2| + |2-3| + |2-4| + |2-5| \\ &\quad + |3-1| + |3-2| + |3-3| + |3-4| + |3-5| \\ &\quad + |4-1| + |4-2| + |4-3| + |4-4| + |4-5| \\ &\quad + |5-1| + |5-2| + |5-3| + |5-4| + |5-5| \\ &= 10 + 7 + 6 + 7 + 10 \end{aligned}$$

$$\Delta = 40/25 = 1,6$$

$$\bar{x} = 3$$


$$G = \frac{1,6}{2 \cdot 3} = \frac{1,6}{6} = 0,267$$

3. přednáška 15. října 2007


Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

Lorenzova křivka počet hejtmanů v krajích ČR

- v každém kraji je stejně hejtmanů, proto postupné součty rovnoměrně rostou, totéž platí pro X_j/X_n
- lomená čára Lorenzovy křivky přejde v úsečku a plocha zmizí
- průměrná diference je nulová (všechny rozdíly $|x_i - x_j|$ u počtu hejtmanů jsou nulové)



Lorenzova křivka (obyvatelé – kraje)





příklad: kraje ČR ke konci roku 2006

kraj <i>i</i>	obyvatel <i>y_i</i>	rozloha [km ²] <i>n_i</i>	hustota na km ² <i>x_i</i>
Hlavní město Praha	1 188 126	496,1	2 395,0
Středočeský kraj	1 175 254	11 014,7	106,7
Jihočeský kraj	630 006	10 056,9	62,6
Plzeňský kraj	554 537	7 561,1	73,3
Karlovarský kraj	304 602	3 314,6	91,9
Ústecký kraj	823 265	5 334,5	154,3
Liberecký kraj	430 774	3 163,0	136,2
Královéhradecký kraj	549 643	4 758,4	115,5
Pardubický kraj	507 751	4 518,6	112,4
Vysocina	511 645	6 795,6	75,3
Jihomoravský kraj	1 132 563	7 196,3	157,4
Olomoucký kraj	639 894	5 266,8	121,5
Zlínský kraj	589 839	3 963,5	148,8
Moravskoslezský kraj	1 249 290	5 427,0	230,2
celkem	1 0287 189	78 867,0	130,4

Lorenzova křivka pro tolary ještě jinak

- spousta hodnot proměnné tolary se opakuje, mohli jsme použít četnosti
- hodnota $x_{(j)}$ se vyskytuje n_j krát
 - o $10*7=70$ tolarů se rozdělilo 7 „nejchudších“ osob
 - o $11*14=154$ tolarů se rozdělilo 14 druhých „nejchudších“
 - ...
 - posledních 47 tolarů připadlo jedinému nejbohatšímu




případ s vahami - příklad

- ▶ nerovnoměrnost rozmístění obyvatel v republice, ale údaje jen podle krajů
- ▶ potřebovali bychom pro každý jednotlivý km^2 znát počet obyvatel zde žijících
- ▶ známe jen počty obyvatel y_i v krajích a rozlohu krajů n_i
- ▶ předpokládáme rovnoměrné rozmístění uvnitř kraje, tedy $x_i = y_i/n_i$ obyvatel na každý km^2 v i -tému kraji
- ▶ každou takovou hustotu x_i musíme započítat n_i krát
- ▶ celková plocha $n = n_1 + \dots + n_{14} (= N_{14})$
- ▶ průměrný počet obyvatel na km^2

$$\bar{x} = \frac{\sum_i n_i x_i}{\sum_i n_i} = \frac{\sum_i n_i (y_i/n_i)}{n} = \frac{\sum_i y_i}{n} = \bar{y}$$


[► Jdi zpět k tabulce](#)

Lorenzova křivka: obyvatelé krajů, vztaženo k rozloze



[► Jdi ke grafu okresů](#) [► Jdi zpět k tabulce](#)

Lorenzova křivka: obyvatelé okresů, vztaženo k rozloze



[► Jdi zpět ke grafu krajů](#)

poznámky

- ▶ hrubší hodnocení (kraje, nikoliv okresy) znamená **menší** hodnotu Giniho indexu!
- ▶ nezáleží na zvolených jednotkách
- ▶ na vodorovné ose jde o umístění v řadě od nejchudších k nejbohatším
- ▶ označme kumulativní součty $N_i = \sum_{j=1}^k n_j$
- ▶ na svislé ose jde o podíl na bohatství
- ▶ označme kumulativní součty od nejchudších $Y_i = \sum_{j=1}^i y_j$
- ▶ pro zajímavost: $N_k = n$, rozděluje se bohatství Y_k
- ▶ ve všech případech je **pořadí** sčítanců dán pořadím „hustot“ $x_i = \frac{y_i}{n_i}$ (např. obyvatel/rozloha)

výpočet v případě vah


- ▶ kumulativní součty $N_i = \sum_{j=1}^k n_j$, $Y_i = \sum_{j=1}^k Y_j$
- ▶ střední diference průměrných počtů obyvatel na km² (hustot)

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k n_i n_j |x_i - x_j| = \frac{1}{(\sum n_t)^2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k n_i n_j \left| \frac{y_i}{n_i} - \frac{y_j}{n_j} \right| \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k |n_j y_i - n_i y_j| = \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^{k-1} (N_i Y_{i+1} - N_{i+1} Y_i) \\ G &= \frac{\Delta}{2\bar{y}} = \sum_{i=1}^{k-1} \left(\frac{N_i}{N_k} \frac{Y_{i+1}}{Y_k} - \frac{N_{i+1}}{N_k} \frac{Y_i}{Y_k} \right)\end{aligned}$$

- ▶ Lorenzova křivka spojuje body $\left[\frac{N_i}{N_k}; \frac{Y_i}{Y_k} \right]$

[► Jdi zpět k tabulce dat](#)

příklad Pavlík, Kühnl: str. 114



příklad Pavlík, Kühnl: str. 114 (okresy středočeského kraje)

Okres <i>i</i>	plocha [km ²] <i>n_i</i>	obyvatel <i>y_i</i>	hustota na km ² <i>x_i</i>
BN	1443	88288	61,2
RA	930	56489	60,7
PB	1629	106266	65,2
KH	937	81890	87,4
MB	1067	109766	102,9
NB	881	94377	107,1
BE	662	79764	120,5
KO	819	99408	121,4
PZ	634	77940	122,9
ME	713	96104	134,8
PH	597	94328	158,0
KL	692	154445	223,2
AB	496	1175522	2370,0
celkem	11500	2314587	201,3

možné příští úlohy statistické indukce

- ▶ na hracích kostkách A a B padala šestka nestejně často:
na kostce A v 17 ze 100 pokusů
na kostce B v 41 ze 100 pokusů
- ▶ je pravděpodobnost šestky rovna 1/6?
 - ▶ teorie pravděpodobnosti odvodí teoretickou hodnotu
 - ▶ matematická statistika odhadne, prověří představu teorie
- ▶ je kostka symetrická, tj. mají všechny stěny kostky stejnou pravděpodobnost?
- ▶ kolik potřebujeme nezávislých hodů, abychom s požadovanou spolehlivostí poznali, že je kostka nesymetrická?
- ▶ liší se mezi sebou kostky A a B?
- ▶ vše založeno na modelu **populace – výběr** [population, sample]

populace a výběr

- ▶ model **populace – výběr** umožňuje zobecnění na celou populaci z hodnot zjištěných na vybraných statistických jednotkách (výběr)
- ▶ **populace (základní soubor)** – velký soubor, jehož je zpracovávaný soubor (**výběr**) reprezentativním vzorkem
- ▶ **reprezentativnost** – frekvence výskytu důležitých doprovodných znaků ve výběru odpovídá jejich frekvenci v populaci
- ▶ reprezentativnosti nejlépe dosáhneme tak, že použijeme **prostý náhodný výběr**, kdy každá n -tice prvků populace má stejnou šanci (pravděpodobnost) do výběru se dostat
- ▶ na základě výběru tvrdíme něco o populaci

základní pojmy

- ▶ **pokus** – dobře definovaná situace (postup), která končí jedním z řady možných výsledků (vržená kostka spadne na zem)
- ▶ **náhodný pokus** – pokus, u něhož předem nevíme, který výsledek nastane (která strana kostky padne příště?); předpokládá se stabilita relativních četností možných výsledků
- ▶ **náhodný jev** – tvrzení o výsledku náhodného pokusu
- ▶ **pravděpodobnost** náhodného jevu A – číselné vyjádření očekávání, že výsledkem náhodného pokusu bude právě A
- ▶ racionální představa: při velkém počtu opakování pokusu se relativní četnost jevu blíží k pravděpodobnosti tohoto jevu

parametry – odhady, statistiky

- ▶ podle toho, jakou roli hraje hodnocený soubor, rozlišujeme **charakteristiky**
 - ▶ **populační**: vztázené k populaci, mnohdy jen ideální, námi představované, jsou to **parametry** modelu
 - ▶ **výběrové**: vztázené k výběru z nějaké populace, jsou to **statistiky** spočítané z výběru
- ▶ **statistika** – z výběru spočítaná hodnota (např. součet napozorovaných hodnot, průměr, Giniho index ...)
- ▶ speciálním případem statistik jsou **odhady** odpovídajících populačních **parametrů**,
- ▶ příkladem dvojice odhad – parametr je dvojice relativní četnost – pravděpodobnost (např. 17/100 vers. 1/6)
- ▶ statistiky se používají při **statistické indukcí** (statistickém rozhodování) [statistical inference (decisions)]

klasická pravděpodobnost (Laplace)

- ▶ **jistý jev** (nastává vždy) lze rozdělit na M stejně pravděpodobných neslučitelných (disjunktních) **elementárních jevů** (symetrie)
- ▶ každý jev lze složit z těchto **elementárních jevů**
- ▶ je celkem M_A **příznivých** jevu A (je z nich složen)
- ▶ **klasická definice pravděpodobnosti** (metoda výpočtu)

$$P(A) = \frac{M_A}{M}$$

- ▶ **klasickou pst lze použít jen někdy!** (Sportka, Sazka)

příklad: hrací kostka

- ▶ idealizovaná symetrická hrací kostka
 - ▶ homogenní
 - ▶ přesná krychle
 - ▶ těžiště uprostřed
 - ▶ každá strana má stejnou pravděpodobnost
- ▶ A – padne šestka, B – padne sudé číslo
- ▶ $M = 6$
- ▶ $M_A = 1$, tedy $P(A) = 1/6$
- ▶ $M_B = 3$, tedy $P(B) = 3/6 = 1/2$

4. přednáška 22. října 2007

Statistiky (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

faktoriál

[FAKTOŘIÁL(n)]

[factorial(n)]

- ▶ faktoriál $n! = n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1$ $0! = 1$
- ▶ kolika způsoby lze uspořádat za sebou n rozlišitelných prvků
- ▶ příklady:
 - ▶ $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
 - ▶ $1! = 1$
- ▶ kolika způsoby lze uspořádat za sebou 14 krajů ČR: $14! = 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdots 2 \cdot 1 = 87\ 178\ 291\ 200 = 8,7 \cdot 10^{10}$

příklad: hrací kostka

- ▶ idealizovaná symetrická hrací kostka
 - ▶ homogenní
 - ▶ přesná krychle
 - ▶ těžiště uprostřed
 - ▶ každá strana má stejnou pravděpodobnost
- ▶ A – padne šestka, B – padne sudé číslo
- ▶ $M = 6$
- ▶ $M_A = 1$, tedy $P(A) = 1/6$
- ▶ $M_B = 3$, tedy $P(B) = 3/6 = 1/2$

4. přednáška 22. října 2007

Statistiky (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

příklad: losování otázek (1)

[KOMBINACE(n; k)]

[choose(n, k)]

- ▶ kombinaciční číslo $\binom{n}{k}$ (čti „ n nad k “)
- ▶ počet k -prvkových podmnožin množiny o n prvcích nezávisle na jejich pořadí

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdots 2 \cdot 1}$$

- ▶ kolika způsoby si mohu z pěti knížek vybrat dvě na dovolenou:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

- ▶ kolika způsoby si z oněch pěti mohu vybrat tři knihy? (10)

4. přednáška 22. října 2007

Statistiky (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

faktoriál

[FAKTOŘIÁL(n)]

[factorial(n)]

- ▶ faktoriál $n! = n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1$ $0! = 1$
- ▶ kolika způsoby lze uspořádat za sebou n rozlišitelných prvků
- ▶ příklady:
 - ▶ $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
 - ▶ $1! = 1$
- ▶ kolika způsoby lze uspořádat za sebou 14 krajů ČR: $14! = 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdots 2 \cdot 1 = 87\ 178\ 291\ 200 = 8,7 \cdot 10^{10}$

4. přednáška 22. října 2007

Statistiky (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

příklad: losování otázek (1)

- ▶ student neumí 5 otázek, umí 10 otázek

- ▶ losuje se dvojice otázek z oněch 15 otázek

- ▶ pravděpodobnost $P(A)$, že student nezná ani jednu z vylosovaných:

- ▶ elementární jevy: první losovaná otázka – 15 možností, druhá jen 14 možností, nezáleží na pořadí, tedy dělit 2 (tedy počet kombinací)

$$M = \binom{5+10}{2} = \binom{15}{2} = \frac{15!}{2!13!} = \frac{15 \cdot 14}{2 \cdot 1} = 105$$

- ▶ příznivé elementární jevy: vylosuje obě z pěti, které neumí

$$M_A = \binom{5}{2} \binom{10}{0} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} \cdot 1 = 10 \Rightarrow P(A) = \frac{10}{105} = 9,5 \%$$

4. přednáška 22. října 2007

Statistiky (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

příklad: losování otázek (2)

- pravděpodobnost $P(B)$, že zná právě jednu otázku

$$M_B = \binom{5}{1} \cdot \binom{10}{1} = 5 \cdot 10 = 50 \Rightarrow P(B) = \frac{50}{105} = 47,6\%$$

- pravděpodobnost $P(C)$, že zná obě otázky (právě dvě)

$$M_C = \binom{5}{0} \cdot \binom{10}{2} = 1 \cdot \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45 \Rightarrow P(C) = \frac{45}{105} = 42,9\%$$

- pravděpodobnost $P(D)$, že zná aspoň jednu otázku

$$M_D = M_B + M_C = 50 + 45 = 95 \Rightarrow P(D) = \frac{95}{105} = 90,5\%$$

- kontrola: $M_D + M_A = M$

pravidla pro pravděpodobnost (2)


- neslučitelné jevy:** nemohou nastat nikdy současně, navzájem se vylučují; pro neslučitelné jevy platí

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- podmíněná pravděpodobnost** pravděpodobnost jevu A , když už jev B nastal:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Vennův diagram



$P(B) = 0,24$ = žlutá + šedivá plocha
 $P(A \cap B) = 0,16$ = šedivá plocha
 $P(A|B) = \text{šedivá vzhledem k (žlutá + šedivá)}$
 $P(A|B) = 0,16/0,24 = 0,67$, ale $P(A) = 0,42$


pravidla pro pravděpodobnost (1)

- sjednocení** jevů $A \cup B$: platí **A nebo B** (aspoň jeden z jevů A, B)

- průnik** $A \cap B$: platí A a **současně B** (oba jevy A, B současně)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- Vennův diagram




$A \cup B$ = celá vybarvená plocha
 $P(A) = 0,42$ = zelená + šedivá plocha
 $P(B) = 0,24$ = žlutá + šedivá plocha
 $P(A \cap B) = 0,16$ = šedivá plocha
 $P(A) + P(B) = \text{zelená + žlutá}$
 $+ 2 \cdot \text{šedivá plocha}$
 $P(A \cup B) = 0,42 + 0,24 - 0,16 = 0,50$

nezávislost náhodných jevů

- nezávislé jevy:** výskyt jednoho jevu **neovlivní** pravděpodobnost výskytu druhého (definice **nezávislosti** náhodných jevů):

$$P(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

- Vennův diagram



$P(A) = 0,60$ = zelená + šedivá
 $P(B) = 0,40$ = žlutá + šedivá plocha
 $P(A \cap B) = 0,24$ = šedivá plocha
 $P(A|B) = \text{šedivá vzhledem k (žlutá + šedivá)}$
 $P(A|B) = 0,24/0,40 = 0,60$
 $P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$
 $\Rightarrow A$ a B jsou nezávislé

idealizovaný příklad


- ▶ A – jednička ze statistiky, $P(A) = 0,3$
- ▶ B – jednička z matematiky, $P(B) = 0,2$
- ▶ $A \cap B$ – jednička z obou předmětů, $P(A \cap B) = 0,1$
- ▶ jsou jevy A, B nezávislé? (jsou jedničky ze dvou předmětů nezávislé?) NE, protože $0,3 \cdot 0,2 \neq 0,1$
- ▶ jaká je pst jedničky ze statistiky, když už je z matematiky?

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5$$

- ▶ pst jedničky z matematiky, když už je ze statistiky: $P(B|A) = 0,1/0,3 = 1/3$
- ▶ pravděpodobnost, že aspoň jedna jednička:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,3 + 0,2 - 0,1 = 0,4$$

věk matek (n=4838)



rozdělení náhodné veličiny

- ▶ **náhodná veličina** – číselně vyjádřený výsledek náhodného pokusu
- ▶ **diskrétní rozdělení** (pro četnosti) určeno seznamem možných hodnot a jejich pravděpodobnostmi:

$$x_1, x_2, \dots$$

$$P(X = x_1), P(X = x_2), \dots$$

- ▶ **spojité rozdělení** (pro spojité měřítko) určeno **distribuční funkcí**

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

nebo **hustotou**

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x), \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$


- ▶ velká populace, spojitá veličina – intervaly pro třídění mohou být krátké, obálce histogramu relativních četností odpovídá **hustota** $f_X(x)$ [density]
- ▶ podobně kumulativním relativním četnostem odpovídá **distribuční funkce** [distribution function]
- ▶ bezprostředním výběrovým protějškem distribuční funkce je **empirická distribuční funkce**

$$F_n(x) = \frac{\#(x_i \leq x)}{n}$$

- ▶ $x_1^* < x_2^* < \dots < x_m^*$ existující různé hodnoty n_1, n_2, \dots, n_m jejich četnosti ($n = \sum_j n_j$)
- ▶ $F_n(x)$ je schodovitá funkce, v bodě x_j^* má skok n_j/n

kumulativní distribuční funkce (tolary)

skoky odpovídají četnostem, např. ve 12 je skok z 0,21 na 0,37 o $16/99=0,16$



x_j^*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_j	7	14	16	10	6	3	9	3	1	5	3
N_j	7	21	37	47	53	56	65	68	69	74	77
x_j^*	21	22	24	26	27	28	32	35	36	40	43
n_j	4	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1
N_j	81	84	87	88	90	91	92	93	95	96	97
	98	99									

charakteristiky rozdělení náhodné veličiny (1)

- **střední hodnota** náhodné veličiny X (populační průměr)
- je to **vážený průměr možných hodnot**
- vahami jsou pravděpodobnosti hodnot

$$\mu_X = E X = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \dots = \sum_j x_j \cdot P(X = x_j)$$

- operátor E (expectation) aplikovaný na náhodnou veličinu X spočítá vážený průměr jejích hodnot, vahami jsou u diskrétního rozdělení pravděpodobnosti těchto hodnot
- pro spojité rozdělení

$$\mu_X = E X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

příklad diskrétního rozdělení: známky u zkoušky

X, Y známky ze dvou předmětů

známka k	1	2	3	4
$P(X = k)$	0,3	0,4	0,2	0,1
$P(Y = k)$	0,3	0,3	0,2	0,2

- z tabulky *nic* nepoznáme o případné závislosti X, Y
- jak jedním číslem charakterizovat úroveň známek?
- obyčejný průměr možných hodnot by X, Y nerozlišil
- použijme **vážený průměr**, kde vahami známek jsou **pravděpodobnosti možných hodnot**
- dostaneme tak **střední hodnoty** X a Y (**populační průměry**)

$$\mu_X = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,1 = 2,1$$

$$\mu_Y = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,2 = 2,3$$

- **střední hodnota funkce** $Y = g(X)$ náhodné veličiny X vážený průměr **funkčních hodnot**

$$E Y = E g(X) = \sum_k g(x_k) P(X = x_k)$$

resp. pro spojité rozdělení

$$E Y = E g(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

- **populační medián** $\tilde{\mu}$ spojitého rozdělení

$$F_X(\tilde{\mu}) = P(X \leq \tilde{\mu}) = 0,5$$

$\tilde{\mu}$ číslo, které dělí možné hodnoty náhodné veličiny na dva stejně pravděpodobné intervaly hodnot větších a menších

příklad diskrétního rozdělení: známka u zkoušky

známka k	1	2	3	4	μ	σ^2	σ
$P(X = k)$	0,3	0,4	0,2	0,1	2,1	0,89	0,943
$P(Y = k)$	0,3	0,3	0,2	0,2	2,3	1,21	1,100

- ▶ jedním číslem charakterizovat kolísání známek (**variabilitu**)
- ▶ (**populační**) **rozptyl** = **vážený průměr čtverců** vzdáleností od střední hodnoty
- ▶ vahami jsou pravděpodobnosti

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= (1 - 2,1)^2 \cdot 0,3 + (2 - 2,1)^2 \cdot 0,4 \\ &\quad + (3 - 2,1)^2 \cdot 0,2 + (4 - 2,1)^2 \cdot 0,1 = 0,89 = 0,943^2 \\ \sigma_Y^2 &= (1 - 2,3)^2 \cdot 0,3 + (2 - 2,3)^2 \cdot 0,3 \\ &\quad + (3 - 2,3)^2 \cdot 0,2 + (4 - 2,3)^2 \cdot 0,2 = 1,21 = 1,1^2\end{aligned}$$

vlastnosti střední hodnoty a rozptylu

X, Y – náhodné veličiny, a, b konstanty, $b > 0$

$$\mu_{a+X} = E(a + X) = a + EX = a + \mu_X$$

$$\mu_{b \cdot X} = E(b \cdot X) = b \cdot EX = b \cdot \mu_X$$

$$\mu_{X+Y} = E(X + Y) = EX + EY = \mu_X + \mu_Y$$

► Návrat k průměru $\sigma_{a+X}^2 = \sigma_X^2, \quad \sigma_{a+X} = \sigma_X$

$$\sigma_{b \cdot X}^2 = b^2 \sigma_X^2, \quad \sigma_{b \cdot X} = |b| \sigma_X$$

$$\sigma_{X+Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\sigma_{X,Y}$$

► Návrat k rozptylu $\sigma_{X,Y} = E(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)$ **kovariance** X, Y

$$\begin{aligned}&= (x_1 - \mu_X)(y_1 - \mu_Y)P(X = x_1, Y = y_1) \\ &\quad + (x_1 - \mu_X)(y_2 - \mu_Y)P(X = x_1, Y = y_2) + \dots \\ &\quad (\text{sčítá se přes všechny možné dvojice})\end{aligned}$$

(populační) rozptyl náhodné veličiny X

- ▶ vážený průměr čtverců vzdáleností možných hodnot od střední hodnoty

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= E(X - \mu_X)^2 \\ &= (x_1 - \mu_X)^2 P(X = x_1) + (x_2 - \mu_X)^2 P(X = x_2) + \dots \\ &= \sum_j (x_j - \mu_X)^2 P(X = x_j)\end{aligned}$$

$$\sigma_X^2 = E(X - \mu_X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx$$

- ▶ (**populační**) **směrodatná odchylka** odmocnina z (populačního) rozptylu

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

nezávislé náhodné veličiny

- ▶ připomeňme: náhodné jevy A, B jsou nezávislé, když

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- ▶ náhodné veličiny X, Y jsou **nezávislé**, když pro **všechny dvojice** možných hodnot (x_i, y_j) platí

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

- ▶ X a Y jsou tedy nezávislé, jsou-li nezávislé jevy $A = \{\text{tvrzení o } X\}$ a $B = \{\text{tvrzení o } Y\}$

- ▶ jsou-li X, Y nezávislé, pak

$$\sigma_{X,Y} = 0, \quad \text{tedy} \quad \sigma_{X+Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$$

- ▶ pro **nezávislé** náhodné veličiny platí:
rozptyl součtu = součet rozptylů

(populační) korelační koeficient

- Pearsonův korelační koeficient

$$r_{x,y} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

- výběrová kovariance dána vztahem (str. 59)

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

- populační protějšek**

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

- ρ_{XY} má stejné vlastnosti jako r_{xy} , zejména platí $|\rho_{XY}| \leq 1$
- pro **nezávislé** náhodné veličiny X, Y je vždy $\rho_{XY} = 0$

alternativní rozdělení

- diskrétní, s jediným parametrem π (nikoliv Ludolfov číslo)
- $P(X = 1) = \pi, P(X = 0) = 1 - \pi \quad (0 < \pi < 1)$
- X – kolikrát v jednom pokusu došlo k události, která má pravděpodobnost π (jen dvě možné hodnoty: 0 nebo 1)
- střední hodnota** (populační průměr)

$$\mu_X = 1 \cdot P(X = 1) + 0 \cdot P(X = 0) = \pi$$

- (populační) rozptyl**

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= (1 - \mu_X)^2 P(X = 1) + (0 - \mu_X)^2 P(X = 0) \\ &= (1 - \pi)^2 \cdot \pi + (0 - \pi)^2 \cdot (1 - \pi) \\ &= (1 - \pi)^2 \pi + \pi^2 (1 - \pi) = \pi(1 - \pi)\end{aligned}$$

idealizovaný příklad: známky u zkoušky

sdružené a **marginální** pravděpodobnosti

X	Y				P(X = k)
	1	2	3	4	
1	0,15	0,10	0,05	0,00	0,3
2	0,10	0,15	0,10	0,05	0,4
3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,2
4	0,00	0,00	0,00	0,10	0,1
	0,3	0,3	0,2	0,2	1,0

$$\begin{aligned}\sigma_{X,Y} &= (1 - 2,1)(1 - 2,3) \cdot 0,15 + (1 - 2,1)(2 - 2,3) \cdot 0,10 + \dots \\ &\quad + (4 - 2,1)(3 - 2,3) \cdot 0,00 + (4 - 2,1)(4 - 2,3) \cdot 0,10 = 0,57\end{aligned}$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{0,57}{0,943 \cdot 1,1} = 0,55 \Rightarrow X \text{ a } Y \text{ jsou závislé}$$

binomické rozdělení $bi(n, \pi)$ (1)

- diskrétní rozdělení s parametry $n, \pi \quad (0 < \pi < 1)$
- n nezávislých** pokusů
- v každém zdar s pravděpodobností π , nezdar s pstí $1 - \pi$
- celk. počet zdarů** X má binomické rozdělení s parametry n, π
- zapisujeme $X \sim bi(n, \pi)$
- X je součet n nezávislých náhodných veličin X_i (X_i = počet zdarů v i -tému pokusu)
každé X_i má alternativní rozdělení s parametrem π
- z vlastnosti střední hodnoty součtu náh. veličin: $\mu_X = n\pi$
- z vlastnosti rozptylu součtu nezávislých náhodných veličin

$$\sigma_X^2 = n\pi(1 - \pi)$$

binomické rozdělení $bi(n, \pi)$ (2)

- ▶ pravděpodobnosti možných hodnot

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

- ▶ pst, že v **daných** k pokusech zdar Z , v ostatních nezdar N

$$\underbrace{ZZ \dots Z}_k \underbrace{NN \dots N}_{n-k} \text{ s pstí } \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$$

- ▶ zvolíme k míst pro zdar Z , na ostatních místech nezdar N , počet možností:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)\cdots2\cdot1}$$

příklad: kouření

- ▶ víme, že mezi dvacetiletými muži je (řekněme) 35 % kuřáků (např. je-li 70 tisíc dvacetiletých, pak je mezi nimi asi 24 500 kuřáků, ale nevíme, kteří to jsou)
- ▶ vybereme náhodně 60 dvacetiletých mužů, X – počet kuřáků mezi nimi, tedy $X \sim bi(60, 0,35)$
- ▶

$$\mu_X = 60 \cdot 0,35 = 21 \quad \sigma_X^2 = 60 \cdot 0,35 \cdot 0,65 = 13,65 = (3,7)^2$$

- ▶ ukázky pravděpodobností možných hodnot

[BINOMDIST(15;60;0,35;0)]

k	15	17	19	21	23	25
$P(X = k)$	0,029	0,062	0,095	0,107	0,091	0,059

příklad: zkoušky

- ▶ C – zdar = udělat zkoušku, $P(C) = 0,8$
- ▶ zkoušku dělá $n = 10$ studentů stejně připravených (u všech stejná pravděpodobnost π), studenti neopisují (nezávislost)
- ▶ pst, že zkoušku udělá nějakých 9 studentů

$$P(X = 9) = \binom{10}{9} \cdot 0,8^9 \cdot 0,2^1 = 10 \cdot 0,8^9 \cdot 0,2^1 = 0,268$$

- ▶ pst, že právě jeden student (nějaký) zkoušku neudělá

$$P(Y = 1) = \binom{10}{1} \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^9 = 10 \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^9 = 0,268$$

- ▶ pst, že zkoušku udělá **daných** 9 studentů: 0,0268

Poissonovo rozdělení $Po(\lambda)$ (1)

- ▶ diskrétní rozdělení (zákon vzácných jevů), $Y \sim Po(\lambda)$
- ▶ Y – počet výskytů jevu ve zvolené časové (prostorové, plošné ...) jednotce
- ▶ $\lambda > 0$ – jediný parametr, intenzita výskytu jevu (jak často se v průměru vyskytuje ve zvolené jednotce)

$$P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots$$

- ▶ střední hodnota, (populační) rozptyl

$$\mu_Y = \lambda, \quad \sigma_Y^2 = \lambda$$

- ▶ u binomického rozdělení bylo $\mu_X > \sigma_X^2$, zde rovnost

Poissonovo rozdělení $\text{Po}(\lambda)$ (2)

- ▶ parametr λ znamená hustotu na jednotku plochy (populační průměr počtu případů na jednotku)
- ▶ změníme-li jednotku plochy, změní se parametr: při počítání pravděpodobností toho, kolikrát najdeme případ na trojnásobku původní jednotky (trojnásobné ploše, ve trojnásobném čase . . .), bude novým parametrem 3λ
- ▶ analogicky pro jiné kladné násobky
- ▶ approximace: $X \sim \text{bi}(n, \pi)$, n velké, π malé ($\mu_X = n \cdot \pi$) pak pravděpodobnosti hodnot X lze approximovat (přibližně vyjádřit) pomocí pravděpodobností hodnot $Y \sim \text{Po}(n \cdot \pi)$
- ▶ Poissonovo rozdělení $\text{Po}(n \cdot \lambda)$ approximuje binomické $\text{bi}(n, \pi)$

příklady Poissonova rozdělení

- ▶ do pasti padá za noc v průměru 8 brouků ($\lambda = 8$)
- ▶ s jakou pravděpodobností jich tam ráno najdeme 10? $[\text{POISSON}(10;8;0)]$ $[\text{dpois}(10,8)]$

$$P(Y = 10) = \frac{8^{10}}{10!} e^{-8} = 0,099$$

- ▶ vezmeme-li past s polovičním obvodem, očekáváme poloviční průměr za noc ($\lambda = 4$)

$$P(Y = 10) = \frac{4^{10}}{10!} e^{-4} = 0,005$$

$$P(Y = 5) = \frac{4^5}{5!} e^{-4} = 0,156$$

souvislost binomického a Poissonova rozdělení


- ▶ s jakou pravděpodobností **neudělá** 12 z 50 stejně připravených studentů zkoušku? (pst neúspěchu = 0,2)
- ▶ binomické rozdělení $\text{bi}(50, 0,2)$ $[\text{BINOMDIST}(12;50;0,2)]$ $[\text{dbinom}(12,50,0.2)]$

$$P(X = 12) = \binom{50}{12} \cdot 0,2^{12} \cdot 0,8^{38} = 0,103$$

- ▶ Poissonovo rozdělení $\text{Po}(50 \cdot 0,2) = \text{Po}(10)$ $[\text{POISSON}(12;10;0)]$ $[\text{dpois}(12,10)]$


$$P(Y = 12) = \frac{10^{12}}{12!} e^{-10} = 0,095$$

normální (Gaussovo) rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$



- ▶ spojité rozdělení, symetrické okolo střední hodnoty μ
- ▶ maximální hodnota hustoty je úměrná $1/\sigma$ ($\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \doteq \frac{0,4}{\sigma}$)
- ▶ model vzniku: součet velkého počtu nepatrných příspěvků


normované normální rozdělení $Z \sim N(0, 1)$



normované normální rozdělení $Z \sim N(0, 1)$

tabelováno:

- ▶ hustota $\varphi(z)$
[NORMDIST($z; 0; 1$)] [dnorm(z)]
- ▶ distribuční funkce $\Phi(z) = P(Z \leq z)$
[NORMSDIST(z)] [pnorm(z)]
- ▶ **kritické hodnoty** $z(\alpha)$: $P(Z \leq z(\alpha)) = \Phi(z(\alpha)) = 1 - \alpha$
[NORMSINV(z)] [qnorm(z)]



příklady pravděpodobnosti o normálním rozdělení

- ▶ pro $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ platí

$$\mu_X = E(X) = \mu \quad \sigma_X^2 = E((X - \mu)^2) = \sigma^2$$

$$\boxed{\begin{aligned} X &\sim N(\mu, \sigma^2) & \Rightarrow & Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \end{aligned}}$$



$$P(|Z| < c) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < c\right) = P(|X - \mu| < c \cdot \sigma)$$

- ▶ tedy

$$P(|X - \mu| < 1,00 \sigma) = 0,68, \text{ tj. } 68\%$$

$$P(|X - \mu| < 1,96 \sigma) = 0,95, \text{ tj. } 95\%$$

$$P(|X - \mu| < 2,00 \sigma) = 0,9545, \text{ tj. } 95,45\%$$

$$P(|X - \mu| < 3,00 \sigma) = 0,9973, \text{ tj. } 99,73\%$$

zájimavé kritické hodnoty

- $z(0,025) = 1,96$ tj. $P(Z > 1,96) = 2,5\%$
- $z(0,025) = 1,96$ tj. $P(Z < -1,96) = 2,5\%$
- $z(0,025) = 1,96$ tj. $P(|Z| > 1,96) = 5\%$
- $z(0,005) = 2,58$ tj. $P(Z > 2,58) = 0,5\%$
- $z(0,005) = 2,58$ tj. $P(Z < -2,58) = 0,5\%$
- $z(0,005) = 2,58$ tj. $P(|Z| > 2,58) = 1\%$
- $z(0,050) = 1,64$ tj. $P(Z > 1,64) = 5\%$
- $z(0,050) = 1,64$ tj. $P(Z < -1,64) = 5\%$
- $z(0,050) = 1,64$ tj. $P(|Z| > 1,64) = 10\%$

výpočet pravděpodobnosti pro $Z \sim N(0, 1)$





- u spojitého rozdělení je $P(X < x) = P(X \leq x)$, tedy i u Z
- $Z \sim N(0, 1)$, $a < b$, pak $P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$
- odvození: jevy ($Z \leq a$) a ($a < Z \leq b$) jsou neslučitelné (tvrzení nemohou platit současně)
jejich sjednocením je jev ($Z \leq b$), proto

$$P(Z \leq b) = P(Z \leq a) + P(a < Z \leq b)$$

$$\Phi(b) = \Phi(a) + P(a < Z \leq b)$$

- příklad: $P(1 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(1) = 0,977 - 0,841 = 0,136$, jak bylo na obrázku
[NORMSDIST(2)-NORMSDIST(1)] [pnorm(2)-pnorm(1)]

Postup výpočtu $P(1 < Z < 2)$ ($Z \sim N(0, 1)$)
 pomocí tabelované funkce $\Phi(z) = F_Z(z) = P(Z \leq z)$



výpočet pro $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

příklad: $X \sim N(136,1, 6,4^2)$ (výšky 10letých hochů v roce 1951)

$$\begin{aligned} P(134,5 < X < 140,5) &= \Phi\left(\frac{140,5 - 136,1}{6,4}\right) - \Phi\left(\frac{134,5 - 136,1}{6,4}\right) \\ &= 0,754 - 0,401 = 0,353 \end{aligned}$$

tedy v rozmezí 135 cm až 140 cm bylo asi 35,3 % hochů

pohodlnější možnost

- $X \sim N(136,1, 6,4^2)$
- počítáme $P(134,5 < X < 140,5)$
- Excel i R nabízí možnost dosadit skutečné parametry normálního rozdělení
- druhým parametrem je **směrodatná odchylka**
- Excel (nepřehlédněte, že nejde o NORMSDIST!):
[NORMDIST(140,5;136,1;6,4;1)-NORMDIST(134,5;136,1;6,4;1)]
- R:
[pnorm(140,5,136,1,6,4)-pnorm(134,5,136,1,6,4)]

populace a výběr

- ▶ populaci charakterizujeme pomocí parametrů rozdělení, případně typu rozdělení
- ▶ výsledek měření na náhodně vybraném prvku populace – náhodná veličina
- ▶ skutečné hodnoty parametrů neznáme
 - ▶ chceme je odhadnout
 - ▶ chceme rozhodnout o platnosti tvrzení (hypotézy) o parametrech
- ▶ jako výběr si představujeme několik **nezávislých** náhodných veličin se stejným rozdělením a neznámými parametry
 - ▶ parametry odhadujeme na základě výběru
 - ▶ o hypotézách rozhodujeme na základě výběru
- ▶ příklady
 - ▶ střední hodnotu náhodné veličiny (populační průměr) odhadujeme pomocí výběrového průměru
 - ▶ rozptyl náhodné veličiny odhadujeme pomocí výběrového rozptylu

chování výběrového průměru

- ▶ nechť X_1, X_2, \dots, X_n jsou nezávislé náhodné veličiny s **libovolným stejným rozdělením** se střední hodnotou μ a rozptylem σ^2 , tj. **náhodný výběr** z onoho rozdělení
- ▶ **průměr** X_1, X_2, \dots, X_n :
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$
- ▶ připomeňme vlastnosti střední hodnoty [► Vlastnosti](#)

$$\mu_{X+Y} = \mu_X + \mu_Y, \quad \mu_{b \cdot X} = b \cdot \mu_X$$

- ▶ proto je

$$\mu_{\bar{X}} = \mu_{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{n} \cdot \mu_{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_{X_i} = \frac{1}{n} n \mu = \mu$$

- ▶ $\mu_{\bar{X}} = \mu$, tj. \bar{X} je **nestranný odhad** parametru μ

variabilita výběrového průměru

- ▶ pro rozptyl **nezávislých** náhodných veličin platí [► Vlastnosti](#)

$$\sigma_{X+Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \quad \sigma_{b \cdot X}^2 = b^2 \sigma_X^2$$

- ▶ proto je

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma_{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}^2 = \frac{1}{n^2} n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$


- ▶ průměr \bar{X} má tedy rozptyl n -krát menší, než jednotlivá pozorování

- ▶ **střední chyba** průměru = směrodatná odchylka průměru

$$S.E.(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

příklad: věk matek

Histogram of x




příklad: věk matek


- výjimečný umělý příklad, kdy známe celou populaci
- populace obsahuje 10 916 hodnot
- rozdělení věku je výrazně nesymetrické
- prováděn výběr rozsahu n , vždy spočítán průměr
- N krát opakovaně provedeno (spočítáno $N = 1000$ průměrů)
- spočítány charakteristiky z N průměrů jako výchozích hodnot, (modře charakteristiky celé populace nebo hodnoty odvozené)

n	průměr	sm. odch.	σ/\sqrt{n}	šikmost	špičatost
1	25.43	4.62	4.94	0.74	0.29
10	25.35	1.54	1.56	0.28	-0.04
100	25.39	0.48	0.49	0.08	-0.05
(populace)	$\mu = 25.40$	$\sigma = 4.94$	4.94	0.77	0.19

příklad: histogram populace a histogramy výběru šířky intervalů stejné



příklad: histogram populace a histogramy výběru šířky intervalů přizpůsobené variabilitě



příklad: shrnutí

- průměry kolísají kolem populačního průměru μ
- směrodatné odchylky klesají s rostoucím \sqrt{n}
- šikmost a špičatost se s rostoucím n blíží k nule
- je naděje, že s rostoucím n je histogram podobnější hustotě normálního rozdělení – projev *centrální limitní věty*

centrální limitní věta

- vlastnost součtu nezávislých náhodných veličin se stejným rozdělením (populační průměr μ , popul. rozptyl σ^2)
- průměr je součet dělený počtem sčítanců
⇒ pro průměr platí CLV také
- standardizovaný součet (průměr) n nezávislých náhodných veličin lze pro velké n approximovat normálním rozdělením $N(0, 1)$


$$Z = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \mu}{\sigma \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

► CLV pro četnosti

- pro velká n se výběrový průměr chová, jako by šlo o výběr z normálního rozdělení, a to bez ohledu na výchozí rozdělení

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

100 intervalů spolehlivosti ($n = 100$, $1 - \alpha = 95\%$) (v 7 případech interval neobsahuje μ)



interval spolehlivosti pro populační průměr μ

- pro nezávislé náhodné veličiny $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ platí
- $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$
- proto je $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
- použijeme kritickou hodnotu

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z(\alpha/2)\right) = 1 - \alpha$$

- hodnota parametru μ je tedy s pravděpodobností $1 - \alpha$ pokryta intervalom

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z(\alpha/2); \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z(\alpha/2)\right)$$

- lze použít pro velká n i bez požadavku na normální rozdělení

příklad: IQ vysokoškoláků

- u $n = 16$ náhodně vybraných studentů jisté fakulty byla zjištěna hodnota IQ
- metoda měření IQ je konstruována tak, že je $\sigma = 15$
- vyšel průměr $\bar{x} = 110$
- co lze říci o populačním průměru všech studentů oné velké fakulty?
- 95% interval spolehlivosti ($z(0,025) = 1,96$):

$$(110 - \frac{15}{4} \cdot 1,96; 110 + \frac{15}{4} \cdot 1,96) = (102,65; 117,35)$$

- skutečný populační průměr μ (všech studentů oné fakulty) leží s 95% pravděpodobností mezi 102,65 a 117,35
- μ leží s 90% pravděpodobností mezi 103,83 a 116,17

vlastnosti intervalu spolehlivosti pro μ

- ▶ délka intervalu roste s požadovanou spolehlivostí
 - ▶ 90% interval (103,83; 116,17) má délku 12,34
 - ▶ 95% interval (102,65; 117,35) má délku 14,70
- ▶ délka intervalu klesá s rostoucím počtem pozorování n
 - ▶ pro $n = 16$ má 95% interval (102,65; 117,35) délku 14,70
 - ▶ pro $n = 16 \cdot 4 = 64$ má 95% interval (106,325; 113,675) délku 7,35, tedy poloviční
- ▶ kolik potřebujeme pozorování, aby měl 95% interval délku 2δ ?

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z(\alpha/2) = \delta \quad \Rightarrow \quad n = \left(\frac{\sigma}{\delta} z(\alpha/2) \right)^2$$

- ▶ v příkladu s IQ požadujeme $\delta = 1$:

$$n = \left(\frac{15}{1} 1,96 \right)^2 \doteq 864$$

příklad: výška postavy

- ▶ studenti odhadovali výšku přednášejícího; předpokládejme, že nestranně a nezávisle na sobě
- ▶ $n = 22$, $\bar{x} = 172,4$, $s_x = 4,032$
- ▶ z tabulek: $t_{21}(0,05) = 2,080$

$$(172,4 - \frac{4,032}{\sqrt{22}} \cdot 2,080; 172,4 + \frac{4,032}{\sqrt{22}} \cdot 2,080) \\ (170,6; 174,2)$$

- ▶ skutečná výška je s pravděpodobností 95 % někde mezi 170,7 cm a 174,2 cm
- ▶ $z(0,025) = 1,96$

interval spolehlivosti pro μ (neznámé σ)

- ▶ neznáme-li σ , nahradíme je pomocí (výběrová směr. odchylka)

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

- ▶ interval spolehlivosti pro μ :

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha); \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha) \right)$$

- ▶ použití kritické hodnoty $t_{n-1}(\alpha)$ Studentova t -rozdělení místo kritické hodnoty $z(\alpha/2)$ je penalizací za to, že neznámou směrodatnou odchylku σ jsme nahradili jejím odhadem S
- ▶ platí totiž $t_{n-1}(\alpha) > z(\alpha/2)$, s rostoucím n se rozdíl zmenšuje

centrální limitní věta pro četnosti

- ▶ co říkala CLV? [CLV](#)
- ▶ absolutní četnost Y
 - ▶ Y – součet nezávislých veličin s alternativním rozdělením
 - ▶ populační průměr X_i je π
 - ▶ populační rozptyl X_i je $\pi(1-\pi)$
 - ▶ $Y = \sum_{i=1}^n X_i$
 - ▶ $Y \sim \text{bi}(n, \pi)$, proto přibližně $Y \sim N(n\pi, n\pi(1-\pi))$
- ▶ relativní četnost $f = Y/n$
 - ▶ f – průměr nezávislých veličin s alternativním rozdělením
 - ▶ $f \sim N(\pi, \pi(1-\pi)/n)$

příklad: počet studentek

- za zkušenosti je známo, že mezi uchazeči o studium bývá 45 % dívek
- s jakou pravděpodobností bude při 500 přihláškách počet dívek mezi 200 a 220 (včetně)?
- $Y \sim bi(500, 0,45)$ má $\mu_Y = 500 \cdot 0,45 = 225$, $\sigma_Y^2 = 500 \cdot 0,45 \cdot 0,55 = 123,75$, tedy $\sigma_Y = 11,1$

$$P(200 \leq Y \leq 220) = \Phi\left(\frac{220,5 - 225}{11,1}\right) - \Phi\left(\frac{199,5 - 225}{11,1}\right)$$

- hledaná pravděpodobnost je přibližně 33,2 % (přesně 33,3 %)
- [NORMDIST(220,5;225;11,1243;1)]
-NORMDIST(199,5;225;11,1243;1)]
[pnorm(220,5,500*0,45,sqrt(500*0,45*0,55))]
-pnorm(199,5,500*0,45,sqrt(500*0,45*0,55))]
[BINOMDIST(220;500;0,45;1)-BINOMDIST(199;500;0,45;1)]
[pbinom(220,500,0,45)-pbinom(199,500,0,45)]

příklad: hody s hrací kostkou

- odhadujeme pravděpodobnost šestky
- kostka A: $n = 100$, $n_A = 17$, $f_A = 0,17$

$$\left(0,17 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,17 \cdot 0,83}{100}}; 0,17 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,17 \cdot 0,83}{100}}\right)$$

(0,10; 0,24)

- kostka B: $n = 100$, $n_B = 41$, $f_B = 0,41$

$$\left(0,41 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,41 \cdot 0,59}{100}}; 0,41 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,41 \cdot 0,59}{100}}\right)$$

(0,31; 0,51)

- důležitý rozdíl: u kostky A patří $1/6 = 0,167$ do intervalu spolehlivosti; u kostky B nikoliv; může to něco znamenat?

interval spolehlivosti pro podíl (pravděpodobnost) π

- π – podíl prvků populace s danou vlastností
- π – π , s jakou takový prvek vylosujeme
- počet prvků náhodně vybraných s onou vlastností $Y \sim bi(n, \pi)$
- střední chyba relativní četnosti $Y/n = f$
= směrodatná odchylka relativní četnosti f
= odmocnina z rozptylu relativní četnosti f je tedy $\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$
- pravděpodobnost π neznáme, odhadneme ji pomocí f
- odtud je přibližný 95% interval spolehlivosti pro π

$$\left(f - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}, f + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$$

- skutečná π je tedy s 95% pravděpodobností v uvedeném rozmezí
- existuje přesnější (pracnější) postup

proč testování hypotéz

- připomeňme 95% intervaly spolehlivosti pro šestku u kostek:
 - kostka A: (0,10; 0,24)
 - kostka B: (0,31; 0,51)
- znamená něco, když $1/6 = 0,167$ leží či neleží v 95% intervalu spolehlivosti?
- nelze bezpečně poznat, že kostka A není falešná nebo že kostka B je falešná
- intervaly spolehlivosti určily rozmezí, kde by skutečná pravděpodobnost šestky měla být, jejich spolehlivost je velká, ale omezená
- musíme připustit, že jsme mohli mít smůlu, že se v našich pokusech náhodou realizovaly málo pravděpodobné možnosti, přestože k takové smůle dochází jen zřídka
- potřebujeme **standardizovaná pravidla**, jak rozhodovat

hypotézy a možná rozhodnutí

► možné statistické **hypotézy**

- ▶ **(nulová) hypotéza H_0 :** – zjednoduší situaci, zpravidla se jí snažíme vyvrátit, abychom věcně něco prokázali:
porovnávané populace se **nelíší**, vyšetřované znaky jsou **nezávislé** ...
tedy žádný (tj. **nulový**) rozdíl, žádná (tj. **nulová**) závislost
- ▶ **alternativa H_1 : (alternativní hypotéza)** – opak nulové hypotézy, zpravidla to, co chceme věcně dokázat

► možná **rozhodnutí**

- ▶ **zamítnout H_0** pokud naše data svědčí proti H_0
- ▶ **nezamítnout H_0** (přijmout H_0) pokud *není dost důvodů* H_0 zamítnout

► hypotéza – tvrzení o **populaci**

- ▶ rozhodujeme na základě dat z **výběru**
- ▶ nelze zaručit bezchybnost rozhodnutí

schéma rozhodování

rozhodnutí	H_0 platí	H_0 neplatí
H_0 zamítnout	chyba 1. druhu ($pst \leq \alpha$) hladina testu	správné rozhodnutí ($pst 1 - \beta$) síla testu
H_0 nezamítnout (přijmout)	správné rozhodnutí ($pst \geq 1 - \alpha$)	chyba 2. druhu ($pst \beta$)

- ▶ volíme řádek
- ▶ nevíme, který sloupec platí

chyby v rozhodování

► nelze zaručit bezchybnost rozhodnutí, mohou nastat chyby:

- ▶ **chyba 1. druhu**, když zamítne platnou hypotézu H_0
- ▶ **chyba 2. druhu**, když nepoznáme, že hypotéza H_0 neplatí a nezamítne ji (přijmeme ji)
- ▶ nechceme příliš často *chybně* zamítat H_0
(tedy falešně něco věcně prokazovat)
- ▶ proto se snažíme chybě 1. druhu pokud možno vyvarovat, nelze ji vyloučit
- ▶ **hladina testu α** = maximální přípustná pravděpodobnost chyby 1. druhu (zpravidla $\alpha = 0,05$, tj. $\alpha = 5\%$)
- ▶ **síla testu** = pravděpodobnost správného zamítnutí neplatné hypotézy

klasický postup při rozhodování

► zvolit (nulovou) hypotézu H_0 , alternativu H_1

- ▶ zvolit hladinu testu α
- ▶ zvolit metodu rozhodování (který test použít)
- ▶ z dat spočítat testovou statistiku T a porovnat ji s tabelovanou kritickou hodnotou
(bude ještě: porovnat p -hodnotu s hladinou α)
- ▶ **kritický obor** – množina těch výsledků pokusu (např. hodnot T), kdy budeme hypotézu zamítat
- ▶ když padne statistika T do **kritického oboru**, pak hypotézu zamítnout (zpravidla, když $T \geq t_0$, t_0 – kritická hodnota)

příklad: padá na kostce šestka příliš často?

- ▶ chceme na 5% hladině prokázat, že pravděpodobnost šestky na dané kostce je větší, než by měla být (tj. větší než 1/6)
- ▶ $H_0 : P(\text{padne šestka}) = 1/6 \quad (\pi = \pi_0)$
- ▶ $H_1 : P(\text{padne šestka}) > 1/6 \quad (\pi > \pi_0)$
- ▶ provedeme $n = 100$ pokusů, Y je počet šestek
- ▶ co svědčí pro neplatnost hypotézy? Je to situace, kdy „šestka padá mnohem častěji, než by měla padat za H_0 “
- ▶ **tvar kritického oboru:** hypotézu zamítat, když $Y \geq y_0$
- ▶ za platnosti H_0 má počet šestek Y rozdelení $\text{bi}(n, 1/6)$
- ▶ **velikost kritického oboru:** y_0 zvolíme tak, abychom hypotézu za její platnosti zamítali s pravděpodobností nejvýše α , tj.

$$P_0(Y \geq y_0) \leq \alpha$$

příklad: síla testu

- ▶ **síla testu** = pst, že hypotézu zamítneme, když ona neplatí
- ▶ při 100 hodech hypotézu na 5% hladině zamítáme, je-li $Y \geq 24$
- ▶ nechtějte je ve skutečnosti $\pi = 1/4$, pak hypotézu zamítneme (výsledek pokusu padne do kritického oboru) s pstí

$$P(Y \geq 24) = \sum_{k=24}^{100} \binom{100}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{100-k} = 0,629$$

- ▶ pro $\pi = 0,25$ je tedy síla testu 62,9 %
- ▶ pro $\pi = 0,3$ je podobně síla testu rovna 92,4 %
- ▶ pro $\pi = 0,2$ je podobně síla testu rovna 18,9 %

příklad: jak zvolit kritickou hodotu y_0 ?

- ▶ některé pravděpodobnosti pro $Y \sim \text{bi}(100, 1/6)$

y_0	20	21	22	23	24	25
$P(Y \geq y_0)$	0,220	0,152	0,100	0,063	0,038	0,022

- ▶ podmínu $P(Y \geq y_0) \leq 0,05$ splňuje $y_0 = 24$
- ▶ padne-li ve 100 nezávislých hodech kostkou aspoň 24 šestek, budeme na **5% hladině zamítat hypotézu**, že pst šestky je $1/6$ ve prospěch alternativy, že pst šestky je větší než $1/6$ (dáno zvolenou alternativou)
- ▶ na kostce A nám padlo 17 šestek, hypotézu **nezamítáme**, to ale neznamená, že bychom hypotézu prokázali
- ▶ na kostce B nám padlo 41 šestek, hypotézu **zamítáme**
- ▶ pro $\alpha = 10\%$ bychom zvolili $y_0 = 22$, bylo by však větší riziko zamítnutí platné hypotézy

rozhodování pomocí p-hodnoty

- ▶ **p-hodnota** p je nejmenší α , při kterém H_0 z daných dat ještě zamítáme
- ▶ p -hodnota p je za platnosti H_0 spočítaná *pravděpodobnost* výsledků stejně nebo *méně příznivých* pro H_0
- ▶ H_0 zamítáme právě tehdy, když je $p \leq \alpha$
- ▶ p -hodnotu počítají moderní počítačové programy
- ▶ existují úlohy, kdy se rozhoduje pouze podle p -hodnoty (např. Fisherův exaktní test ve čtyřpolní tabulce)
- ▶ statistické rozhodování:
spočítat k T odpovídající p -hodnotu a porovnat ji s α

příklad: rozhodování pomocí p-hodnoty

- ▶ snažíme se prokázat, že šestka padá příliš často ($H_1 : \pi > 1/6$)
- ▶ kritický obor: $Y \geq y_0 = 24$
- ▶ padlo nám $Y = 17$, proto (pstí binomického rozdělení)

$$p = P(Y \geq 17) = \sum_{k=17}^{100} \binom{100}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{100-k} = 0,506$$

$$= 1 - P(Y \leq 16) \quad [1-\text{BINOMDIST}(16;100;1/6;1)]$$

- ▶ protože $50,6\% > 5\%$, hypotézu nemůžeme na 5% hladině zamítnout, nemůžeme tvrdit, že pst šestky je větší než $1/6$
- ▶ neprokázali jsme však, že by hypotéza platila
- ▶ na kostce B: $p = P(Y \geq 41) = 1 - P(Y \leq 40) = 7,4 \cdot 10^{-9}$
[1-pbinom(40,100,1/6)]

příklad: kostka, oboustranná alternativa

y_0	8	9	10	...	24	25	26
$P(Y \leq y_0)$	0,010	0,021	0,043	...	0,978	0,988	0,994
$P(Y \geq y_0)$	0,996	0,990	0,979	...	0,038	0,022	0,012
$P(Y = y_0)$	0,006	0,012	0,021	...	0,016	0,010	0,006

- ▶ $\alpha/2 = 0,025$ ($\alpha/2 = 0,05$)
- ▶ H_0 zamítneme, když bude $Y \leq 9$ nebo když bude $Y \geq 25$
- ▶ skutečná pst chyby 1. druhu bude $0,021 + 0,022 = 0,043$
- ▶ $[pbinom(9,100,1/6)+(1-pbinom(24,100,1/6))]$
[BINOMDIST(9;100;1/6;1)
+ 1-BINOMDIST(24;100;1/6;1)]
- ▶ hodnoty v rozmezí 10 až 24 (včetně mezí) nesvědčí proti H_0

příklad: kostka a oboustranná alternativa

- ▶ chceme ověřit, zda je kostka v pořádku
- ▶ pokusíme se prokázat, že šestka padla příliš často nebo příliš zřídka (**oboustranná alternativa**)
- ▶ $H_0 : P(\text{padne šestka}) = 1/6 \quad (\pi = \pi_0)$
- ▶ $H_1 : P(\text{padne šestka}) \neq 1/6 \quad (\pi \neq \pi_0)$
- ▶ proti hypotéze svědčí malé nebo velké hodnoty Y
- ▶ pst chyby 1. druhu α rozdělíme na dvě poloviny: $\alpha/2$ pro příliš malé Y , $\alpha/2$ příliš velké Y

oboustranná alternativa (přibližně)

- ▶ $H_0 : \pi = \pi_0$, např. $P(\text{padne šestka}) = 1/6$
- ▶ $H_1 : \pi \neq \pi_0$, např. $P(\text{padne šestka}) \neq 1/6$
- ▶ proti alternativě svědčí Y hodně daleko od $\mu_Y = n\pi_0$ (počítáme za platnosti hypotézy), tj. rel. četnost $f = Y/n$ daleko od π_0
- ▶ zavedeme

$$Z = \frac{Y - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1 - \pi_0)}} = \frac{f - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)}} \sqrt{n}$$

- ▶ hypotézu zamítneme, bude-li Z daleko od nuly: $|Z| \geq z(\alpha/2)$
- ▶ pro $\alpha = 5\%$ zamítáme hypotézu, je-li $|Z| \geq 1,96$
- ▶ $z_A = 0,089$ (nezamítneme), $y_B = 6,529$ (zamítneme)

změnila se za deset roků výška desetiletých hochů?

- ▶ v roce 1951 byla průměrná výška desetiletých hochů 136,1 cm (zjištěno z velkého výběru o tisících měření)
- ▶ v roce 1961 bylo změřeno 15 náhodně vybraných desetiletých hochů: 127 130 133 136 136 136 138 139 139 139 140 141 142 147 149 151
- ▶ $\bar{X} = 139,13$ cm, $n = 15$
- ▶ znamená to, že za těch deset roků jsou desetiletí opravdu vyšší?
- ▶ stačí k důkazu, že 10 hochů je větších než 136,1 cm a jen 5 menších než 136,1 cm?
- ▶ stačí k důkazu, že nový průměr je o 3 cm vyšší?

test o střední hodnotě μ normálního rozdělení

- ▶ předpokládáme $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, nezávislé
- ▶ $\sigma > 0$ odhadneme pomocí $s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$
- ▶ rozptyl \bar{X} odhadneme pomocí $s_{\bar{X}}^2/n$, střední chyba \bar{X} (odmocnina z rozptylu) je tedy $S.E.(\bar{X}) = s_{\bar{X}}/\sqrt{n}$
- ▶ $H_0 : \mu = \mu_0$ (μ_0 známá konstanta)

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S.E.(\bar{X})} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s_{\bar{X}}} \sqrt{n}$$

statistika T má za H_0 Studentovo t -rozdělení s $n - 1$ st. vol.

- ▶ kdy hypotézu H_0 zamítáme (kritický obor):

- ▶ $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (oboustranná alternativa) $|T| \geq t_{n-1}(\alpha)$
- ▶ $H_1 : \mu > \mu_0$ (jednostranná alternativa) $T \geq t_{n-1}(2\alpha)$
- ▶ $H_1 : \mu < \mu_0$ (jednostranná alternativa) $T \leq -t_{n-1}(2\alpha)$

souvislost s intervalem spolehlivosti

- ▶ připomeňme interval spolehlivosti pro μ

$$\bar{X} - S.E.(\bar{X}) \cdot t_{n-1}(\alpha) < \mu < \bar{X} + S.E.(\bar{X}) \cdot t_{n-1}(\alpha)$$

$$\bar{X} - \frac{s_x}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha) < \mu < \bar{X} + \frac{s_x}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha)$$

- ▶ lze přepsat jako

$$|T| = \left| \frac{\bar{X} - \mu}{s_x} \sqrt{n} \right| < t_{n-1}(\alpha)$$

- ▶ $H_0 : \mu = \mu_0$ tedy **nezamítne** na hladině α při oboustranné alternativě, právě když μ_0 leží v $100(1 - \alpha)\%$ intervalu spolehlivosti
- ▶ **interval spolehlivosti obsahuje takové hodnoty μ_0 ,** které **bychom jako hypotézu nezamítli**

příklad: výšky desetiletých hochů (σ^2 neznámé)

- ▶ kritický obor: \bar{X} se příliš liší od μ_0 ve směru zvolené alternativy
- ▶ spočítáme $[t.test(hosi,mu=136.1,alternative="greater")]$

$$T = \frac{139,13 - 136,1}{6,56} \sqrt{15} = 1,79$$

- ▶ na 5% hladině při jednostranné alternativě $\mu > \mu_0$ hypotézu zamítáme, neboť $t_{14}(0,10) = 1,76$ ($p = 4,7\%$)
- ▶ na 5% hladině jsme **prokázali**, že výška desetiletých vzrostla
- ▶ na 5% hladině při oboustranné alternativě hypotézu nezamítáme, neboť $t_{14}(0,05) = 2,14$ ($p = 9,5\%$)
- ▶ 95% int. spolehlivosti pro populační průměr výšek hochů: (135,5; 142,8)


použití Excelu

přednáška	Excel	hoši
průměr	Stř. hodnota	139,13
střední chyba	Chyba stř. hodnoty	1,693
medián	Medián	139
modus	Modus	139
s	Směr. odchylka	6,56
s^2	Rozptyl výběru	42,98
špičatost	Špičatost	0,006
šikmost	Šikmost	0,090
rozpětí	Rozdíl max-min	24
minimum	Minimum	127
maximum	Maximum	151
součet	Součet	2087
rozsah výběru n	Počet	15
pol. šířka int. spol.	Hladina spol.	3,63


- ▶ $139,13 - 3,63 = 135,50$
- ▶ $139,13 + 3,63 = 142,76$
- ▶ 95% interval spolehlivosti: $(135,5; 142,8)$
- ▶ $\mu_0 = 136,1$ je v int. spolehlivosti
- ▶ při oboustranné alternativě jsme nezamítli H_0

porovnání dvou populací (dvouvýběrový t-test)

- ▶ příklad: liší se desetileté dívky výškou postavy od desetiletých hochů?
- ▶ výšky hochů známe, $\bar{X} = 139,13$ cm, $s_x = 6,56$, $n_x = 15$
- ▶ výšky dívek: 131, 132, 135, 141, 141, 141, 141, 142, 143, 146, 146, 151
- ▶ $\bar{Y} = 140,83$, $s_y = 5,84$, $n_y = 12$



kritický obor pro \bar{X}



- ▶ při jednostr. alternativě $\mu > \mu_0$ je 5% kritický obor označen oběma barvami na pravé straně

dvouvýběrový t-test

- ▶ lze předpokládat, že výšky náhodně vybraných hochů mají normální rozdělení $X_i \sim N(\mu_x, \sigma^2)$, nezávislé, $i = 1, \dots, n_x$
- ▶ lze předpokládat, že výšky náhodně vybraných dívek mají normální rozdělení $Y_i \sim N(\mu_y, \sigma^2)$, nezávislé, $i = 1, \dots, n_y$
- ▶ předpoklad stejných rozptylů bývá splněn, lze jej ověřit
- ▶ musí jít o **nezávislé** náhodné výběry, nelze např. vybírat sourozenecné dvojice nebo opakovaně měřit stejnou osobu

porovnání středních hodnot nezávislých výběrů

- ▶ $H_0 : \mu_x = \mu_y$ (není rozdíl, **nulová hypotéza**)
zřejmě totéž jako $\mu_x - \mu_y = 0$ (nulový rozdíl stř. hodnot)
(hoši a dívky se v deseti letech co do výšky neliší)
- ▶ možné alternativy
 - ▶ $H_1 : \mu_x \neq \mu_y$ (není-li důvod k jednostranné alternativě)
 - ▶ $H_1 : \mu_x > \mu_y$ (bylo cílem dokázat, že hoši jsou větší než dívky)
 - ▶ $H_1 : \mu_x < \mu_y$ (bylo cílem dokázat, že hoši jsou menší než dívky)
- ▶ rozhodování založeno na porovnání průměrů \bar{X} a \bar{Y} ; čím více se liší „správným směrem“, tím spíše zamítнout hypotézu
- ▶ je třeba porovnat s mírou přesnosti, s jakou rozdíl průměrů $\bar{X} - \bar{Y}$ odhadne skutečný rozdíl populačních průměrů $\mu_x - \mu_y$

odhad σ^2

- ▶ k tomu je třeba odhadnout také neznámé σ^2 pomocí

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{n_x + n_y - 2} \left(\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right) \\ &= \frac{n_x - 1}{n_x + n_y - 2} s_x^2 + \frac{n_y - 1}{n_x + n_y - 2} s_y^2\end{aligned}$$

(vážený průměr odhadů rozptylu v obou výběrech)

- ▶ výška desetiletých dětí: $n_x = 15$, $n_y = 12$, $\bar{X} = 139,13$, $\bar{Y} = 140,83$, $s_x^2 = 42,98$, $s_y^2 = 33,79$, tudíž

$$s^2 = \frac{14}{25} \cdot 42,98 + \frac{11}{25} \cdot 33,79 = 38,94 = 6,24^2$$

kritický obor

- ▶ o hypotéze $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ se rozhoduje pomocí

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\widehat{S.E.}(\bar{X} - \bar{Y})} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

- ▶ $H_1 : \mu_x \neq \mu_y$ zamítáme pokud $|T| \geq t_{n_1+n_2-2}(\alpha)$
- ▶ $H_1 : \mu_x > \mu_y$ zamítáme pokud $T \geq t_{n_1+n_2-2}(2\alpha)$
- ▶ $H_1 : \mu_x < \mu_y$ zamítáme pokud $T \leq -t_{n_1+n_2-2}(2\alpha)$
- ▶ výšky desetiletých: $T = -0,70 \Rightarrow | -0,70 | < 2,06 = t_{15+12-2}(0,05)$
- ▶ na 5% hladině jsme **neprokázali** rozdíl mezi výškami desetiletých hochů a dívek ($p = 48,8\%$)
 - [t.test(vyska~Divka,var.equal=TRUE)]
 - [TTEST(A14:A28;A2:A13;2;2)]

souvislost s intervalem spolehlivosti

- ▶ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ o kolik se liší populační průměrné výšky
- ▶ odhadem pro δ je $d = \bar{X} - \bar{Y} = -1,7$
- ▶ krajní body intervalu spolehlivosti pro rozdíl δ jsou

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \mp \widehat{S.E.}(\bar{X} - \bar{Y}) \cdot t_{n_1+n_2-2}(\alpha)$$

H_0 zamítáme právě tehdy, když nula **není** v int. spol. pro δ

- ▶ při porovnání výšek hochů a dívek je 95% interval pro δ

$$\left(-1,7 - 6,24 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{12}} \cdot 2,06; -1,7 + 6,24 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{12}} \cdot 2,06 \right) \\ (-6,7; 3,3)$$

shrnutí

- ▶ důležité předpoklady
 - ▶ nezávislé výběry
 - ▶ stejné (populační) rozptyly (lze testovat)
 - ▶ normální rozdělení (lze testovat)
- ▶ existuje varianta bez předpokladu stejných rozptylů
- ▶ pro velká n_x, n_y na normalitě tolík nezáleží (CLV)
- ▶ je-li problém s normalitou, lze použít jiný test (Mann-Whittney)

provedení v MS Excelu (stejné rozptyly)

přednáška	Excel	Soubor 1	Soubor 2
průměr	Stř. hodnota	139.133	140.833
rozptyl	Rozptyl	42.981	33.788
rozsah výběru	Pozorování	15	12
spol. odhad rozpt.	Společný rozptyl	38.936	
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 =$	Hyp. rozdíl stř. hodnot	0	
stupně vol.	Rozdíl	25	
T	t stat	-0.733	
p jednostr. testu	$P(T \leq t)$ (1)	0.244	jen někdy!
$t_{n_1+n_2-2}(2\alpha)$	t krit (1)	1.708	
p oboustr. testu	$P(T \leq t)$ (2)	0.488	
$t_{n_1+n_2-2}(\alpha)$	t krit (2)	2.060	

při oboustranné alternativě nelze nulovou hypotézu zamítnout

problém nestejných rozptylů

- ▶ předpoklad o stejném rozptylu v obou souborech nemusí být ve skutečnosti splněn, lze jej ověřit porovnáním odhadů rozptylu F -testem $F = \frac{s_x^2}{s_y^2}$
- ▶ hypotéza $H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ se proti $H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$ zamítá, když je buď $F = \frac{s_x^2}{s_y^2} \geq F_{n_1-1, n_2-1}(\alpha/2)$ nebo $\frac{1}{F} = \frac{s_y^2}{s_x^2} \geq F_{n_2-1, n_1-1}(\alpha/2)$
- ▶ vlastně se větší odhad rozptylu dělí menším odhadem, k tomu se musí zvolit správné pořadí stupňů volnosti a hladina
- ▶ příklad výšky desetiletých dětí:
 $F = \frac{42,98}{38,94} = 1,27 < F_{14,11}(0,025) = 3,36$
- ▶ [var.test(vyska~Divka)]

MS Excel: Dvouvýběrový F-test pro rozptyl

přednáška	Excel	Soubor 1	Soubor 2
průměr	Stř. hodnota	139.13	140.83
rozptyl	Rozptyl	42.98	33.79
rozsah	Pozorování	15	12
stupně vol.	Rozdíl	14	11
F	F	1.27	
p	$P(F \leq f)$ (1)	0.349	
	F krit (1)	2.739	

pozor Excel pracuje **špatně**: uvádí kritickou hodnotu a p -hodnotu pro jednostrannou alternativu odvozenou z hodnoty statistiky F ; při oboustranné alternativě je třeba p -hodnotu vynásobit dvěma ve skutečnosti je $P(F > 1,27) = 0,349$, takže $p = 2 \cdot 0,349 = 0,698$ pro oboustrannou alternativu mělo být použito $F_{14,11}(0,025) = 3,359$

provedení v MS Excelu (nestejné rozptyly)

		Soubor 1	Soubor 2
průměr	Stř. hodnota	139.133	140.833
rozptyl	Rozptyl	42.981	33.788
rozsah	Pozorování	15	12
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 =$	Hyp. rozdíl stř. hodnot	0	
stupně vol. f	Rozdíl	25	
T	t stat	-0.713	
p jednostr. testu	P(T<=t) (1)	0.241	
$t_f(2\alpha)$	t krit (1)	1.708	
p oboustr. testu	P(T<=t) (2)	0.482	
$t_f(\alpha)$	t krit (2)	2.060	

při oboustranné alternativě nelze nulovou hypotézu zamítnout

párové testy

- ▶ není-li předpoklad **nezávislosti** porovnávaných výběrů splněn, dá dvouvýběrový t-test nesprávný výsledek
- ▶ typické porušení předpokladu nezávislosti je u párových dat
 - ▶ měření na stejných objektech ve dvou různých časech
 - ▶ měření na stejných objektech před zásahem a po něm (ošetření)
 - ▶ měření na rodičích
- ▶ postup
 - ▶ spočítají se a hodnotí rozdíly (změny)
 - ▶ přejde se k úloze s jediným výběrem
 - ▶ mají-li rozdíly normální rozdělení, pak párový t-test

příklad: výška rodičů

- ▶ rozhodnout o tvrzení, že populační průměr výšek otců je právě o 10 cm větší než populační průměr výšek matek
- ▶ otcové: $\bar{Y} = 179,26$, $s_Y = 6,78$, $n_1 = 99$
matky: $\bar{Z} = 166,97$, $s_Z = 6,11$, $n_2 = 99$
- ▶ otcové jsou (ve výběru) v průměru o $\bar{Y} - \bar{Z} = 12,29$ cm vyšší
- ▶ směrodatná odchylka **rozdílu** je $8,14$ (méně, než kdyby byly výšky rodičů nezávislé ... $6,78^2 + 6,11^2 = 9,13^2$)
- ▶ **střední chyba** rozdílu průměrů je $8,14 / \sqrt{99} = 0,819$
- ▶ rozhodneme podle statistiky [t.test(vyska.o~vyska.m, mu=10)]

$$T = \left| \frac{12,29 - 10}{0,819} \right| = 2,801 > 1,984 = t_{98}(0,05) \quad p = 0,6 \%$$

Mannův-Whitneyův (Wilcoxonův) test pořadová obdoba dvouvýběrového t-testu

- ▶ porovnáváme stejný kvantitativní znak ve dvou populacích
- ▶ máme dva **nezávislé** výběry z těchto populací
- ▶ co když nelze předpokládat normální rozdělení?
- ▶ nechť X_1, \dots, X_{n_1} a Y_1, \dots, Y_{n_2} jsou **nezávislé** výběry ze spojitého rozdělení (například věk matek, střední délka života mužů při narození ve dvou skupinách zemí, potratovost ...)
- ▶ H_0 tvrdí, že obě rozdělení jsou stejná (mezi populacemi není rozdíl, zpravidla nás zajímá, že není rozdíl v mírách polohy)
- ▶ specielně to znamená, že **populační mediány** jsou shodné
- ▶ postup založen na pořadí bez ohledu na výběr
- ▶ idea: kdyby nebyl mezi populacemi rozdíl, byla by takto zjištěná průměrná pořadí v obou výběrech podobná

příklad: potraty na 1000 obyv. (Čechy vers. Morava) v roce 2003

kraj	Pha	Stč	Jč	Pl	KV	Ús	Lb
potratovost	4,03	4,02	4,11	4,70	5,65	5,80	4,98
pořadí	7	6	8	10	12	13	11
kraj	HK	Par	Vys	JM	OI	ZI	MS
potratovost	4,33	3,38	3,57	3,70	3,65	3,42	3,87
pořadí	9	1		4	3	2	5

- ▶ H_0 : shoda populací (zejm. mediánů), H_1 : neshoda
- ▶ nejasné, kam patří kraj Vysočina; vynecháme jej
- ▶ průměrné pořadí českých krajů: $77/9=8,56$
 $W_1=7+6+8+10+12+13+11+9+1=77$
- ▶ průměrné pořadí moravských krajů: $14/4=3,5$
 $W_2=4+3+2+5=14$

přesný výpočet p -hodnoty Wilcoxonova testu

- ▶ zajímá nás, nakolik je náš výsledek ($W_1 = 77, W_2 = 14$) výjimečný
- ▶ máme celkem $n_1 + n_2 = 13$ pozorování, čtyři z nich (tolik jich je v menší skupině, z Moravy) lze vybrat celkem $\binom{13}{4} = 715$ způsoby
- ▶ kolik z těchto způsobů vede k tak extrémně nestejným průměrným pořadím?
- ▶ budeme hledat, kolik čtveřic označených za moravské by dalo v součtu nejvýš 14, jak nám doopravdy vyšlo
- ▶ vždy platí $W_1 + W_2 = (n_1 + n_2)(n_1 + n_2 + 1)/2 = 91$
 (součet čísel $1 + 2 + \dots + n_1 + n_2$)
- ▶ stačí zabývat se jedinou ze statistik W_1, W_2 , zpravidla tou pro menší výběr

přibližné rozhodování (n_1, n_2 desítky)

- ▶ W_1, W_2 součty pořadí, W_1 standardizujeme

$$Z = \frac{W_1 - n_1(n_1 + n_2 + 1)/2}{\sqrt{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)/12}}$$

- ▶ za hypotézy (není rozdíl mezi populacemi) je použitím centrální limitní věty $Z \sim N(0, 1)$

- ▶ hypotézu zamítáme, je-li $|Z| \geq z(\alpha/2)$

- ▶ náš příklad: [wilcox.test(potr~Cechy)]

$$Z = \left| \frac{77 - 9 \cdot 14/2}{\sqrt{9 \cdot 4 \cdot 14/12}} \right| = 2,16 > 1,96 = z(0,05/2) \quad p = 3,1 \%$$

- ▶ na 5% hladině jsme prokázali rozdíl

přehled možných čtveřic v nichž je součet pořadí nejvýš 14 (čtveřice vybíráme z čísel 1, 2, ..., 13)

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2
3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4	3
4	5	6	5	7	6	5	8	7	6	6	5	9
10	11	12	12	13	13	13	14	14	14	14	14	15

- ▶ nejvýš 14 mohl být součet pořadí za platnosti hypotézy s pravděpodobností $p_1 = 12/715 = 0,01678$
- ▶ protože máme oboustrannou alternativu, musíme vzít v úvahu také situaci, kdy by byla na Moravě velká pořadí, p -hodnotu nutno zdvojnásobit: $p = 24/715 = 3,4 \%$


příklad: klesá potratovost? (párový t-test zde nevhodný)

potratů na 100 těhotenství


Y_i	Z_i	X_i	R_i^+
24,7	23,1	1,6	4
25,7	23,6	2,1	6
31,6	27,9	3,7	12
24,3	22,2	2,1	7
26,8	23,4	3,4	11
30,6	27,9	2,7	10
21,1	21,5	-0,4	1
23,5	26,0	-2,5	8
26,9	24,3	2,6	9
22,5	23,9	-1,4	3
23,1	21,2	1,9	5
24,9	25,7	-0,8	2

- ▶ použijeme údaje z 12 okresů v letech 2000 (Y_i) a 2001 (Z_i)
- ▶ hypotéza H_0 : v obou letech potratovost stejná, rozdíly dány náhodným kolísáním; H_1 : potratovost klesá (jednostranná alt.)
- ▶ za H_0 by rozdíly měly kolísat **symetricky kolem nuly**
- ▶ za H_1 by měly převládat kladné rozdíly, spíše velké
- ▶ průměrné pořadí z 8 kladných rozdílů: 8 (součet $W = 64$), průměrné pořadí ze 4 záporných rozdílů 3,5 (součet 14)

příklad: klesá potratovost?



vývoj



velikost poklesu

párový Wilcoxonův (Wilcoxon signed rank) test

- ▶ nechť $(Y_1, Z_1), \dots, (Y_n, Z_n)$ **nezávislé** dvojice, rozdíly $X_i = Y_i - Z_i$ mají **spojité** rozdělení
- ▶ H_0 : Y_i, Z_i mají stejně rozdělení (populace jsou stejné)
- ▶ mají-li Y_i, Z_i stejně rozdělení, pak rozdíly $X_i = Y_i - Z_i$ jsou symetricky rozděleny kolem nuly
- ▶ postup
 - ▶ vyloučit nulové hodnoty X_i (tedy shodné hodnoty Y_i, Z_i), podle toho případně zmenšit n
 - ▶ určit pořadí R_i^+ **absolutních hodnot** $|X_i| = |Y_i - Z_i|$
 - ▶ určit W , tj. součet pořadí původně kladných hodnot X_i
 - ▶ podle W rozhodnout

rozhodování

- ▶ na základě centrální limitní věty lze použít

$$Z = \frac{W - E W}{S.E.(W)} = \frac{W - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}}$$

- ▶ hypotézu o shodě zamítneme, bude-li $|Z| \geq z(\alpha/2)$
- ▶ při jednostranné alternativě porovnat Z a $z(\alpha)$
- ▶ pro malý počet dvojic (do deseti) raději použít tabulky
- ▶ příklad ($W = 64$, $n = 12$, jinak přesně je $p = 2,6\%$)

$$Z = \frac{64 - 12 \cdot 13/4}{\sqrt{12 \cdot 13 \cdot 25/24}} = 1,961 > 1,645 = z(0,05), p = 2,5\%$$

poznámky k výpočtu

- nezapomenout vyloučit nulové rozdíly
- shodným absolutním hodnotám rozdílům přiřadíme jejich průměrné pořadí
- Excel nám v takovém případě moc nepomůže, protože řeší problém shod nestandardně, např.:

X_i	4	-2	5	2	-6	-4	2	7
$ X_i $	4	2	5	2	6	4	2	7
R_i^+	4,5	2	6	2	7	4,5	2	8
Excel	4	1	6	1	7	4	1	8

- v tabulce patrné nestandardní chování Excelu
- `[wilcox.test(pokles,alternative="greater")]`

párový znaménkový (sign) test

- hodnotí pouze **počet** kladných a záporných rozdílů, nezáleží na tom, jak jsou rozdíly veliké (slabší test než Wilcoxonův)
- $H_0 : Y_i, Z_i$ mají stejné rozdělení; za hypotézy očekáváme, že počty kladných a záporných X_i jsou podobné
- označme Y počet kladných X_i z celkem n nenulových, za hypotézy $Y \sim bi(n, 1/2)$
- přibližné rozhodování (centrální limitní věta)

$$Z = \frac{Y - n/2}{\sqrt{n/4}} = \frac{2Y - n}{\sqrt{n}}, \text{ zamítat pro } |Z| \geq z(\alpha/2)$$

- při jednostranné alternativě porovnáme Z a $z(\alpha)$

poznámky

- pro znaménkový test není třeba znát hodnoty Y_i, Z_i , stačí vědět, která z možností $Y_i > Z_i$, $Y_i < Z_i$, $Y_i = Z_i$ nastala
- náš příklad o možném poklesu potratovosti ($n = 12$, $Y = 8$)

$$Z = \frac{2 \cdot 8 - 12}{\sqrt{12}} = 1,155, \quad p = P(Z > 1,155) = 0,124$$


- při malých hodnotách n (do 30) se doporučuje Yatesova korekce

$$Z_{Yates} = \frac{|2Y - n| - 1}{\sqrt{n}} \text{ sign}(2Y - n)$$

- náš příklad (Yatesova korekce, jiným způsobem přesně $p = 0,194$)

$$Z = \frac{|2 \cdot 8 - 12| - 1}{\sqrt{12}} \cdot 1 = 0,866, \quad p = 1 - \Phi(0,866) = 0,193$$

souvisí spolu výšky rodičů?



prokazování závislosti spojitéch veličin


- ▶ víme, že pro nezávislé X, Y je $\rho_{X,Y} = 0$
- ▶ r_{xy} je odhadem $\rho_{X,Y}$; jak daleko od nuly musí být r_{xy} , abychom na hladině α prokázali zazávislost X, Y ?
- ▶ za předpokladu, že X, Y mají normální rozdělení (nebo počet pozorovaných dvojic X_i, Y_i je velký), hypotézu nezávislosti zamítáme pokud je $|T| \geq t_{n-2}(\alpha)$, kde

$$T = \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} \sqrt{n - 2}$$

příklad: výšky rodičů

- ▶ pro $n = 99$ dvojic byl spočítán korelační koeficient $r = 0,205$;
- ▶ $T = \frac{0,205}{\sqrt{1 - 0,205^2}} \sqrt{97} = 2,07 > t_{97}(0,05) = 1,98$
- ▶ na 5% hladině jsme závislost prokázali
- ▶ $t_{97}(0,01) = 2,63$, tudíž na 1% hladině jsme závislost neprokázali
- ▶ výška zpravidla splňuje předpoklad o normálním rozdělení
- ▶ `[cor.test(vyska.m+vyska.o,data=Kojeni)]`
`[CORREL(x;y)]` (pouze výpočet korelačního koeficientu)
- ▶ není-li normální rozdělení a nemnoho pozorování, raději použít Spearmanův korelační koeficient

příklad: výšky rodičů



Spearmanův korelační koeficient

- ▶ místo původních hodnot x_i, y_i používá jejich pořadí R_i, Q_i
- ▶ je to vlastně Pearsonův korelační koeficient použitý na pořadí
- ▶ výpočet lze upravit, zjednodušit na

$$r_s = 1 - \frac{6}{n(n^2 - 1)} \sum_{i=1}^n (R_i - Q_i)^2$$

- ▶ vhodný pro nelineární monotonné **závislost**, nevadí odlehle hodnoty
- ▶ při testování nemusí být normální rozdělení


příklad: alkohol a úmrtnost na cirhózu

země	spotřeba	úmrtnost	R_i	Q_i	$R_i - Q_i$
Finsko	3,9	3,6	1	3	-2
Norsko	4,2	4,3	2	5	-3
Irsko	5,6	3,4	3	2	1
Holandsko	5,7	3,7	4	4	0
Švédsko	6,0	7,2	5	7	-2
Anglie	7,2	3,0	6	1	5
Belgie	10,8	12,3	7	8	-1
Rakousko	10,9	7,0	8	6	2
SRN	12,3	23,7	9	10	-1
Itálie	15,7	23,6	10	9	1
Francie	24,7	46,1	11	11	0

$$r_s = 1 - \frac{6}{11 \cdot 120} (2^2 + 3^2 + \dots) = 0,773$$

$r = 0,956$ zdánlivě mnohem těsnější závislost!

cirhóza jater a spotřeba alkoholu




Regrese

- ▶ na rozdíl od korelace (síla závislosti) hledáme tvar (způsob) závislosti, zajímá nás také průkaznost závislosti
- ▶ snažíme se z daných hodnot **regresorů (nezávisle proměnných)** předpovědět hodnoty **závisle proměnné** (odezvy, vysvětlované proměnné)
- ▶ snažíme se variabilitu (kolísání hodnot) odezvy vysvětlit kolísáním regresorů
- ▶ prvně v tomto smyslu F. Galton (1886) při vyšetřování závislosti výšky potomků na průměrné výšce rodičů
- ▶ Pearson, Lee (1903): potomci otců o dva palce vyšších než průměr všech otců byli v průměru jen o palec vyšší než průměr synů; dvoupalcová odchylka se nereprodukovala celá, byl patrný návrat (**regres**) k průměru

příklad: souvisí úmrtnost se zeměpisnou šírkou?

úmrtnost na melanom na 10 000 000 obyvatel v státech USA



regresní přímka

- chování Y (úmrtnost, mortality) co nejlépe (nejvíce) vysvětlit lineární závislostí na x (zeměpisná šířka, latitude)
- (naše představa, předpoklad:) každé zem. šířce odpovídá jakási střední úmrtnost, ta závisí na zeměpisné šířce lineárně

$$\mathbb{E} Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i, \quad i = 1, \dots, n$$

- parametry β_0, β_1 odhadneme **metodou nejmenších čtverců** minimalizací přes β_0, β_1 součtu čtverců „svislých“ odchylek

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

- výsledné minimum (pro $\beta_0 = b_0, \beta_1 = b_1$) nazveme **reziduální součet čtverců**, tj. $S_e = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$

náš příklad


[summary(lm(mortality~latitude))]

koef.	odhad	stř. chyba	t-stat.	p
abs. člen	389,19	23,81	16,34	<0,001
latitude	-5,98	0,60	-9,99	<0,001

- odhad závislosti: $\widehat{\text{mortality}} = 389,19 - 5,98 \text{ latitude}$
- s každým stupněm sev. šířky klesá úmrtnost v průměru téměř o 6 osob na 10 000 000 obyvatel
- na rovníku by úmrtnost měla být 389 jednotek, ale je to extrapolace mimo rozmezí známých hodnot – sotva použitelné
- závislost je průkazná, neboť v řádku pro x (latitude) je $p < 0,001$

metoda nejmenších čtverců

odhadovaná závislost: $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x$ (populace)
 odhad závislosti: $y = b_0 + b_1 \cdot x$ (výběr)
 celková plocha čtverců: $S_e = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$ (výběr)



obecně

- odhadovaná závislost $y = \beta_0 + \beta_1 x$, odhadnutá $y = b_0 + b_1 x$
- závislost na x prokazujeme testováním hypotézy $H_0 : \beta_1 = 0$ (pak je y pro všechna x stejné, tedy $y = \beta_0$) pomocí

$$T = \frac{b_1}{\text{S.E.}(b_1)} = \frac{b_1}{s} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- zamítáme H_0 proti oboustr. alternativě, když $|T| \geq t_{n-2}(\alpha)$
- **reziduální součet čtverců – nevysvětlená variabilita Y**
 $S_e = \sum_{i=1}^n (Y_i - (b_0 + b_1 x_i))^2$ reziduální součet čtverců
 $s^2 = S_e / (n - 2)$ reziduální rozptyl
- **koefficient determinace** ukazuje, jaký **díl variability odezvy** (tj. $\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$) jsme závislosti vysvětlili

$$R^2 = 1 - \frac{S_e}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$$

náš příklad a tabulka analýzy rozptylu

[anova(lm(mortality~latitude))]

variabilita	st. vol. <i>f</i>	součet čtverců <i>SS</i>	prům. čtverec <i>MS</i>	<i>F</i>	<i>p</i>
model	1	36 464,20	36 464,20	99,797	<0,001
reziduální	47	17 173,07	365,38		
celkem	48	53 637,27			

- kolísání úmrtnosti vysvětlíme závislostí z 68 %, neboť je

$$R^2 = 1 - \frac{17173,07}{53637,27} = \frac{36464,20}{53637,27} = 0,680$$

interpretace

- odhad byl: $\widehat{\text{úmrtnost}} = 389,19 - 5,98 \cdot \text{šířka}$
- na 30. stupni očekáváme úmrtnost:
 $389,19 - 5,98 \cdot 30 = 209,86$
- na 40. stupni očekáváme úmrtnost:
 $389,19 - 5,98 \cdot 40 = 150,08$
- přechod z 30. stupně na 40. stupeň znamená **v průměru** pokles o $10 \cdot 5,98 = 59,8$ úmrtí na 10 000 000 obyvatel
- pokusíme se predikci zlepšit přidáním další nezávisle proměnné

dva regresory

koef.	odhad	stř. chyba	t-stat.	<i>p</i>
abs. člen	401,17	28,04	14,31	<0,001
latitude	- 5,93	0,60	- 9,82	<0,001
longitude	0,15	0,19	0,82	0,418

- pokusíme se přidat zeměpisnou délku
- není průkazné, že by koeficient u longitude byl nenulový (nezamítne hypotézu, že koeficient je nulový)
- longitude nepřináší další informaci o mortality, kterou bychom už neměli ze známé hodnoty latitude
- ⇒ není vhodné přidávat do modelu s latitude také longitude
- koeficient determinace $R^2 = 0,684$ (původně 0,680)

podrobnější rozbor – vliv oceánu

- závislost jen pro vnitrozemské státy ($R^2 = 59,6\%$):
[*lm(mortality~latitude,subset=Ocean==0)*]

koef.	odhad	stř. chyba	t-stat.	<i>p</i>
abs. člen	360,55	36,70	9,82	<0,001
latitude	- 5,485	0,904	- 6,07	<0,001

- závislost jen pro přímořské státy ($R^2 = 78,6\%$):
[*lm(mortality~latitude,subset=Ocean==1)*]
- | koef. | odhad | stř. chyba | t-stat. | <i>p</i> |
|-----------|---------|------------|---------|----------|
| abs. člen | 381,20 | 24,83 | 15,35 | <0,001 |
| latitude | - 5,491 | 0,640 | - 8,58 | <0,001 |
- směrnice jsou téměř stejné, abs. členy rozdílné
 - v obou případech s každým stupněm sev. šířky klesá úmrtnost v průměru téměř o 5,5 osob na 10 000 000 obyvatel

společně vnitrozemské i přímořské státy

[summary(lm(mortality~Ocean+latitude))]


koef.	odhad	stř. chyba	t-stat.	p
abs. člen	360,69	21,50	16,78	<0,001
ocean	20,43	4,83	4,23	<0,001
latitude	-5,49	0,53	-10,44	<0,001

- ▶ koeficient determinace $R^2=0,770$
- ▶ při „stěhování“ z vnitrozemí k oceánu po rovnoběžce roste úmrtnost v průměru o 20 osob na 10 milionů obyvatel
- ▶ je to ekvivalentní vnitrozemskému stěhování o $20,43/5,49 = 3,72$ stupňů na jih
- ▶ na každý stupeň stěhování na sever klesá úmrtnost o 5,5, pokud se nezmění vztah k oceánu

pozor na interpretaci odhadů (na dalším příkladu)

- ▶ závisí procento tuku dospělého muže na jeho výšce? pokud ano, tak s výškou roste nebo klesá?
- ▶ závisí na tom, jak se na úlohu díváme, co bereme v úvahu
- ▶ $\hat{fat} = -47,68 + 0,341 \text{ height}$ $R^2 = 11,8\%$
- ▶ $\hat{fat} = 16,55 - 0,244 \text{ height} + 0,504 \text{ weight}$ $R^2 = 71,4\%$
- ▶ ve všech případech jsou koeficienty u regresorů na 5% hladině průkazně nenulové
- ▶ rozdíl je v kvalitě vyrovnání, ale zejména v interpretaci
- ▶ průměrná změna procenta tuku při jednotkové změně výšky (a **nezměněné hmotnosti** pro druhý model)

příklad: souvisí úmrtnost s polohou?



- ▶ vnitrozemské státy: $y=360,69-5,49 x$
- ▶ přímořské státy: $y=(360,69+20,43)-5,49 x =381,12-5,49 x$
- ▶ lze ověřit, že přímky mohou být rovnoběžné ($p=99,6\%$)

regrese v MS Excelu 2000, 2003



	Excel 2000	označení
absolutní člen odhad	Hranice Koeficienty	b_0 b_i
střední chyba odhadu koeficient	Chyba střední hodnoty	$S.E.(b_j)$
(mnohonásobné) korelace koeficient determinace adjustovaný koef. det. resid. směr. odchylka počet pozorování počet st. volnosti	Násobné R Hodnota spolehlivosti R Nastavená hodnota spol. R Chyba střední hodnoty Pozorování Rozdíl	R^2 R^2_{adj} s n

regrese v MS Excelu 2000, 2003

- ▶ Pozor na nabízený graf „Graf s rozdelením pravděpodobnosti“: obecně **nevypovídá** o normálním rozdelení, jak by asi chtěl, bylo by třeba použít místo vysvětlované veličiny některá z reziduů
- ▶ Nabízená „Normovaná rezidua“ jsou v regresi zcela nestandardní (z-skóry běžných reziduí)

praktické problémy: transformace


střední délka života \sim HDP (rok 1992, 33 skupin zemí z celého světa)



- ▶ v původním měřítku závislost nelineární
- ▶ logaritmování HDP hodně pomohlo, ale ještě jistě jiné vlivy
- ▶ $\log(\text{HDP})$ vysvětlí téměř 79 % variability střední délky života
- ▶ lze identifikovat státy, které se zvlášť vymykají

praktické problémy: zdánlivá závislost


počet letišť \sim délka železnic v Evropě



- ▶ v původním měřítku: $R^2 = 78 \%$, $p = 0,2 \%$
- ▶ v logaritmickém měřítku: $R^2 = 66 \%$, $p = 0,02 \%$
- ▶ logaritmické měřítko, bez Lucemburska: $R^2 = 69 \%$, $p = 1 \%$

praktické problémy: zdánlivá závislost



počet letišť \sim délka železnic v Evropě



- ▶ počet letišť i délka železnic souvisí s velikostí země
- ▶ u letišť: $R^2 = 86 \%$, $p = 0,03 \%$
- ▶ u železnic: $R^2 = 64 \%$, $p = 0,03 \%$

praktické problémy: zdánlivá závislost

počet letišť a délka železnic \sim plocha






- ▶ závislost v logaritmickém: $R^2 = 28\%$, $p = 14\%$
- ▶ závislost v původním měřítku: $R^2 = 12\%$, $p = 36\%$
- ▶ relativní počet letišť nesouvisí s relativní délkou železnic

příklad: je výběr reprezentativní?

- ▶ bylo provedeno šetření mezi ženami ve věku 18 až 50 let
- ▶ mezi 498 náhodně oslovenými ženami bylo celkem 180 žen svobodných, 239 žen vdaných, 75 žen rozvedených a 4 ovdovělé
- ▶ stejné údaje v procentech: 36,14 % svobodných, 47,99 % vdaných, 15,06 % rozvedených, 0,80 % ovdovělých
- ▶ je známo, že v celé populaci žen v ČR uvedeného věkového rozpětí je 34,27 % svobodných, 52,02 % vdaných, 12,50 % rozvedených a 1,20 % ovdovělých
- ▶ lze výběr považovat za reprezentativní?

praktické problémy: časová řada

vývoj HDP v ČR – pozorování tvoří časovou řadu



- ▶ po sobě jsoucí pozorování nejsou nezávislá
- ▶ je patrný vliv čtvrtletí (rezidua vpravo)
- ▶ na pravém grafu patrný vliv „balíčku“

multinomické rozdělení

- ▶ zobecnění binomického rozdělení na k -tici náhodných veličin X_1, \dots, X_k
- ▶ parametry n, π_1, \dots, π_k ($0 < \pi_j < 1$, $\pi_1 + \dots + \pi_k = 1$)
- ▶ **n nezávislých** pokusů
- ▶ v každém pokusu **právě jeden** z k možných výsledků
- ▶ j -tý výsledek s pravděpodobností π_j
- ▶ X_j – počet pokusů, v nichž nastal j -tý možný výsledek, tedy nutně

$$X_1 + \dots + X_k = n$$

příklady multinomického rozdělení

- ▶ předvolební průzkum
 - ▶ n – počet tázaných
 - ▶ π_j – skutečný podíl voličů j -té strany v populaci
 - ▶ X_j – počet (četnost) voličů j -té strany ve výběru
- ▶ hody hrací kostkou
 - ▶ n – počet hodů
 - ▶ π_1, \dots, π_6 – pravděpodobnosti jednotlivých stran kostky
 - ▶ X_1, \dots, X_6 – absolutní četnosti jednotlivých stran kostky
- ▶ krevní skupiny
 - ▶ $n=4$ (skupiny 0, A, B, AB)
 - ▶ $\pi_0, \pi_A, \pi_B, \pi_{AB}$ – pstí skupin 0, A, B, AB
 - ▶ X_0, X_A, X_B, X_{AB} – počty osob se skupinami 0, A, B, AB

vlastnosti multinomického rozdělení

- ▶ každá složka má binomické rozdělení: $X_j \sim bi(n, \pi_j)$
- ▶ střední hodnota: $\mu_{X_j} = n\pi_j$, rozptyl: $\sigma_{X_j}^2 = n\pi_j(1 - \pi_j)$
- ▶ (pro zajímavost) kovariance: $\text{cov}(X_j, X_t) = -n\pi_j\pi_t \quad j \neq t$
- ▶ asymptotická vlastnost **chí-kvadrát** (velká n , $n\pi_j \geq 5$)

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(X_j - n\pi_j)^2}{n\pi_j} \sim \chi^2_{k-1}$$

- ▶ X_j – empirické četnosti,
- ▶ $n\pi_j$ – očekávané (teoretické) četnosti

příklad: hrací kostka A

- ▶ test **jednoduché** hypotézy
- ▶ $n = 100$ hodů kostkou
- ▶ $X_1 = 12, X_2 = 21, X_3 = 14, X_4 = 15, X_5 = 21, X_6 = 17$
- ▶ hypotéza $H_0 : \pi_1 = \dots = \pi_6 = 1/6$ dá očekávané četnosti
 $n\pi_1 = \dots = n\pi_6 = 100/6 = 16,67$ (vždy více než 5))
- ▶ $\chi^2 = \frac{(12 - 16,67)^2}{16,67} + \dots + \frac{(17 - 16,67)^2}{16,67} = 4,16$
- ▶ $\chi^2 < \chi^2_5(0,05) = 11,07, \quad p = 52,7 \%$
- ▶ neprokázali jsme, že by kostka nebyla symetrická
- ▶ [chisq.test(c(12,21,14,15,21,17),p=rep(1,6)/6)]

příklad: hrací kostka B (1)

- ▶ $n = 100$ hodů kostkou
- ▶ $X_1 = 15, X_2 = 16, X_3 = 7, X_4 = 6, X_5 = 15, X_6 = 41$
- ▶ hypotéza $H_0 : \pi_1 = \dots = \pi_6 = 1/6$ dá očekávané četnosti
 $n\pi_1 = \dots = n\pi_6 = 100/6 = 16,67$

$$\chi^2 = \frac{(15 - 16,67)^2}{16,67} + \dots + \frac{(41 - 16,67)^2}{16,67} = 48,32$$

- ▶ $\chi^2 > \chi^2_5(0,05) = 11,07$
- ▶ zřejmě je nutno zamítout hypotézu, že kostka je symetrická
- ▶ na 5% hladině jsme prokázali, že není symetrická

příklad: hrací kostka B (2), jiná H_0

- ▶ $n = 100$ hodů kostkou
- ▶ $X_1 = 15, X_2 = 16, X_3 = 7, X_4 = 6, X_5 = 15, X_6 = 41$
- ▶ nulová hypotéza: $\pi_1 = \dots = \pi_5 = 1/10, \pi_6 = 5/10 = 1/2$
- ▶ očekávané četnosti za hypotézy:
 $n\pi_1 = \dots = n\pi_5 = 100/10 = 10, n\pi_6 = 100/2 = 50$
- $$\chi^2 = \frac{(15 - 10)^2}{10} + \dots + \frac{(15 - 10)^2}{10} + \frac{(41 - 50)^2}{50} = 12,72$$
- ▶ $\chi^2 > \chi^2_{0,05}(5) = 11,07$
- ▶ zřejmě je nutno zamítнуть i tuto hypotézu
`[chisq.test(c(15,16,7,6,15,41),p=c(1,1,1,1,1,5))/10]`

příklad: je výběr reprezentativní?

- ▶ provedeme test hypotézy, že pravděpodobnosti čtyř skupin žen jsou rovny procentům v populaci

	svobodné	vdané	rozvedené	ovdovělé	celkem
populace	34,27 %	52,02 %	12,50 %	1,20 %	100 %
výběr	180	239	75	4	498
výběr (rel.)	36,14 %	47,99 %	15,06 %	0,80 %	100 %
oček. čet.	170,69	259,07	62,26	5,99	498
přínos	0,51	1,55	2,61	0,66	5,33

$$\frac{(180 - 170,69)^2}{170,69} + \frac{(239 - 259,07)^2}{259,07} + \frac{(75 - 62,26)^2}{62,26} + \frac{(4 - 5,99)^2}{5,99}$$

- ▶ výsledná hodnota chí-kvadrát je $\chi^2 = 5,33$, ale $\chi^2_{0,05} = 7,81$
- ▶ neprokázali jsme, že by výběr nebyl reprezentativní, můžeme jej za reprezentativní považovat

příklad: hrací kostka B (3) (použít jen část informace)

- ▶ $n = 100$ hodů kostkou
- ▶ $X_6 = 41$
- ▶ nulová hypotéza: $\pi_6 = 5/10 = 1/2$
- ▶ hypotéza o pesti jediného z možných výsledků (pest šestky) – binomické rozdělení
- ▶ dříve jsme určili přibližný 95% interval spolehlivosti pro pravděpodobnost šestky: $(0,31; 0,51)$
- ▶ $1/2$ je v tomto intervalu, na 5% hladine **nelze** zamítнуть
`[binom.test(41,100)]`

test homogeneity r výběru

- ▶ například, zda mají kostky A, B stejné šestice pesti (ať už je ta šestice jakákoli)
- ▶ X_{i1}, \dots, X_{ik} i-tý výběr z multinomického rozdělení s parametry $n_{i\bullet}, \pi_{i1}, \dots, \pi_{ik}$ ($i = 1, \dots, r$)
- ▶ H_0 : pravděpodobnosti jsou ve všech srovnávaných populacích stejné: $\pi_{i1} = \pi_1, \dots, \pi_{ik} = \pi_k$ (nezávisí na populaci)
- ▶ četnosti uspořádáme do kontingenční tabulky
 - ▶ n_{ij} – počet j-tých výsledků v i-tém výběru
 - ▶ $n_{i\bullet} = \sum_j n_{ij}$ jsou řádkové marginální četnosti (rozsahy výběrů)
 - ▶ $n_{\bullet j} = \sum_i n_{ij}$ jsou sloupcové marginální četnosti (četnosti možných výsledků bez ohledu na výběr)
 - ▶ $n = \sum_i n_{i\bullet} = \sum_j n_{\bullet j} = \sum_i \sum_j n_{ij}$ je celkový počet pozorování

test homogeneity r výběrů

- neznámé pravděpodobnosti π_j odhadneme pomocí marginálních relativních četností $n_{\bullet j}/n$
- očekávané četnosti tak budou $o_{ij} = n_{i\bullet} \frac{n_{\bullet j}}{n} = \frac{n_{i\bullet} n_{\bullet j}}{n}$
- empirické četnosti porovnáme s četnostmi očekávanými

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - o_{ij})^2}{o_{ij}}$$

- platí-li hypotéza, má výsledná statistika χ^2 -rozdělení $\chi^2_{(r-1)(k-1)}$
- hypotézu o shodě pravděpodobností v r populacích zamítáme, je-li $\chi^2 \geq \chi^2_{(r-1)(k-1)}(\alpha)$
- je třeba, aby očekávané četnosti byly dost velké, aspoň 5

příklad – vzdělání matek

vzdělání	porodnice		celkem
	Praha	venkov	
základní	23	11	34
střední	30	17	47
VŠ	17	1	18
celkem	70	29	99

vzdělání	porodnice		celkem
	Praha	venkov	
základní	24,0	10,0	34
střední	33,2	13,8	47
VŠ	12,7	5,3	18
celkem	70	29	99

$$\chi^2 = 6,12, \quad p = 4,7 \%$$

- kdyby rozdělení vzdělání bylo všude stejně, očekáváme tři možnosti v poměru 34:47:18 (marg. četnosti!), celkem 99
- pražských 70 matek by stejný poměr dal při **očekávaných** četnostech $70 \cdot 34/99 = 24,0$, resp. $70 \cdot 47/99 = 33,2$ resp. $70 \cdot 18/99 = 12,7$
- podobně pro matky z venkova dostaneme 9,96, po zaokrouhlení 10,0, pro další četnosti 13,8 resp. 5,3

mají obě kostky stejně šestice pravděpodobností?

- empirické četnosti (kontingenční tabulka)

A	12	21	14	15	21	17	100
B	15	16	7	6	15	41	100
	27	37	21	21	36	58	200

- očekávané četnosti (za hypotézy): $27 \cdot 100/200 = 13,5, \dots$

A	13,5	18,5	10,5	10,5	18	29	100
B	13,5	18,5	10,5	10,5	18	29	100
	27	37	21	21	36	58	200

►

$$\chi^2 = \frac{(12 - 13,5)^2}{13,5} + \frac{(21 - 18,5)^2}{18,5} + \dots + \frac{(41 - 29)^2}{29} = 18,13$$

►

$$\chi^2 > 11,07 = \chi^2_5(0,05), \quad p = 0,3 \%$$

- hypotézu o shodě pestí na kostkách A a B **zamítáme**

příklad: předvolební průzkum

zprávy TV XY	strana		celkem
	A	B	
sledoval	11	4	15
nesledoval	6	9	15
celkem	17	13	30

zprávy TV XY	strana		celkem
	A	B	
sledoval	73 %	27 %	100 %
nesledoval	40 %	60 %	100 %
celkem	57 %	43 %	100 %

zprávy TV XY	strana		celkem
	A	B	
sledoval	65 %	31 %	50 %
nesledoval	35 %	69 %	50 %
celkem	100 %	100 %	100 %

- 30 voličů bylo dotázáno, které ze dvou stran dají přednost
- souvisí odpovědi se sledováním večerních zpráv na dané TV stanici?
- znamená něco nestejně zastoupení příznivců stran u těch, kteří sledovali?
- znamenají něco nestejně podíly těch, kteří sledovali mezi příznivci dvou stran?

test nezávislosti kvalitativních znaků

- ▶ vyšetřujeme **současně** dva znaky v nominálním měřítku u n nezávislých statistických jednotek
- ▶ n_{ij} je počet jednotek, kde je současně i -tá hodnota prvního znaku a j -tá hodnota druhého znaku
- ▶ celkem je i -tá hodnota prvního znaku u $n_{i\bullet} = \sum_j n_{ij}$ jednotek, j -tá hodnota druhého znaku u $n_{\bullet j} = \sum_i n_{ij}$ jednotek
- ▶ kdyby byly znaky nezávislé, byl by pro každou hodnotu jednoho znaku poměr mezi četnostmi hodnot druhého znaku podobný, proto očekávané četnosti jsou $o_{ij} = \frac{n_{i\bullet} n_{\bullet j}}{n}$ (podmíněné psti stejné)
- ▶ výpočet χ^2 a jeho hodnocení stejně jako u homogenity

příklad: plánovaná těhotenství

skutečné četnosti (očekávané četnosti)

vzdělání	plánované		celkem
	ne	ano	
základní	20 (14,08)	14 (19,92)	34
střední	16 (19,46)	31 (27,54)	47
VŠ	5 (7,46)	13 (10,54)	18
celkem	41	58	99

- ▶ odhad pravděpodobnosti, že má matka základní vzdělání:
 $\hat{P}(vzdel = zakladni) = 34/99$
- ▶ odhad pravděpodobnosti, že jde o plánované těhotenství:
 $\hat{P}(tehot = plan) = 58/99$
- ▶ **jsou-li** vzdělání a plánovanost **nezávislé**, pak
 $P((vzdel = zakladni) \cap (tehot = plan))$
 $= P(vzdel = zakladni) \cdot P(tehot = plan) \doteq (34/99) \cdot (58/99)$
- ▶ očekávaný počet matek se základním vzděláním a plánovaným těhotenstvím (**za platnosti nulové hypotézy**) odhadneme:
 $99 \cdot (34/99) \cdot (58/99) = 34 \cdot 58/99 \doteq 19,92$

příklad: souvisí plánované těhotenství se vzděláním?

vzdělání	plánované		celkem
	ne	ano	
základní	20	14	34
střední	16	31	47
VŠ	5	13	18
celkem	41	58	99

vzdělání	plánované		celkem
	ne	ano	
základní	58,8 %	42,1 %	100 %
střední	34,0 %	66,0 %	100 %
VŠ	27,8 %	72,2 %	100 %
celkem	41,4 %	58,6 %	100 %

- ▶ je souvislost mezi odpověďmi o plánovaném těhotenství a vzděláním matek?
- ▶ kdyby byly znaky nezávislé, byly by podmíněné pravděpodobnosti pro jednotlivá vzdělání stejné, tedy jejich odhady by byly podobné
- ▶ test vlastně porovnává procenta u jednotlivých vzdělání
- ▶ chí-kvadrát test porovnává skutečně zjištěné četnosti s tím, jaké četnosti bychom v průměru očekávali, kdyby platila nulová hypotéza

příklad: plánovaná těhotenství

skutečné četnosti (očekávané četnosti)

vzdělání	plánované		celkem
	ne	ano	
základní	20 (14,08)	14 (19,92)	34
střední	16 (19,46)	31 (27,54)	47
VŠ	5 (7,46)	13 (10,54)	18
celkem	41	58	99

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(20 - 14,08)^2}{14,08} + \frac{(14 - 19,92)^2}{19,92} + \frac{(16 - 19,46)^2}{19,46} + \frac{(31 - 27,54)^2}{27,54} \\ &\quad + \frac{(5 - 7,46)^2}{7,46} + \frac{(13 - 10,54)^2}{10,54} = 6,68 \end{aligned}$$

příklad: souvisí plánované těhotenství se vzděláním?

- ▶ u každé matky zjištovány dva znaky: dosažené vzdělání, zda těhotenství plánováno

vzdělání	základní	střední	VŠ	celkem
neplánováno	20 (14,1)	16 (19,5)	5 (7,5)	41
plánováno	14 (19,9)	31 (27,5)	13 (10,5)	58
celkem	34	47	18	99

- ▶ kdyby nebyla závislost, u každého vzdělání by bylo stejné procento plánovaných těhotenství, totiž $58/99=58,6\%$
 - ▶ u zákl. vzdělání $x/34 = 58/99$ tedy $x = 34 \cdot 58/99 = 19,9$
 - ▶ u středního vzdělání $x/47 = 58/99$ tedy $x = 47 \cdot 58/99 = 27,5$
 - ▶ u vysokoškolaček $x/18 = 58/99$ tedy $x = 18 \cdot 58/99 = 10,5$
- ▶ všechny očekávané četnosti jsou dostatečně velké

$$\chi^2 = 6,68 > 5,99 = \chi^2_2(0,05), \quad p = 3,5\%$$

příklad: vzdělání snoubenců

ženich	nevěsta			celkem
	základní	střední	VŠ	
základní	24 (13,2)	12 (17,6)	3 (8,2)	39
střední	7 (11,6)	24 (15,3)	3 (7,1)	34
VŠ	3 (9,2)	9 (12,2)	15 (5,7)	27
celkem	34	45	21	100

- ▶ $\chi^2 = 43,2 > \chi^2_4(0,05) = 9,5$, $p < 0,1\%$
- ▶ na 5 % hladině jsme prokázali závislost
- ▶ vzdělání snoubenců nelze považovat za nezávislá
- ▶ četnosti na diagonále jsou větší, než očekáváme za nezávislosti
- ▶ četnosti daleko od diagonály (velký rozdíl ve vzdělání) jsou menší, než očekáváme za nezávislosti

příklad: vzdělání snoubenců

ženich	nevěsta			celkem
	základní	střední	VŠ	
základní	24	12	3	39
střední	7	24	3	34
VŠ	3	9	15	27
celkem	34	45	21	100

- ▶ u 100 náhodně vybraných snoubenců bylo zjištěno vzdělání (základní = základní nebo neúplné střední)
- ▶ lze považovat vzdělání snoubenců za nezávislá?
- ▶ jsou četnosti dost velké?
- ▶ nejmenší očekávané četnost (při nezávislosti): $27 \cdot 21/100 = 5,67$

čtyřpolní tabulka speciální případ kontingenční tabulky

a	b	$a + b$
c	d	$c + d$
$a + c$	$b + d$	n

- ▶ **sílu závislosti** lze měřit ϕ -koeficientem [phi coefficient] (čtyřpolní korelační koeficient)

$$\phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}$$

- ▶ ϕ je (jako každý korelační koeficient) mezi -1 a 1

11	4	15
6	9	15
17	13	30

▶ pro vyjde

$$\phi = \frac{11 \cdot 9 - 4 \cdot 6}{\sqrt{15 \cdot 15 \cdot 17 \cdot 13}} = 0,34$$

příklad: předvolební průzkum

- $\phi > 0$ znamená, že četnosti na hlavní diagonále (indexy 1,1 a 2,2) převládají nad četnostmi na vedlejší diagonále (indexy 1,2 a 2,1)

► v našem příkladu

TV XY	strana		celkem
	A	B	
sledoval	11	4	15
nesledoval	6	9	15
celkem	17	13	30

vychází $\phi = 0,34 > 0$

(tedy kladné), protože je $11 \cdot 9 > 6 \cdot 4$

malé očekávané četnosti ve čtyřpolní tabulce

- stále je třeba, aby byly očekávané četnosti dost velké (≥ 5)
- **Yatesova korekce** umožní rozhodnutí i při menších četnostech tím, že zmenší čitateli

$$\chi^2_{\text{Yates}} = \frac{n(|ad - bc| - n/2)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

- nezávislost se zamítá, je-li opět $\chi^2_{\text{Yates}} \geq \chi^2_1(\alpha)$
- **Fisherův exaktní test** počítá přímo p -hodnotu

čtyřpolní tabulka – prokazování závislosti

- chí-kvadrát porovnávající teoretické a očekávané četnosti lze upravit na tvar

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} = n \cdot \phi^2$$

- nezávislost se na hladině α zamítá, je-li $\chi^2 \geq \chi^2_1(\alpha)$
- příklad (předvolební průzkum)

$$\chi^2 = \frac{30 \cdot (11 \cdot 9 - 4 \cdot 6)^2}{15 \cdot 15 \cdot 17 \cdot 13} = 3,39 = 30 \cdot 0,34^2$$

- závislost jsme na 5% hladině neprokázali, neboť

$$3,39 < 3,84 = \chi^2_1(0,05), \quad p = 6,5 \%$$

příklad: souvislost délky kojení a plánování těhotenství

těhot.	Praha a venkov			venkov		
	neplán	plán.	celkem	neplán.	plán.	celkem
ve 24. t. nekojí	35	36	71	13	9	22
ve 24. t. kojí	6	22	28	1	6	7
celkem	41	58	99	14	15	29

- bez ohledu na místo: $\chi^2 = 6,43$, $p = 1,1 \%$, $\chi^2_{\text{Yates}} = 5,33$, $p = 2,1 \%$ (nejm. četnost $41 \cdot 28 / 99 = 11,6$)
Fisherův exaktní test: $p = 1,3 \%$
- venkov: $\chi^2 = 4,27$, $p = 3,9 \%$, $\chi^2_{\text{Yates}} = 2,66$, $p = 10,3 \%$ (nejm. četnost $14 \cdot 7 / 29 = 3,4$)
Fisherův exaktní test: $p = 8,0 \%$

Simpsonův paradox

dílčí tabulky mohou ukazovat na závislost jiného směru, než jejich součet

venkov	A	B	celkem
sledoval	34	5	39
nesledoval	28	2	30
celkem	62	7	69

město	A	B	celkem
sledoval	4	29	33
nesledoval	6	35	42
celkem	10	64	74

$$\phi_{\text{venkov}} = -0,10$$

$$\phi_{\text{město}} = -0,04$$

celkem	A	B	celkem
sledoval	38	34	72
nesledoval	34	37	71
celkem	72	71	143

$$\phi_{\text{celkem}} = 0,05$$

- po spojení dvou tabulek se záporným ϕ -koeficientem vyšla tabulka s kladným ϕ -koeficientem

příklad: výška desetiletých

- stejná data jako dvouvýběrový test (data ze str. 170)

$$\bar{X}_0 = 139,13, \quad n_0 = 15$$

$$\bar{X}_1 = 140,83, \quad n_1 = 12$$

$$S^2 = 38,18, \quad S = 6,18$$

▶

$$r_{\text{bis}} = \frac{140,83 - 139,13}{6,18} \sqrt{\frac{15 \cdot 12}{15 + 12}} = 0,493$$

▶ H_0 : nezávislost

- má-li X normální rozdělení, lze použít stejný test, jako u korelačního koeficientu; je to ekvivalentní dvouvýběrovému t -testu (při stejných populačních rozptylech)

závislost mezi nula-jedničkovým a kvantitativním znakem

- dva nezávislé výběry, např. hoši X_1, \dots, X_{n_0} a dívky $X_{n_0+1}, \dots, X_{n_0+n_1}$, vždy normální rozdělení jako pro dvouvýběrový t -test
- otázka: jak silně souvisí sledovaná vlastnost a pohlaví?
- označme pohlaví formálně $Y_i = 0$ pro chlapce a $Y_i = 1$ pro děvčata
- korelační koeficient $r_{X,Y}$ mezi těmito veličinami se dá zapsat také jako

$$r_{\text{bis}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_0}{S} \sqrt{\frac{n_0 n_1}{n(n-1)}}$$

- S je směrodatná odchylka spočítaná bez ohledu na pohlaví, $n = n_0 + n_1$ je celkový počet měření v obou výběrech
- r_{bis} **bodově-biseriální korelační koeficient**

přehled korelačních koeficientů

- základním je (momentový) Pearsonův

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

- když místo hodnot x_i, y_i dosadíme jejich pořadí R_i, Q_i , dostaneme (pořadový) Spearmanův korelační koeficient

$$r_s = 1 - \frac{6}{n(n^2 - 1)} \sum_{i=1}^n (R_i - Q_i)^2$$

- je-li jedna z veličin nula-jedničková, vyjde biseriální korelační koeficient r_{bis}
- jsou-li obě veličiny nula-jedničkové, dostaneme ϕ -koeficient (čtyřpolní korelační koeficient)

přehled testů o populačních mírách polohy

rozdělení	normální	spojité
populační parametr (o čem je hypotéza)	populační průměr	populační medián
jeden výběr	jednovýběrový <i>t</i> -test	znaménkový Wilcoxon
výběr dvojic	párový <i>t</i> -test	znaménkový Wilcoxon
dva nezávislé výběry	dvouvýběrový <i>t</i> -test	Mann-Whitney

organizace zkoušení

- ▶ zkouší jen předem zapsané studenty (jinak jen výjimečně, je-li volné místo), a to v PUA (Alb. 6) nebo v B5 (Viničná 7)
- ▶ studenti FTVS se hlásí na volná místa emailem; volná místa se poznají tak, že počet přihlášených je menší než v SIS uvedená kapacita
- ▶ student musí již mít zápočet
- ▶ každý student dostane vlastní písemné zadání
- ▶ výpočty lze provádět v Excelu, v R nebo na vlastní kalkulačce; jiné pomůcky nejsou povoleny
- ▶ student bude mít možnost ústně odpovídat na dotazy
- ▶ budu se ptát na základní věci i mimo písemně položené otázky

12. přednáška 17. prosince

Statistiká (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

ukázka zadání/1

▶ **Statistiká (zadání úloh ke zkoušce, ak. rok 2007/08)**

7

Napište svoje jméno a příjmení, studovaný obor a dnešní datum:

- ▶ 1. Alternativní (nula-jedničkové) rozdělení. Uveďte příklad, spočítejte střední hodnotu.
- ▶ 2. Kolika způsoby lze ze 14 krajů zvolit 5 krajů, v nichž má být proveden výzkum? S jakou pravděpodobností bude vybrán Liberecký kraj, když výběr byl proveden losováním?
- ▶ 3. K následujícím hodnotám spočítejte popisné statistiky:

1 8 2 3 6

 $\bar{x} =$ $\tilde{x} =$ $s_x =$

13. přednáška 7. ledna

Statistiká (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

ukázka zadání/2

- ▶ 4. Určete pravděpodobnost, že náhodná veličina s rozdělením $N(\mu = 2, \sigma^2 = 1)$ nabude hodnoty v mezích od -3 do 0 .

$$p =$$

- ▶ 5. Na 5% hladině se pokuste prokázat rozdíl mezi hochy (x) a dívkami (y) v hmotnosti ve 24. týdnu:

x	7	8	8	8	7	9	6	7	8	7
y	8	9	8	8	8	9	9	7	9	8

$$\bar{t} = \quad p =$$

Slovní odpověď:

ukázka zadání/3

- 6. U náhodně vybraných dvacetiletých mužů byla zjištěna jejich výška a váha. Popište lineární závislost váhy na výšce a rozhodněte o její průkaznosti.

y	86	49	78	80	69	78	114	87	93	92
x	194	171	168	186	172	182	187	190	188	188

Rovnice nalezené přímky:

Koefficient determinace:

Slovní odpověď:

- 7. Souvisí preference volebních stran s pohlavím voliče?

	A	B	celkem
muži	26	13	
ženy	19	30	
celkem			

$$\chi^2 = \quad \quad \quad p =$$

Slovní odpověď:

několik slov zkoušce

- cílem zkoušení je zjistit, do jaké míry studentka či student zvládl obsah přednášky
- důležité jsou základní pojmy, myšlenkové konstrukce, nikoliv detailly
- u vzorečků je jejich smysl důležitější, než symboly
- dám přednost správnému smyslu pomocí nepřesně volených slov před nesprávně kombinovanými přesnými termíny (i když na jedničku to pak asi nebude)
- netoužím někoho do zkoušky vyhodit (přidělával bych si práci), ale nechci nikomu ubližovat tím, že by u zkoušky prošel i bez těch nejzákladnějších znalostí