

# ASYMPTOTICKÉ ROZDĚLENÍ

16.10.2018

1. Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z exponenciálního rozdělení  $\text{Exp}(\lambda)$  s hustotou  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I[x \geq 0]$ .
  - (a) Nalezněte  $T_n$  maximálně věrohodný odhad  $\lambda$ .
  - (b) Vyšetřete konvergenci v pravděpodobnosti  $T_n$  pro  $n \rightarrow \infty$ .
  - (c) Nalezněte asymptotické rozdělení  $\sqrt{n}(T_n - \lambda)$ .
  - (d) Uvažujte  $U_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I[X_i > 1]$ . Vyšetřete konvergenci v pravděpodobnosti  $U_n$  a nalezněte asymptotické rozdělení  $U_n$ .
  - (e) Definujme  $V_n = -\log(U_n)$ . Vyšetřete konvergenci v pravděpodobnosti a nalezněte asymptotické rozdělení  $V_n$ .
  
2. Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s hustotou  $f(x) = \frac{p}{x^{1+p}} I[x \geq 1]$ , kde  $p > 0$ .
  - (a) Najděte  $T_n$  maximálně věrohodný odhad parametru  $p$ .
  - (b) Ukažte, že pro  $n \rightarrow \infty$  platí  $T_n \xrightarrow{P} p$ .
  - (c) Najděte asymptotické rozdělení náhodné veličiny  $\sqrt{n}(T_n - p)$ .
  - (d) Uvažujte odhad  $U_n = \bar{X}_n / (\bar{X}_n - 1)$ . Ukažte, že se jedná o momentový odhad  $p$  a vyšetřete konvergenci v pravděpodobnosti  $U_n$ .
  - (e) Odvod'te asymptotické rozdělení  $U_n$ .
  - (f) Pro  $p = 3$  odvod'te asymptotické rozdělení náhodné veličiny  $Z_n = (\bar{X}_n)^3$ . Porovnejte rozptyl  $Z_n$  s jejím asymptotickým rozptylem.
  
3. Nechť  $X_1, \dots, X_n$  tvoří náhodný výběr z exponenciálního rozdělení s parametrem  $\lambda_x > 0$ , a nechť  $Y_1, \dots, Y_n$  jsou od nich nezávislé, a tvoří náhodný výběr z exponenciálního rozdělení s parametrem  $\lambda_y > 0$ . Odvod'te asymptotické rozdělení náhodné veličiny  $T_n = \bar{X}_n / \bar{Y}_n$ .
  
4.  $X_1, X_2, \dots, X_n$  tvoří náhodný výběr z binomického rozdělení  $\text{Bi}(2, p)$ , kde  $p \in (0, 1)$ . Nechť  $Y_i = I[X_i = 0]$ .
  - (a) Vyšetřete konvergenci v pravděpodobnosti  $U_n = \sqrt{\bar{X}_n + \bar{Y}_n - 1}$ .
  - (b) Nalezněte asymptotické rozdělení  $U_n$ .
  - (c) Uvažujte náhodné vektory tvaru  $(\bar{X}_n/2, U_n)^T$ . Vyšetřete jejich konvergenci v pravděpodobnosti a nalezněte asymptotické rozdělení.

## OPAKOVÁNÍ Z PŘEDNÁŠKY

### DELTA METODA

- *Jednorozměrná verze:* Nechť  $\{T_n\}$  splňuje  $\sqrt{n}(T_n - \mu) \xrightarrow{D} \mathbf{N}(0, \sigma^2)$  pro nějaké  $\mu \in \mathbb{R}$  a  $\sigma^2 \geq 0$  a nechť  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  má spojitou derivaci na nějakém okolí bodu  $\mu$ , pak

$$\sqrt{n}(g(T_n) - g(\mu)) \xrightarrow{D} \mathbf{N}(0, [g'(\mu)]^2 \sigma^2), \quad n \rightarrow \infty.$$

- *Obecná verze:* Nechť  $\{\mathbf{T}_n\}$  splňuje  $\sqrt{n}(\mathbf{T}_n - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{D} \mathbf{N}_k(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$  pro nějaké  $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^k$  a  $\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{k \times k}$  pozitivně semi-definitní, a nechť  $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_m)^T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$  má spojitý Jakobián

$$\mathbb{D} \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_k} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_k} \end{pmatrix}$$

na nějakém okolí bodu  $\mathbf{x} = \boldsymbol{\mu}$ . Pak

$$\sqrt{n}(\mathbf{g}(\mathbf{T}_n) - \mathbf{g}(\boldsymbol{\mu})) \xrightarrow{D} \mathbf{N}_m(\mathbf{0}, (\mathbb{D} \mathbf{g}(\boldsymbol{\mu})) \boldsymbol{\Sigma} (\mathbb{D} \mathbf{g}(\boldsymbol{\mu}))^T), \quad n \rightarrow \infty.$$

**CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA (CLV):** Nechť  $\{\mathbf{X}_n\}$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\boldsymbol{\mu}$  a konečnou rozptylovou maticí  $\boldsymbol{\Sigma}$ . Pak platí

$$\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{D} \mathbf{N}(0, \boldsymbol{\Sigma}), \quad n \rightarrow \infty.$$