

Teorie čísel

Vítězslav Kala

18. února 2025

Obsah

1 Počet prvočísel	7
1.1 Čebyševův horní odhad	7
1.2 Valuace	9
1.3 Dolní odhad a Bertrandův postulát	10
2 Řetězové zlomky	12
2.1 Pellova rovnice	12
2.2 Aproximace reálných čísel	13
2.3 Existence řešení Pellovy rovnice	14
2.4 Řetězové zlomky a polynomy	15
2.5 Sblížené zlomky	17
2.6 Dobré aproximace	19
2.7 Periodické řetězové zlomky	21
2.8 Zpět k Pellově rovnici	22
3 Odmocniny z jedné	23
3.1 Gaussovská celá čísla	23
3.2 Cyklotomické polynomy	26
3.3 Prvočísla $kn + 1$	28
3.4 Irreducibilita cyklotomických polynomů	29
4 Charakter a kvadratická reciprocity	31
4.1 Primitivní prvky pro začátečníky	31
4.2 Kvadratické zbytky	31
4.3 Charakter	34
4.4 Gaussovy součty	36
4.5 Zákon reciprocity	38
4.6 Jacobiho symbol	40
4.7 Prvočísla tvaru $a^2 + 2b^2$	43
5 Testování prvočíselnosti	44
5.1 Opakování a Fermatův test	44
5.2 Pravděpodobnostní testy obecně	44
5.3 Solovay–Strassenův test prvočíselnosti	45
5.4 Primitivní prvky pro pokročilé	46
5.5 Valuace a mocniny	47
5.6 Multiplikativní grupa modulo p^e	47
5.7 Rabin-Millerův test	51

5.8	Míjení involucí	52
5.9	Počet Rabin-Millerových lhářů	54
6	Příklady	56
6.1	Základy	56
6.2	Valuace	56
6.3	Eulerova a Malá Fermatova věta	57
6.4	Čínská zbytková věta	58
6.5	Cyklické grupy	58
6.6	Fareyho zlomky	60
6.7	Řetězové zlomky	60
6.8	Pellova rovnice	62
6.9	Dobré aproximace	64
6.10	Gaussovská celá čísla	64
6.11	Diofantické rovnice	65
6.12	Kvadratické zbytky a Legendreovy symboly	66
6.13	Charakterky a Gaussovy součty	67
6.14	Jacobiho symboly	68
6.15	Prvočísla speciálních tvarů	69
6.16	Rozklad na součin cyklických grup	70
6.17	Primitivní prvky	70
6.18	Řešení kongruencí pomocí primitivních prvků	71
6.19	Carmichaelova čísla	71
6.20	Involuce	72
6.21	Míjení prvků	72
6.22	Rabin-Millerovi svědci a lháři	73
6.23	RSA	73
6.24	Cyklotomické polynomy	74
6.25	Dirichletova věta o prvočíslech	75
6.26	Jiné	75
7	Výsledky a řešení vybraných příkladů	76
7.1	Základy	76
7.2	Valuace	76
7.3	Eulerova a Malá Fermatova věta	77
7.4	Čínská zbytková věta	77
7.5	Cyklické grupy	77
7.6	Fareyho zlomky	79
7.7	Řetězové zlomky	80
7.8	Pellova rovnice	80
7.9	Dobré aproximace	81
7.10	Gaussovská celá čísla	82
7.11	Diofantické rovnice	82
7.12	Kvadratické zbytky a Legendreovy symboly	85
7.13	Charakterky a Gaussovy součty	86
7.14	Jacobiho symboly	89
7.15	Prvočísla speciálních tvarů	90

7.16 Rozklad na součin cyklických grup	90
7.17 Primitivní prvky	90
7.18 Řešení kongruencí pomocí primitivních prvků	91
7.19 Carmichaelova čísla	91
7.20 Involuce	91
7.21 Míjení prvků	92
7.22 Rabin-Millerovi svědci a lháři	92
7.23 RSA	93
7.24 Cyklotomické polynomy	93
7.25 Dirichletova věta o prvočíslech	94
7.26 Jiné	94

Úvod

Toto je pracovní verze skript k přednášce Teorie čísel.

Jejich cílem je být poměrně minimalistickým shrnutím probrané látky, jež blízce kopíruje průběh přednášek a nezahrnuje téměř žádné rozšiřující informace.

Materiál v těchto skriptech a jeho prezentace není vůbec původní: jeho většina je založená na skriptech Aleše Drápalá [Dr]. 2. kapitola primárně vychází ze skript Zuzany Masákové a Edity Pelantové [MP]; sekce 3.3 pak z textu Martina Klazara.

Za sepsání první verze skript děkuju Martinu Žuravovi; za upozorňování na chyby a překlepy děkuju studentům, kteří přednášku se mnou absolvovali (zejména v koronavirusovém letním semestru 2019/20, ale pak taky 2021/22). Příklady do 6. kapitoly připravila Žaneta Semanišinová (s využitím příkladů od dřívějších cvičících, zejména Martina Čecha a Martina Žurava). Řadu dalších úprav a vylepšení navrhl David Stanovský podle svého kurzu v roce 2020/21. Martin Raška pak podle roku 2021/22 doplnil 7. kapitolu s řešeními některých cvičení. I přes naši snahu v současné verzi nepochybňě obsahují řadu chyb, překlepů a nejasností, takže uvítám jakékoli komentáře a návrhy na zlepšení.

[Dr] Aleš Drápal, *Teorie čísel a RSA*

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~drapal/teorie_cisel.pdf

[Kl] Martin Klazar, *Analytic and Combinatorial Number Theory*, summer term 2017

<https://kam.mff.cuni.cz/~klazar/anktc17.pdf>

[MP] Zuzana Masáková, Edita Pelantová, *Teorie čísel*, skripta pro FJFI ČVUT

Poslední změny

2023. Martin Raška doplnil 7. kapitolu.

2022. Poměrně výrazná restrukturalizace a doplnění podle návrhů Davida Stanovského.

Motivace

O co jde v teorii čísel? Hlavními tématy, kterými se budeme zabývat, jsou celá čísla, dělitelnost, prvočísla a tak dále. Uvidíme například, že funkce $\pi(x)$, která označuje počet prvočísel menších nebo rovných nějakému reálnému číslu x , je rovna zhruba $\frac{x}{\log x}$. My brzo dokážeme, že $c_1 \frac{x}{\log x} \leq \pi(x) \leq c_2 \frac{x}{\log x}$ pro nějaká $c_1, c_2 > 0$.

Podíváme se také na následující tvrzení, které však nebude dokazovat v úplné obecnosti: V každé aritmetické posloupnosti $ax + b$ (pro nesoudělná a, b) existuje nekonečně mnoho prvočísel.

Základním nástrojem pro nás budou kongruenze a počítání v \mathbb{Z}_n . Jak vypadají invertibilní prvky v \mathbb{Z}_n ?

Eulerova věta říká, že $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Výpočet $\varphi(n)$ závisí na prvočíselném rozkladu n , proto nás bude také zajímat testování, jestli je n prvočíslo. Jelikož je faktORIZACE výpočetně náročná, je možné využít úvahy z teorie čísel například v kryptografii (konkrétně např. RSA).

Také se budeme věnovat diofantickým rovnicím. Velká Fermatova věta říká, že $x^n + y^n = z^n$ nemá řešení pro $x, y, z \in \mathbb{N}, n \geq 3$. To pochopitelně nedokážeme, ale vyřešíme například $x^2 + y^2 = z^2$ nebo $x^2 + 1 = y^3$ pomocí počítání v Gaussových celých číslech $\mathbb{Z}[i]$ (více oproti Algebře).

Budeme dále řešit kvadratické kongruenze $x^2 \equiv a \pmod{p}$, což vede k zákonu kvadratické reciprocity, který dokážeme pomocí počítání v $\mathbb{Z}\left[e^{\frac{2\pi i}{n}}\right]$.

Jak dobré jde dané číslo approximovat pomocí racionálních čísel? Například π je přibližně rovno $\frac{355}{113} = 3,1415929\dots$. Ukážeme, že řetězové zlomky dávají takovéto dobré aproximace.

Mimochodem, číslo 6789012...901...0...0...1 je prvočíslo, které si můžeme pamatovat jako 600001 (nebo i jako 641).

1. Počet prvočísel

Existence prvočísel se týkají dvě klíčové těžké věty:

Věta 1.1 (Prvočíselná věta). *Bud' $\pi(x) =$ počet prvočísel $\leq x$ (pro $x \in \mathbb{R}^+$). Pak*

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\log x}} = 1,$$

kde \log je přirozený logaritmus.

Zhruba řečeno, pravděpodobnost jevu, že náhodné celé číslo n je prvočíslo, je přibližně

$$\frac{1}{\log n} = \frac{1}{\log 10 \cdot \log_{10} n} \sim \frac{1}{2,3 \cdot \text{počet cifer } n}.$$

Věta 1.2 (Dirichletova věta o aritmetické posloupnosti). *Mějme $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1$. Pak existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $ax + b, x \in \mathbb{N}$.*

Oba důkazy z 19. století využívají komplexní analýzu. Dá se ale poměrně elementárně dokázat:

- Existují $c_1, c_2 > 0$ taková, že pro všechna dostatečně velká x platí

$$c_1 \frac{x}{\log x} < \pi(x) < c_2 \frac{x}{\log x}.$$

- Bertrandův postulát: pro každé přirozené číslo $n \geq 2$ existuje prvočíslo p takové, že $n < p < 2n$.
- Pro každé přirozené číslo a existuje nekonečně mnoho prvočísel p tvaru $ax + 1$.

První dvě tvrzení si dokážeme v této úvodní kapitole.

Třetí tvrzení, což je speciální případ Dirichletovy věty, si později dokážeme pomocí cyklotomických polynomů.

1.1 Čebyševův horní odhad

Začněme nejjednodušším z odhadů počtu prvočísel, a sice že

$$\pi(n) < c \cdot \frac{n}{\log n} \text{ pro nějaké } c > 1.$$

Odhadneme $\prod_{p \leq n} p$ pomocí kombinačních čísel a z toho pak odhadneme $\pi(n)$.

Lemma 1.3. Pro $k \in \mathbb{Z}, k \geq 0$, máme

$$\frac{2^{2k}}{2k+1} \leq \binom{2k}{k} \quad a \text{ také } \binom{2k+1}{k} \leq 2^{2k}.$$

Důkaz. $\binom{2k}{k}$ je největší z kombinačních čísel $\binom{2k}{i}$ pro $0 \leq i \leq 2k$ (cvičení). Tedy

$$2^{2k} = (1+1)^{2k} = \binom{2k}{0} + \binom{2k}{1} + \cdots + \binom{2k}{2k} \leq (2k+1) \cdot \binom{2k}{k}.$$

Pro druhou nerovnost máme

$$2 \cdot \binom{2k+1}{k} = \binom{2k+1}{k} + \binom{2k+1}{k+1} \leq 2^{2k+1}. \quad \square$$

Tvrzení 1.4 (Čebyšev). Pro $n \in \mathbb{N}$ máme

$$\prod_{p \leq n} p < 4^n.$$

Důkaz. Dokážeme druhou nerovnost, tu první pak dostaneme zlogaritmováním.

Pro $n = 1, 2$ je tvrzení zřejmé. Ať teď $n > 2$, budeme dokazovat indukcí.

a) Platí-li tvrzení pro $n = 2k+1$ liché, pak platí i pro $n+1 = 2k+2$, protože $2k+2$ není prvočíslo, takže se levá strana nezvětší.

b) Ať teď $n = 2k$ a nerovnost platí pro n a všechna menší čísla; chceme nerovnost pro $2k+1$.

Rozdělme $\prod_{p \leq 2k+1} p$ na součin přes $p \leq k+1$ (pro který použijeme IP) a přes $k+2 \leq p \leq 2k+1$.

Máme $\binom{2k+1}{k} = \frac{(2k+1)!}{k!(k+1)!}$ a tedy každé p , které splňuje $k+2 \leq p \leq 2k+1$, dělí čitatel v první mocnině a nedělí jmenovatel. Tedy $p \mid \binom{2k+1}{k}$ a také

$$\left(\prod_{k+2 \leq p \leq 2k+1} p \right) \mid \binom{2k+1}{k} \stackrel{1.3}{\leq} 2^{2k} = 4^k.$$

Máme tedy

$$\prod_{p \leq 2k+1} p = \prod_{p \leq k+1} p \prod_{k+2 \leq p \leq 2k+1} p \stackrel{\text{IP}}{<} 4^{k+1} \cdot 4^k = 4^{2k+1}. \quad \square$$

Věta 1.5. Existuje konstanta $c > 1$ taková, že $\pi(n) < c \cdot \frac{n}{\log n}$ (pro $n \geq 2$).

Důkaz. Máme

$$n \log 4 \stackrel{1.4}{>} \sum_{p \leq n} \log p \geq \sum_{\sqrt{n} < p \leq n} \log p \geq \sum_{\sqrt{n} < p \leq n} \log \sqrt{n} \geq \frac{1}{2} (\pi(n) - \sqrt{n}) \cdot \log n,$$

kde poslední nerovnost platí proto, že počet sčítanců na její levé straně je menší nebo rovna počtu prvočísel $\leq n$ mínus počtu všech čísel $\leq \sqrt{n}$.

Tedy

$$\pi(n) \cdot \log n \leq 2n \log 4 + \sqrt{n} \cdot \log n < (2 \log 4 + c')n.$$

Zde jsme ve druhé nerovnosti využili toho, že máme $\sqrt{n} \cdot \log n = o(n)$, čili existuje konstanta c' taková, že $\sqrt{n} \cdot \log n < c'n$. \square

Konkrétně např. platí $\sqrt{n} \cdot \log n < \frac{2}{e} \cdot n$ pro $n \geq 2$. Tedy

$$\pi(n) \cdot \log n < n \cdot \left(2 \log 4 + \frac{2}{e}\right)$$

a můžeme vzít $c = 2 \log 4 + \frac{2}{e} \approx 3,54$.

1.2 Valuace

Jedním ze základních nástrojů v teorii čísel jsou valuace.

Definice. Buď p prvočíslo a $n \in \mathbb{Z}$. Pak $v_p(n)$ značí největší $j \geq 0$ takové, že $p^j \mid n$; jde o p -valuaci čísla n . Zároveň definujeme $v_p(0) := \infty$.

Například tedy máme, že $n = \prod p^{v_p(n)}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Jedná se sice formálně o nekonečný součin, ale pokud $p \nmid n$, pak $v_p(n) = 0$ a příslušný součinitel $p^{v_p(n)} = p^0 = 1$ můžeme ignorovat.

Cvičení. Základní vlastnosti valuací jsou (pro prvočíslo p a $m, n \in \mathbb{Z}$)

- multiplikativita: $v_p(mn) = v_p(m) + v_p(n)$,
- trojúhelníková nerovnost: $v_p(m+n) \geq \min(v_p(m), v_p(n))$.

Pro zbytek kapitoly označme $\binom{2n}{n} = \prod p^{v_p}$ prvočíselný rozklad, čili $v_p = v_p(\binom{2n}{n})$.

Zřejmě máme $v_p = 0$ pro všechna $p > 2n$.

Lemma 1.6. $p^{v_p} \leq 2n$ pro všechna prvočísla p .

Důkaz. Máme

$$v_p = v_p\left(\binom{2n}{n}\right) = v_p\left(\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right) = v_p((2n)!) - 2v_p(n!).$$

Dále si všimněme, že

$$v_p(k!) = \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{k}{p^j} \right\rfloor.$$

Je to proto, že přesně $\left\lfloor \frac{k}{p} \right\rfloor$ z čísel $1, 2, \dots, k$ je dělitelných p , a tedy každé z nich přispěje 1 do exponentu p v prvočíselném rozkladu. Dále $\left\lfloor \frac{k}{p^2} \right\rfloor$ z těchto čísel je dokonce dělitelných p^2 (a proto přispějí další 1 do exponentu p), atd. s postupným uvažováním čísel dělitelných p^3, p^4, \dots

Dosazením do vzorečku pro v_p dostaváme

$$v_p = v_p((2n)!) - 2v_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^j} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor \right).$$

Zde si uvědomme, že stačí uvažovat indexy $j \leq \log_p(2n)$, protože pro větší j máme $p^j > 2n$, a tedy $\left\lfloor \frac{2n}{p^j} \right\rfloor = 0 = \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor$.

Cvičení. Pro každé n, m platí $\left\lfloor \frac{2n}{m} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor = 0, 1$.

Pomocí tohoto snadného cvičení už dokončíme důkaz: v_p je součtem nejvýše $\log_p(2n)$ sčítanců, z nichž každý je roven 0 nebo 1. Tedy $v_p \leq \log_p(2n)$, jak jsme chtěli. \square

1.3 Dolní odhad a Bertrandův postulát

Věta 1.7. Existuje $c, n_0 > 0$ taková, že pro všechna $n \geq n_0$ platí $\pi(n) > c \frac{n}{\log n}$.

Důkaz. Vzhledem k tomu, že $\pi(2n-1) = \pi(2n)$, stačí větu dokázat pro sudá čísla. Pomocí lemmat 1.3 a 1.6 odhadneme

$$\frac{2^{2n}}{2n+1} \stackrel{1.3}{\leq} \binom{2n}{n} = \prod p^{v_p} \leq (2n)^{\pi(2n)},$$

kde poslední nerovnost platí proto, že pokud $p \mid \binom{2n}{n}$, pak zřejmě $p \leq 2n$, a tedy počet prvočísel p v prvočíselném rozkladu je nejvýše $\pi(2n)$. Pro každé z nich pak použijeme lemma 1.6.

Čili $2^{2n} \leq (2n+1) \cdot (2n)^{\pi(2n)}$ a po zlogaritmování

$$2n \log 2 \leq \log(2n+1) + \pi(2n) \log(2n).$$

Z této nerovnosti dostaneme odhad

$$\pi(2n) \geq \frac{2n \log 2}{\log(2n)} - \frac{\log(2n+1)}{\log(2n)} > c \frac{2n}{\log(2n)}$$

pro vhodné c , neboť $\log(2n+1) = o(2n)$. \square

Poznámka: z poslední nerovnosti je vidět, že lze zvolit $c = \log 2 - \varepsilon$ pro libovolné $\varepsilon > 0$ (čím menší, tím větší bude n_0).

Věta 1.8 (Bertrandův postulát). Pro každé přirozené číslo $n \geq 2$ existuje prvočíslo p takové, že $n < p < 2n$.

Důkaz. Pro spor uvažujme n , pro které neexistuje prvočíslo p splňující $n < p < 2n$.

Opět označme $\binom{2n}{n} = \prod p^{v_p}$ prvočíselný rozklad. Z dřívějšího pozorování víme, že $v_p = 0$ pro všechna $p > 2n$. Z předpokladu plyne, mezi n a $2n$ žádné prvočíslo není.

Dále si všimněme, že $v_p = 0$ pro všechna $2n/3 < p \leq n$, protože taková prvočísla se vyskytují právě jednou v čitateli i jmenovateli zlomku $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)\cdots(n+1)}{n\cdots1}$. A nakonec si všimněme, že $v_p \leq 1$ pro všechna $p > \sqrt{2n}$, protože $p^{v_p} \leq 2n$ podle lemmatu 1.6.

Použitím lemmatu 1.3 a těchto pozorování dostaneme odhad

$$\frac{2^{2n}}{2n+1} \leq \binom{2n}{n} \leq \prod_{p \leq \sqrt{2n}} p^{v_p} \cdot \prod_{\sqrt{2n} < p \leq 2n} p < (2n)^{\sqrt{2n}} \cdot 4^{2n/3},$$

přičemž pro odhad prvního součinu jsme opět použili $p^{v_p} \leq 2n$ a pro odhad druhého součinu jsme použili Čebyševovu nerovnost.

Pro $n \geq 18$ lze pokračovat v odhadech

$$2^{2n} \leq (2n+1) \cdot (2n)^{\sqrt{2n}} \cdot 4^{2n/3} < (2n)^{\sqrt{2n}+2} \cdot 4^{2n/3} \leq (2n)^{\frac{4}{3} \cdot \sqrt{2n}} \cdot 4^{2n/3}.$$

Druhá a třetí nerovnost plyne z následujících úvah: $k+1 < k^2$ pro všechna $k \geq 2$, a dále $l+2 \leq \frac{4}{3}l$ pro všechna $l \geq 6$.

Po zlogaritmování dostaneme

$$2n \log 2 < \frac{4}{3} \left(\sqrt{2n} \log(2n) + n \log 2 \right),$$

lineární člen převedeme vlevo, vydělíme \sqrt{n} a dostaneme nerovnost

$$\sqrt{n} \log 2 < 2\sqrt{2} \log(2n).$$

Obě strany jsou rostoucí posloupnosti, ovšem levá strana roste mnohem rychleji a již pro $n = 2^{10}$ nerovnost neplatí.

Závěr tedy je, že pokud pro číslo n neplatí Bertrandův postulát, pak $n < 2^{10}$. Ovšem posloupnost prvočísel 3, 5, 7, 13, 23, 43, 83, 163, 317, 631, 1259 prokazuje, že pro malá n Bertrandův postulát platí, spor. \square

2. Řetězové zlomky

2.1 Pellova rovnice

Spousta motivace pro teorii čísel pochází ze snahy řešit diofantické rovnice (např. velká Fermatova věta).

Pellova rovnice: rovnice $x^2 - my^2 = 1$, kde m je dané přirozené číslo, které není čtverec. Vždy má řešení $(\pm 1, 0)$, které se nazývá triviální.

Všimněme si, že na znaménkách čísel x, y nezáleží, často tedy budeme búno předpokládat, že jsou obě čísla kladná.

Kdyby $m = d^2$, pak $1 = x^2 - d^2y^2 = (x - dy)(x + dy)$, takže $x \pm dy = \pm 1$. Odtud $2x = \pm 2$, takže $x = \pm 1$. Pak $y = 0$, což dává pouze triviální řešení.

Někdy se Pellova rovnice definuje i lehce obecněji, například s -1 nebo ± 4 napravo.

Brahmagupta (cca. 600 n.l.): „Za matematika se může považovat ten, kdo umí vyřešit $x^2 - 29y^2 = 1$.“ (řešení je (9801, 1820))

Fermat vyzval svého kamaráda k řešení pro $m = 61$: (1766319049, 226153980).

K řešení se využívá podobná myšlenka jako výše: rozklad $(x - \sqrt{m}y)(x + \sqrt{m}y) = 1$ v okruhu $\mathbb{Z}[\sqrt{m}] = \{a + b\sqrt{m} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Pozorování. Pokud jsou $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ řešení, pak také (x_3, y_3) je řešení, kde

$$x_3 + y_3\sqrt{m} = (x_1 + y_1\sqrt{m})(x_2 + y_2\sqrt{m}).$$

Důkaz. Máme $x_3 - y_3\sqrt{m} = (x_1 - y_1\sqrt{m})(x_2 - y_2\sqrt{m})$, a tedy

$$x_3^2 - y_3^2m = (x_1 + y_1\sqrt{m})(x_2 + y_2\sqrt{m})(x_1 - y_1\sqrt{m})(x_2 - y_2\sqrt{m}) = 1. \quad \square$$

Všechna řešení tedy tvoří grupu: neutrální prvek je $(1, 0)$, inverzní prvek k (x, y) je $(x, -y)$.

Tvrzení 2.1. *Bud' $m \in \mathbb{N}$ takové, že m není čtverec. Předpokládejme, že Pellova rovnice $x^2 - my^2 = 1$ má alespoň jedno netriviální řešení. Pak existuje řešení (a_0, b_0) takové, že*

$$\{(a, b) \mid a + b\sqrt{m} = \pm(a_0 + b_0\sqrt{m})^n, n \in \mathbb{Z}\}$$

jsou právě všechna řešení.

Rovnou poznamenejme, že netriviální řešení existuje vždy, jak si dokážeme ve větě 2.3. Často budeme říkat, že $a + b\sqrt{m}$ je řešení Pellovy rovnice, když dvojice (a, b) je řešením.

Důkaz. 1. Bud' (a', b') netriviální řešení, búno $a' > 0, b' > 0$. Položme

$$a_0 + b_0\sqrt{m} := \min\{a + b\sqrt{m} \text{ řešení Pellovy rovnice } | a, b > 0\}.$$

Označme tuto množinu M . Proč minimum z množiny M existuje?

Množina M je neprázdná, neboť obsahuje prvek $a' + b'\sqrt{m}$.

Všimněme si, že pokud $a_1 + b_1\sqrt{m}, a_2 + b_2\sqrt{m} \in M$, pak

$$a_1 < a_2 \Leftrightarrow a_1^2 < a_2^2 \Leftrightarrow 1 + mb_1^2 < 1 + mb_2^2 \Leftrightarrow b_1^2 < b_2^2 \Leftrightarrow b_1 < b_2.$$

Bud' $a_0 + b_0\sqrt{m} \in M$ takový, že a_0 je nejmenší možné (to existuje, neboť $a_0 \in \mathbb{N}$). Pak je také b_0 nejmenší možné. Odtud $a_0 + b_0\sqrt{m}$ je také nejmenší prvek M , a proto minimum existuje.

2. Pozorování dává, že $\pm(a_0 + b_0\sqrt{m})^n$ je řešení pro každé $n \in \mathbb{Z}$: pro $n > 0$ je to v pořadku. Dále máme $a_0 - b_0\sqrt{m} = (a_0 + b_0\sqrt{m})^{-1}$, čili pro $n = -k < 0$ je $(a_0 + b_0\sqrt{m})^{-k} = (a_0 - b_0\sqrt{m})^k$.

3. Vezměme nyní řešení $c + d\sqrt{m}$, búno $c, d > 0$.

Máme $a_0 + b_0\sqrt{m} \geq 1 + \sqrt{m} > 1$, a tedy posloupnost $(a_0 + b_0\sqrt{m})^n$ má limitu ∞ pro $n \rightarrow \infty$.

Proto existuje $n \in \mathbb{N}_0$ takové, že $(a_0 + b_0\sqrt{m})^n \leq c + d\sqrt{m} < (a_0 + b_0\sqrt{m})^{n+1}$. Pak $(a_0 + b_0\sqrt{m})^{-n}(c + d\sqrt{m}) = (a_0 - b_0\sqrt{m})^n(c + d\sqrt{m})$ je také řešení a máme

$$1 \leq x + y\sqrt{m} = (a_0 + b_0\sqrt{m})^{-n}(c + d\sqrt{m}) < a_0 + b_0\sqrt{m}.$$

Cvičení. Bud' $x + y\sqrt{m}$ řešení. Pak $x + y\sqrt{m} > 1 \Leftrightarrow x > 0$ a $y > 0$.

Tedy kdyby $x + y\sqrt{m} > 1$, pak $x + y\sqrt{m} \in M$, což je spor s minimalitou $a_0 + b_0\sqrt{m}$. Takže $x + y\sqrt{m} = 1$, což dává $c + d\sqrt{m} = (a_0 + b_0\sqrt{m})^n$. \square

(a_0, b_0) , resp. $a_0 + b_0\sqrt{m}$ se nazývá *minimální řešení Pellovy rovnice*. Např.

$$3 + 2\sqrt{2}, 2 + \sqrt{3}, \dots, 649 + 180\sqrt{13}, \dots, 1766319049 + 226153980\sqrt{61}, \dots$$

2.2 Aproximace reálných čísel

Potřebujeme dokázat předpoklad z tvrzení 2.1 o existenci nějakého netriviálního řešení. Myšlenka: $x^2 - my^2 = 1 \Rightarrow x^2 = my^2 + 1 \Rightarrow \frac{x^2}{y^2} = m + \frac{1}{y^2}$, proto přibližně platí $\frac{x}{y} \approx \sqrt{m}$. Hledáme tedy zlomky, které dobře approximují \sqrt{m} .

Bud' $\alpha \in \mathbb{R}$ a uvažujme zlomky $\dots < -\frac{1}{q} < 0 < \frac{1}{q} < \frac{2}{q} < \frac{3}{q} < \dots$. Pak α leží v nějakém z intervalů $\left[\frac{i}{q}, \frac{i+1}{q}\right)$, takže existuje p splňující $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{2q}$. Můžeme ale approximovat mnohem lépe!

Věta 2.2 (Dirichlet). *Bud' $\alpha \in \mathbb{R}$ iracionální.*

- a) *Pro každé $Q \in \mathbb{N}, Q \geq 2$, existují čísla $p, q \in \mathbb{Z}$ taková, že $1 \leq q < Q$ a $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{Qq}$.*
- b) *Existuje nekonečně mnoho zlomků $\frac{p}{q}$ (v základním tvaru) takových, že $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$.*

Poznámka. Pro $\alpha \in \mathbb{Q}$ první část platí s $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{Qq}$, druhá část neplatí – cvičení.

Před důkazem připomeňme, že $\{\beta\} := \beta - \lfloor \beta \rfloor$ značí necelou část čísla β .

Důkaz. a) Rozdělme interval $[0, 1]$ na Q podintervalů s koncovými body

$$0 = \frac{0}{Q}, \frac{1}{Q}, \frac{2}{Q}, \dots, \frac{Q-1}{Q}, 1 = \frac{Q}{Q}.$$

Vezměme reálná čísla $0, 1, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{(Q-1)\alpha\} \in [0, 1]$.

Každé z těchto čísel je tvaru $a\alpha - b$ pro nějaká $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \leq a < Q$, protože $\{j\alpha\} = j\alpha - \lfloor j\alpha \rfloor$.

Máme $Q+1$ čísel v Q intervalech $\left[\frac{i}{Q}, \frac{i+1}{Q}\right]$, takže aspoň dvě čísla leží v jednom intervalu.

Zřejmě to není dvojice $0, 1$, tedy býmo ať to je $a\alpha - b, c\alpha - d$, kde $0 \leq a < c < Q$. Pak máme $|(c-a)\alpha - (d-b)| = |(c\alpha - d) - (a\alpha - b)| \leq \frac{1}{Q}$.

Tedy pro $p := d - b, q := c - a$ máme

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{1}{q} \cdot |(c-a)\alpha - (d-b)| \leq \frac{1}{Qq}.$$

Z faktu, že α je iracionální, na závěr plyne, že rovnost nenastane.

b) Pokud je $\frac{p}{q}$ podle části a) (pro nějaké Q), pak

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Qq} < \frac{1}{q^2}. \quad (*)$$

Zároveň každý zlomek $\frac{p}{q}$ splňuje nerovnost $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Qq}$ jen pro konečně mnoho hodnot Q , protože levá strana této nerovnosti je reálné číslo > 0 a její pravá strana jde k 0 pro $Q \rightarrow \infty$.

Q ale můžeme v části a) volit libovolně velké, takže musí existovat nekonečně mnoho různých zlomků $\frac{p}{q}$ splňujících (*). \square

2.3 Existence řešení Pellovy rovnice

Věta 2.3. Bud' $m \in \mathbb{N}$ takové, že $m \neq d^2$ pro všechna $d \in \mathbb{N}$. Pak má Pellova rovnice $x^2 - my^2 = 1$ netriviální řešení v \mathbb{Z} .

Důkaz. Podle Dirichletovy věty 2.2b) existuje nekonečně mnoho zlomků $\frac{p}{q}$ takových, že $|p - q\sqrt{m}| < \frac{1}{q}$ a p, q jsou nesoudělná. Pak

$$|p^2 - mq^2| = |p - q\sqrt{m}| \cdot |p - q\sqrt{m} + 2q\sqrt{m}| < \frac{1}{q} \cdot \left(\frac{1}{q} + 2q\sqrt{m} \right) \leq 1 + 2\sqrt{m}.$$

Proto v intervalu $(-1 - 2\sqrt{m}, 1 + 2\sqrt{m})$ existuje celé číslo k takové, že $p^2 - mq^2 = k$ platí pro nekonečně mnoho dvojic (p, q) . Zároveň je \sqrt{m} iracionální, takže $k \neq 0$.

Navíc můžeme rozdělit (p, q) podle jejich hodnot mod k : Máme k^2 možných dvojic $(p \pmod k, q \pmod k)$, a tedy aspoň jedna z nich nastane pro nekonečně mnoho zlomků $\frac{p}{q}$. Existují tedy $(p_1, q_1) \neq (p_2, q_2)$ takové, že

$$p_1^2 - mq_1^2 = k, \quad p_2^2 - mq_2^2 = k, \quad p_1 \equiv p_2 \pmod k, \quad q_1 \equiv q_2 \pmod k.$$

Pak

$$\begin{aligned} k^2 &= (p_1^2 - mq_1^2)(p_2^2 - mq_2^2) = [(p_1 + q_1\sqrt{m})(p_2 - q_2\sqrt{m})] [(p_1 - q_1\sqrt{m})(p_2 + q_2\sqrt{m})] \\ &= (A + B\sqrt{m})(A - B\sqrt{m}) = A^2 - B^2m, \end{aligned}$$

kde $A := p_1p_2 - q_1q_2m$, $B := q_1p_2 - p_1q_2$.

Navíc $A \equiv p_1^2 - q_1^2m \equiv k \equiv 0 \pmod{k}$, $B \equiv q_1p_1 - p_1q_1 \equiv 0 \pmod{k}$.

Bud' $X := \frac{A}{k}$, $Y := \frac{B}{k}$. Máme $Y \neq 0$ (cvičení: proč?) a platí $k^2 = A^2 - B^2m = k^2 \cdot (X^2 - Y^2m)$, a tedy $X^2 - Y^2m = 1$. Tedy (X, Y) je hledané netriviální řešení. \square

Poznámka. Věta neříká, jak minimální řešení najít. K tomu použijeme řetězové zlomky – viz větu 2.15 níže.

2.4 Řetězové zlomky a polynomy

Ze cvičení víme, že řetězový zlomek je $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}} =: [a_0, a_1, a_2, \dots]$. Teď tototo formalizujeme a dokážeme si řadu poměrně silných vlastností.

Definice. Bud' $\xi \in \mathbb{R}$. Definujme posloupnost celých čísel a_i takto:

$$\xi_0 := \xi, a_i := \lfloor \xi_i \rfloor, \xi_{i+1} := \frac{1}{\xi_i - a_i} \text{ pokud } \xi_i \neq a_i.$$

Vznikne konečná posloupnost a_0, a_1, \dots, a_k nebo nekonečná posloupnost a_0, a_1, \dots , jež se nazývá řetězový zlomek čísla $\xi \in \mathbb{R}$ a značí $\xi = [a_0, a_1, \dots, a_k]$ nebo $\xi = [a_0, a_1, \dots]$.

Poznámka. Zatím jde o čistě formální zápis, obzvlášt v případě nekonečného řetězového zlomku.

Máme $a_0 \in \mathbb{Z}$ a $a_i \in \mathbb{N}$ pro $i \geq 1$.

Tvrzení 2.4. Číslo ξ je racionální, právě když ξ má konečný řetězový zlomek $[a_0, \dots, a_k]$.

Důkaz. „ \Rightarrow “ At' $\xi = \frac{p}{q}$. Uvažujme Eukleidův algoritmus:

$$\begin{aligned} p &= a_0q + r_1 \\ q &= a_1r_1 + r_2 \\ r_1 &= a_2r_2 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{k-1} &= a_kr_k + 0. \end{aligned}$$

Pak $\frac{p}{q} = \xi = [a_0, \dots, a_k]$ a $\xi_i = \frac{r_{i-1}}{r_i}$.

„ \Leftarrow “ Máme-li konečný řetězový zlomek $[a_0, \dots, a_k]$, pak $\xi = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_k}}}$ (což se dokáže například indukcí). \square

Máme $a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0a_1+1}{a_1}$, $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}} = a_0 + \frac{a_2}{a_1a_2+1} = \frac{a_0a_1a_2+a_0+a_2}{a_1a_2+1}$. Pojd'me se na čitatele a jmenovatele dívat jako na polynomy v proměnných a_i .

Definice. *n-tý řetězový (kontinuální) polynom v proměnných x_1, \dots, x_n je definován rekurentně: $K_{-1} := 0, K_0 := 1$,*

$$K_n(x_1, \dots, x_n) := x_n \cdot K_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) + K_{n-2}(x_1, \dots, x_{n-2}) \text{ pro } n \geq 1.$$

Za chvíli si dokážeme, že řetězové polynomy opravdu dávají čitatele i jmenovatele konečného řetězového zlomku:

Tvrzení 2.5. *Pro $a_0 \in \mathbb{R}, a_i \in \mathbb{R}^+$ máme*

$$[a_0, a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}} = \frac{K_{n+1}(a_0, \dots, a_n)}{K_n(a_1, \dots, a_n)}.$$

Pro řetězové polynomy platí řada užitečných, byť trochu technických, identit. Klíčová je část a), z níž potom zbytek poměrně snadno vyplývá. Zejména e) si není potřeba pamatovat.

Tvrzení 2.6. *Pokud není níže uvedeno jinak, bud' $n \geq 1$. Pak:*

a)

$$\begin{pmatrix} K_n(x_1, \dots, x_n) & K_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) \\ K_{n-1}(x_2, \dots, x_n) & K_{n-2}(x_2, \dots, x_{n-1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} x_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = M_{x_1} \cdots M_{x_n},$$

$$\text{kde } M_a = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$b) K_n(x_1, \dots, x_n) = (1 \ 0) M_{x_1} \cdots M_{x_n} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$c) K_n(x_1, \dots, x_n) = K_n(x_n, \dots, x_1), \text{ což platí pro } n \geq -1.$$

d)

$$K_n(x_1, \dots, x_n) K_{n-2}(x_2, \dots, x_{n-1}) - K_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) K_{n-1}(x_2, \dots, x_n) = (-1)^n.$$

e) Pro $n \geq 2, 1 \leq l \leq n-1$ platí

$$K_n(x_1, \dots, x_n) = K_l(x_1, \dots, x_l) K_{n-l}(x_{l+1}, \dots, x_n) + K_{l-1}(x_1, \dots, x_{l-1}) K_{n-l-1}(x_{l+2}, \dots, x_n).$$

Důkaz. a) Indukcí:

$n = 1 : K_1(x_1) = x_1 K_0 + K_{-1} = x_1$. Tedy levá strana se rovná $\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, což odpovídá pravé straně.

$n+1 \geq 2 :$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} K_n(x_1, \dots, x_n) & K_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) \\ K_{n-1}(x_2, \dots, x_n) & K_{n-2}(x_2, \dots, x_{n-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_{n+1} K_n(x_1, \dots, x_n) + K_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) & K_n(x_1, \dots, x_n) \\ x_{n+1} K_{n-1}(x_2, \dots, x_n) + K_{n-2}(x_2, \dots, x_{n-1}) & K_{n-1}(x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} K_{n+1}(x_1, \dots, x_{n+1}) & K_n(x_1, \dots, x_n) \\ K_n(x_2, \dots, x_{n+1}) & K_{n-1}(x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

b) Zřejmě z a).

c) Transponováním matice 1×1 jako první rovnost dostaneme

$$\begin{aligned} (K_n(x_1, \dots, x_n)) &= (K_n(x_1, \dots, x_n))^T = \left[(1 \ 0) M_{x_1} \cdots M_{x_n} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]^T \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^T M_{x_n}^T \cdots M_{x_1}^T (1 \ 0)^T = (1 \ 0) M_{x_n} \cdots M_{x_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (K_n(x_n, \dots, x_1)). \end{aligned}$$

d) Vezmeme determinant obou stran rovnosti a).

e) Platí $M_{x_l} M_{x_{l+1}} = M_{x_l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) M_{x_{l+1}} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0)$. Tohle dosadíme dovnitř pravé strany rovnosti b). \square

Důkaz tvrzení 2.5. Indukcí:

$$\text{LS} = a_0 + \frac{1}{\frac{K_n(a_1, \dots, a_n)}{K_{n-1}(a_2, \dots, a_n)}} = \frac{a_0 K_n(a_1, \dots, a_n) + K_{n-1}(a_2, \dots, a_n)}{K_n(a_1, \dots, a_n)}.$$

Potřebujeme tedy dokázat, že $K_{n+1}(a_0, \dots, a_n) = a_0 K_n(a_1, \dots, a_n) + K_{n-1}(a_2, \dots, a_n)$. K tomu použijeme tvrzení 2.6c):

$$\begin{aligned} a_0 K_n(a_1, \dots, a_n) + K_{n-1}(a_2, \dots, a_n) &\stackrel{2.6c)}{=} a_0 K_n(a_n, \dots, a_1) + K_{n-1}(a_n, \dots, a_2) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} K_{n+1}(a_n, \dots, a_0) \stackrel{2.6c)}{=} K_{n+1}(a_0, \dots, a_n). \quad \square \end{aligned}$$

2.5 Sblížené zlomky

Chceme approximovat $\xi = [a_0, a_1, \dots]$ pomocí $[a_0, \dots, a_n]$: ty approximují dobře (ve smyslu věty 2.2b)), čehož využijeme k formalizaci nekonečného zlomku $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}}$. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že $\xi > 0$ (to ovlivní jenom a_0).

Definice. Bud' $\xi > 0$ a $[a_0, a_1, \dots, a_k]$ (respektive $[a_0, a_1, \dots]$) jeho konečný (respektive nekonečný) řetězový zlomek. Pro $n \geq -1$ bud'

$$p_{-1} := 1, q_{-1} := 0, p_n := K_{n+1}(a_0, \dots, a_n), q_n := K_n(a_1, \dots, a_n).$$

Zlomek $\frac{p_n}{q_n}$ (pro $n \geq 0$) nazýváme n -tý sblížený zlomek (nebo také konvergent) čísla ξ .

Platí následující rekurence pro p_n, q_n , kde $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} p_{-1} &= 1, p_0 = a_0, p_{n+1} = a_{n+1} p_n + p_{n-1}; \\ q_{-1} &= 0, q_0 = 1, q_{n+1} = a_{n+1} q_n + q_{n-1}. \end{aligned}$$

Posloupnosti $\{p_n\}_{n \geq 0}$ a $\{q_n\}_{n \geq 1}$ jsou ostře rostoucí, protože $a_0 \geq 0, a_i > 0$.

Samozřejmě pokud $\xi \in \mathbb{Q}$, máme vše definované jen do p_k, q_k a $\frac{p_k}{q_k} = \xi$. V tomto případě je třeba příslušně omezit n v následujících tvrzeních. Jelikož se jedná o snadné úpravy, nebudeme je zde uvádět explicitně.

Všimněme si také, že definice p_n, q_n dává smysl i pro posloupnost a_0, a_1, \dots , která nemusí být nutně řetězovým zlomkem nějakého čísla.

Tvrzení 2.7. $p_{n-1} q_n - p_n q_{n-1} = (-1)^n$ pro $n \geq 0$.

Důkaz. Plyne ihned z tvrzení 2.6d): Místo n vezmeme $n+1$ a dosadíme $x_1 = a_0, x_2 = a_1, \dots, x_{n+1} = a_n$. Dostaneme

$$\begin{aligned} p_{n-1}q_n - p_nq_{n-1} \\ = K_n(a_0, \dots, a_{n-1})K_n(a_1, \dots, a_n) - K_{n+1}(a_0, \dots, a_n)K_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) = (-1)^n. \end{aligned}$$

□

Tvrzení 2.8. Bud' $\xi > 0$ a ξ_i jako v definici řetězového zlomku, tedy

$$\xi_0 = \xi, a_i = \lfloor \xi_i \rfloor, \xi_{i+1} = \frac{1}{\xi_i - a_i} \text{ pro } \xi_i \neq a_i.$$

Pak

$$\xi = \frac{\xi_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\xi_{n+1}q_n + q_{n-1}}, \text{ kde } \frac{p_n}{q_n} \text{ jsou sblížené zlomky ke } \xi.$$

Důkaz. Máme

$$\begin{aligned} \xi = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{\xi_{n+1}}}}} &\stackrel{2.5}{=} \frac{K_{n+2}(a_0, \dots, a_n, \xi_{n+1})}{K_{n+1}(a_1, \dots, a_n, \xi_{n+1})} \\ &\stackrel{\text{definice } K_i}{=} \frac{\xi_{n+1}K_{n+1}(a_0, \dots, a_n) + K_n(a_0, \dots, a_{n-1})}{\xi_{n+1}K_n(a_1, \dots, a_n) + K_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})} = \frac{\xi_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\xi_{n+1}q_n + q_{n-1}}. \end{aligned} \quad \square$$

Věta 2.9. Bud' $\xi > 0$. Pak:

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} = \xi,$$

a tedy posloupnost sblížených zlomků konverguje ke ξ .

b)

$$\frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \xi < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} \text{ pro } n \geq 0.$$

c)

$$\frac{1}{q_n q_{n+2}} < \left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} \left(< \frac{1}{q_n^2} \right).$$

d)

$$\cdots < |p_{n+1} - q_{n+1}\xi| < \frac{1}{q_{n+2}} < |p_n - q_n\xi| < \frac{1}{q_{n+1}} < \cdots$$

(tedy vzdálenosti $q_n\xi$ od nejbližšího celého čísla, typicky p_n , se zmenšují).

Část a) nám dává způsob, jak precizovat definici nekonečného řetězového zlomku jako reálného čísla, a sice jako

$$[a_0, a_1, \dots] := \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0, a_1, \dots, a_n].$$

Ted' také vidíme, že každá posloupnost $a_0 \in \mathbb{Z}, a_1, a_2, \dots \in \mathbb{N}$ je řetězovým zlomkem nějakého reálného čísla, a sice čísla $\xi = [a_0, a_1, \dots] := \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0, a_1, \dots, a_n]$ (cvičení: napřed dokažte existenci limity pomocí Cauchyovskosti a pak to, že $a_0 = \lfloor \lim \dots \rfloor$, a podobně pro další koeficienty a_i). Toto vůbec nebylo jasné z původní definice v sekci 2.4! Řetězové zlomky nám tedy dívají bijekci mezi reálnými čísly ξ a posloupnostmi a_i .

V tvrzení je potřeba si dát pozor, kde zastavit pro racionální ξ .

Důkaz. Pro důkaz předpokládejme, že ξ je iracionální. Máme

$$\xi - \frac{p_n}{q_n} \stackrel{2.8}{=} \frac{\xi_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\xi_{n+1}q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n-1}q_n - p_nq_{n-1}}{q_n(\xi_{n+1}q_n + q_{n-1})} \stackrel{2.7}{=} \frac{(-1)^n}{q_n(\xi_{n+1}q_n + q_{n-1})}.$$

Číslo na pravé straně je kladné, resp. záporné podle parity n , a tedy platí b).

Protože $a_{n+1} = \lfloor \xi_{n+1} \rfloor < \xi_{n+1}$, máme

$$\left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n(\xi_{n+1}q_n + q_{n-1})} < \frac{1}{q_n(a_{n+1}q_n + q_{n-1})} = \frac{1}{q_nq_{n+1}},$$

kde jsme v poslední rovnosti využili rekurenci pro q_{n+1} . To dokazuje a) (protože pravá strana jde k 0) a horní odhad v c).

Použitím $1 + a_{n+1} > \xi_{n+1}$ podobně dostaneme dolní odhad v c):

$$\left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| > \frac{1}{q_n((1 + a_{n+1})q_n + q_{n-1})} = \frac{1}{q_n(q_{n+1} + q_n)} \geq \frac{1}{q_n(a_{n+2}q_{n+1} + q_n)} = \frac{1}{q_nq_{n+2}}.$$

Konečně d) plyne ihned z c) vynásobením q_n . □

Z části c) vidíme, že sblížené zlomky nám dávají approximace s malou chybou ve smyslu Dirichletovy věty 2.2b) (což v podstatě dává její další důkaz).

2.6 Dobré approximace

Definice. Bud' $\xi \in \mathbb{R}$. Zlomek $\frac{r}{s}$, kde $(r, s) = 1$ a $s > 0$, je *dobrá approximace* čísla ξ , pokud

pro každé $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, kde $1 \leq q < s$, platí $|r - s\xi| < |p - q\xi|$

a

$$|r - s\xi| \leq |p - q\xi| \text{ platí pro všechna } p \in \mathbb{Z}.$$

V definici jde tedy o to, že $\frac{r}{s}$ má nejmenší „relativní chybu“

$$\frac{\left| \frac{r}{s} - \xi \right|}{\frac{1}{s}} = |r - s\xi|.$$

Postupně teď dokážeme, že sblížené zlomky pro $\xi > 0$ dávají všechny jeho dobré approximace:

Věta 2.10. Bud' $\xi > 0$, $\{\xi\} \neq 0, \frac{1}{2}$. Pak jeho sblížené zlomky

$$\frac{p_n}{q_n}, \text{ kde } \begin{cases} n \geq 0, & \text{pokud } 0 < \{\xi\} < \frac{1}{2}, \\ n \geq 1, & \text{pokud } \frac{1}{2} < \{\xi\} < 1, \end{cases}$$

dávají právě všechny dobré approximace čísla ξ .

Případy, kdy $\{\xi\} = 0, \frac{1}{2}$, stejně jako dobré approximace se jmenovatelem 1, bude třeba vyřešit samostatně, to je ale jednoduché přímo z definice dobré approximace.

- Cvičení.* a) Určete všechny dobré approximace čísla ξ , pokud $\{\xi\} = 0, \frac{1}{2}$.
 b) Určete všechny dobré approximace tvaru $\frac{p}{1}$ čísla ξ .

Lemma 2.11. *Bud' $\xi > 0$. Ať $q > 1$, $\frac{p}{q}$ není sbližený zlomek ξ a bud' $n \geq 1$ index takový, že $q_{n-1} < q \leq q_n$. Pak*

$$|q\xi - p| \geq |q_n\xi - p_n| + |q_{n-1}\xi - p_{n-1}|.$$

(Je-li $\xi \in \mathbb{Q}$ a q dostatečně velké, pak takové n neexistuje.)

Důkaz. Myšlenka: vyjádříme p, q pomocí p_i, q_i a odhadneme.

Uvažujme proto soustavu rovnic

$$xp_{n-1} + yp_n = p, \quad xq_{n-1} + yq_n = q.$$

Tvrzení 2.7 dává, že determinant soustavy je $(-1)^n$, proto má soustava řešení v \mathbb{Z} . Díky Cramérovu pravidlu je tímto řešením

$$x = (-1)^n(pq_n - qp_n), \quad y = (-1)^{n-1}(pq_{n-1} - qp_{n-1}).$$

Protože $\frac{p}{q} \neq \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}$, máme $x \neq 0 \neq y$. Navíc x, y mají různé znaménka díky rovnici $xq_{n-1} + yq_n = q$, protože platí $1 \leq q_{n-1} < q \leq q_n$ a $x, y \in \mathbb{Z}$.

Už můžeme odhadnout:

$$\begin{aligned} |p - q\xi| &= |xp_{n-1} + yp_n - (xq_{n-1} + yq_n)\xi| = |x(p_{n-1} - q_{n-1}\xi) + y(p_n - q_n\xi)| \\ &= |x| \cdot |p_{n-1} - q_{n-1}\xi| + |y| \cdot |p_n - q_n\xi| \geq |p_{n-1} - q_{n-1}\xi| + |p_n - q_n\xi|, \end{aligned}$$

kde třetí rovnost platí, protože výrazy v závorkách mají opačná znaménka podle věty 2.9b), takže po vynásobení x, y mají znaménka stejná. \square

Důkaz věty 2.10. Dobré approximace se jmenovatelem 1 je potřeba vyřešit samostatně (což bude odpovídatmezím $n \geq 0$, resp. $n \geq 1$ ze znění věty).

Dále budeme uvažovat jen zlomky se jmenovatelem ≥ 2 , pro které můžeme používat lemma 2.11 (protože jmenovatele můžeme umístit mezi dva sousední členy posloupnosti $q_0 = 1 < q_1 < q_2 < \dots$).

Bud' $\frac{p_n}{q_n}$ sbližený zlomek. Proč jde o dobrou approximaci?

Mějme $\frac{p}{q}$ se jmenovatelem $q_m < q \leq q_{m+1} \leq q_n$. Rozlišíme dva případy:

- a) $\frac{p}{q}$ není sbližený zlomek. Pak

$$|q\xi - p| \stackrel{2.11}{>} |q_{m+1}\xi - p_{m+1}| \stackrel{2.9d}{\geq} |q_n\xi - p_n|,$$

tedy $\frac{p}{q}$ není lepší approximace než $\frac{p_n}{q_n}$.

b) $\frac{p}{q} = \frac{p_{m+1}}{q_{m+1}}$ je sbližený zlomek. Pak to není lepší approximace opět podle věty 2.9d).

Bud' naopak $\frac{r}{s}$ dobrá approximace ξ . Berme n takové, že $q_{n-1} < s \leq q_n$ (pokud $\xi \in \mathbb{Q}, \xi = [a_0, \dots, a_k]$ a $s > q_k$, pak se určitě nejedná o dobrou approximaci, protože $\frac{p_k}{q_k}$ má chybu 0). Pokud $\frac{r}{s} \neq \frac{p_n}{q_n}$, pak můžeme použít lemma 2.11:

$$|s\xi - r| \geq |q_n\xi - p_n| + |q_{n-1}\xi - p_{n-1}| \geq |q_{n-1}\xi - p_{n-1}|,$$

což je spor s tím, že $\frac{r}{s}$ je dobrá approximace. Tedy $\frac{r}{s} = \frac{p_n}{q_n}$. \square

Ve větě 2.9c) jsme viděli, že sblížené zlomky dávají approximace s malou chybou $\left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n^2}$. Platí i částečný opak: pokud má approximace malou chybu, pak musí jít o sblížený zlomek:

Tvrzení 2.12. *Bud' $\xi > 0$ iracionální. Je-li $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ takové, že*

$$\left| \xi - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}, \text{ pak } \frac{p}{q} = \frac{p_n}{q_n} \text{ pro nějaké } n.$$

Důkaz. Pro spor at' $\frac{p}{q}$ není sblížený zlomek a bud' n takové, že $q_{n-1} < q \leq q_n$ (případ $q = 1$ je opět potřeba ošetřit samostatně).

Lemma 2.11 dává, že $|p_{n-1} - q_{n-1}\xi| < |p - q\xi| < \frac{1}{2q}$. Pak

$$\frac{1}{qq_{n-1}} \leq \frac{\text{něco}}{qq_{n-1}} = \left| \frac{p}{q} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right| \stackrel{\Delta-\text{ner.}}{\leq} \left| \frac{p}{q} - \xi \right| + \left| \xi - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right| < \frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2qq_{n-1}}.$$

Odtud úpravou dostaváme $q < q_{n-1}$, spor. \square

Ještě poznamenejme, že vždy aspoň jeden ze dvou sousedních sblížených zlomků $\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}$ splňuje $\left| \xi - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$.

2.7 Periodické řetězové zlomky

Věta 2.13. *Ať je ξ iracionální. Jeho řetězový zlomek $\xi = [a_0, a_1, \dots]$ je od jistého místa periodický, právě když je ξ algebraické číslo stupně 2 (čili iracionální kořen nějakého kvadratického polynomu s celočíselnými koeficienty).*

Důkaz. „ \Rightarrow “ Ať $\xi = [a_0, \dots, a_{k-1}, \overline{a_k, \dots, a_{k+l-1}}]$.

Máme $\xi = [a_0, \dots, a_{k-1}, \xi_k]$, kde $\xi_k = [\overline{a_k, \dots, a_{k+l-1}}]$. Číslo ξ_k má čistě periodický řetězový zlomek, neboli platí $\xi_{k+l} = \xi_k$. Použijeme tvrzení 2.8 pro ξ_k místo ξ a $n = l - 1$. Pak $\xi_k = \xi_{k+l}$ odpovídá ξ_{n+1} z tvrzení, a tedy

$$\xi_k \stackrel{2.8}{=} \frac{\xi_{k+l}p_n + p_{n-1}}{\xi_{k+l}q_n + q_{n-1}} = \frac{\xi_k p_n + p_{n-1}}{\xi_k q_n + q_{n-1}},$$

kde $\frac{p_i}{q_i}$ jsou sblížené zlomky pro ξ_k .

Vynásobením jmenovatelem pravé strany vidíme, že ξ_k je kořen kvadratického polynomu s celočíselnými koeficienty.

Dále opět použijeme tvrzení 2.8, které nám dává vyjádření čísla ξ pomocí ξ_k . Úpravou tohoto vzorce dostaneme

$$\xi_k = \frac{a\xi + b}{c\xi + d}$$

pro vhodná celá čísla a, b, c, d . Dosazením tohoto vyjádření do kvadratického polynomu pro ξ_k dostaneme hledaný kvadratický polynom pro ξ .

„ \Leftarrow “ Jenom naznačíme myšlenku:

Ať ξ splňuje $a\xi^2 + b\xi + c = 0$ pro nějaká $a, b, c \in \mathbb{Z}, a \neq 0$.

Dosadíme sem vztah z tvrzení 2.8, což se upraví na kvadratickou rovnici $A_n\xi_{n+1}^2 + B_n\xi_{n+1} + C_n = 0$, kde $A_n, B_n, C_n \in \mathbb{Z}$ vyjádříme pomocí a, b, c, p_i, q_i (například $A_n = C_{n+1} = ap_n^2 + bp_nq_n + cq_n^2$).

Pak se dokáže, že existuje $K \in \mathbb{N}$ takové, že $-K < A_n, B_n, C_n < K$ pro všechna n .

Ted' můžeme použít oblíbený trik z důkazu věty 2.3: máme nekonečně mnoho trojic (A_n, B_n, C_n) , ale jen konečně možných hodnot pro ně. Odtud plyne, že existuje trojice $(A, B, C) \in \mathbb{Z}^3$ taková, že $(A, B, C) = (A_n, B_n, C_n)$ pro aspoň tři různá $n = n_1, n_2, n_3$.

Tedy $\xi_{n_1+1}, \xi_{n_2+1}, \xi_{n_3+1}$ splňují stejnou kvadratickou rovnici $Ax^2 + Bx + C = 0$. Tedy aspoň dvě z nich se rovnají, búno $\xi_{n_1+1} = \xi_{n_2+1}$. Pak řetězový zlomek pro ξ je periodický s periodou $|n_1 - n_2|$.

Detaily jsou např. v článku Martina Kuděje

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kala/1920%20tc/kudej.pdf>

(ve kterém si toho můžete celkově přečíst o řetězových zlomcích víc). \square

2.8 Zpět k Pellově rovnici

Věta 2.14. *At' dvojice $p, q \in \mathbb{N}$, $(p, q) = 1$, je řešením rovnice $x^2 - my^2 = B$, kde $m \in \mathbb{N}$, m není čtverec a $B \in \mathbb{Z}$, $|B| < \sqrt{m}$. Pak $\frac{p}{q}$ je sblížený zlomek čísla \sqrt{m} .*

Poznámka. Speciálně věta funguje pro $B = 1$, takže netriviální řešení vznikne ze sblíženého zlomku.

Důkaz. Rozlišíme dva případy podle znaménka čísla B (pro $B = 0$ rovnice zřejmě žádné řešení nemá):

a) $0 < B < \sqrt{m}$. Pak

$$\left(\frac{p}{q} + \sqrt{m}\right) \left(\frac{p}{q} - \sqrt{m}\right) = \frac{p^2}{q^2} - m = \frac{B}{q^2} > 0,$$

a tedy

$$0 < \frac{p}{q} - \sqrt{m} = \frac{B}{q^2 \cdot \left(\frac{p}{q} + \sqrt{m}\right)} \stackrel{\frac{p}{q} > \sqrt{m}}{<} \frac{\sqrt{m}}{q^2 \cdot 2\sqrt{m}} = \frac{1}{2q^2}.$$

Tedy $\frac{p}{q}$ je sblížený zlomek podle tvrzení 2.12.

b) $-\sqrt{m} < B < 0$. Pak $q^2 - \frac{1}{m}p^2 = -\frac{B}{m} > 0$. Jako v předchozím bodě pak dokážeme, že $\frac{p}{q}$ je sblížený zlomek pro $\frac{1}{\sqrt{m}}$. Ale $\frac{1}{\sqrt{m}} = [0, a_0, a_1, \dots]$, kde $\sqrt{m} = [a_0, a_1, \dots]$. Tudíž $\frac{p}{q}$ je sblížený zlomek pro \sqrt{m} . \square

Pro Pellovou rovnici $x^2 - my^2 = \pm 1$ větu ještě můžeme výrazně zlepšit, což ale nebudeme dokazovat:

Věta 2.15. *At' $m \in \mathbb{N}$, m není čtverec přirozeného čísla.*

Pak existuje nejmenší $\ell \in \mathbb{N}$ takové, že $\sqrt{m} = [a_0, \overline{a_1, \dots, a_{\ell-1}, 2a_0}]$, kde $a_i = a_{\ell-i} < 2a_0$ pro $i = 1, \dots, \ell - 1$.

Je-li ℓ sudé, pak $x^2 - my^2 = -1$ nemá řešení v \mathbb{Z} a minimální řešení rovnice $x^2 - my^2 = 1$ je $(p_{\ell-1}, q_{\ell-1})$.

Naopak, je-li ℓ liché, pak minimální řešení $x^2 - my^2 = -1$ je $(p_{\ell-1}, q_{\ell-1})$ a minimální řešení $x^2 - my^2 = 1$ je $(p_{2\ell-1}, q_{2\ell-1})$.

Konečně poznamenejme, že až na přenásobení minimálním řešením ve větě 2.14 platí, že $\frac{p}{q} = \frac{p_n}{q_n}$ pro $0 \leq n \leq 2\ell - 1$ (stačí tedy uvažovat jen těchto prvních 2ℓ sblížených zlomků).

3. Odmocniny z jedné

Zásadní roli v teorii čísel hrají komplexní odmocniny z jedné.

Definice. Komplexní číslo $z \in \mathbb{C}$ je *n-tá odmocnina z jedné*, pokud $z^n = 1$ pro nějaké přirozené číslo n .

Komplexní číslo $z \in \mathbb{C}$ je *primitivní n-tá odmocnina z jedné*, pokud $z^n = 1$ a navíc $z^m \neq 1$ pro žádné $1 \leq m < n$.

Pomocí komplexní exponenciály je můžeme snadno vyjádřit. Všimněme si totiž, že

$$\zeta_n := e^{\frac{2\pi i}{n}} = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

je primitivní n -tá odmocnina z 1.

Cvičení. α je primitivní n -tá odmocnina z 1 $\Leftrightarrow \alpha = \zeta_n^a$ pro nějaké $(a, n) = 1$.

3.1 Gaussovská celá čísla

Speciálně máme $\zeta_4 = i = \sqrt{-1}$.

Trochu obecněji, bud' $D \neq 0, 1$ bezčtvercové (klidně záporné). Na řešení diofantických rovnic se hodí pracovat v $\mathbb{Z}[\sqrt{D}] = \{a + b\sqrt{D} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ (respektive někdy v $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{D}}{2}]$).

Pro malé D se jedná o eukleidovský obor (norma $|N(a + b\sqrt{D})| = |a^2 - Db^2|$ je eukleidovská).

Příklad. $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ je eukleidovské pro $D = -2, -1, 2, 3$ (a pro řadu dalších kladných D , kde ovšem často musíme volit jinou normu).

$\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{D}}{2}]$ je eukleidovské pro $D = -3, 5$ (a další kladná D).

Důvod, proč někdy uvažujeme $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{D}}{2}]$ je ten, že chceme brát všechny „celistvé prvky“ v tělese $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$, čili prvky, jež mají monický minimální polynom s celočíselnými koeficienty.

Případ $D = -1$, to jest $\mathbb{Z}[i]$, nazýváme *gaussovská celá čísla*.

Jejich základní vlastnosti a pojmy:

- Příslušnou normou je $N(a + bi) = a^2 + b^2$.
- Konjugace: $\overline{a + bi} = a - bi$.
- Pro normu platí $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$.

- α dělí β , $\alpha \mid \beta$, pokud $\beta = \alpha\gamma$ pro nějaké γ .
- Jednotky (neboli invertibilní prvky) jsou $\pm 1, \pm i$
- α je invertibilní $\Leftrightarrow N(\alpha) = 1$.
- prvky α, β jsou asociované, $\alpha \parallel \beta$, pokud $\alpha = \varepsilon\beta$ pro nějakou jednotku ε .
- Eukleidovský \Rightarrow gaussovský, čili máme jednoznačné rozklady na součin prvočinitelů.

Zdůrazněme, že formálně vzato je potřeba rozlišovat mezi dělitelností v \mathbb{Z} a dělitelností v $\mathbb{Z}[i]$. Pro oboje ale používáme stejné značení, takže je dobré si rozmyslet, co se daným značením vždy myslí. Zároveň ale naštěstí platí:

Cvičení. Atž $a, b \in \mathbb{Z}$. Pak a dělí b v \mathbb{Z} , právě když a dělí b v $\mathbb{Z}[i]$.

Ale pozor! Platnost tohoto cvičení vůbec není samozřejmá!

Cvičení. Najdi příklad okruhu $R \supset \mathbb{Z}$ takového, že pro některá $a, b \in \mathbb{Z}$ platí: a dělí b v R , ale a nedělí b v \mathbb{Z} .

Jak vypadají prvočinitele v $\mathbb{Z}[i]$?

Lemma 3.1. Bud' $p \in \mathbb{Z}$ prvočíslo.

Pokud p nejde vyjádřit jako $a^2 + b^2$ (pro $a, b \in \mathbb{Z}$), pak je p prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$.

Pokud $p = a^2 + b^2$, pak jsou prvočinitele $a \pm bi$ (a také jejich násobky jednotkami).

Všechny prvočinitele v $\mathbb{Z}[i]$ jsou jednoho z těchto dvou tvarů.

Příklad.

- $2 = 1^2 + 1^2 \Rightarrow 1 + i$ je prvočinitel. Všimněme si, že $2 = -i(1 + i)^2$.
- $3 \neq a^2 + b^2$.
- $5 = 2^2 + 1^2 \Rightarrow 2 \pm i$ jsou prvočinitele.

Důkaz. Je-li α prvočinitel, pak je také $\bar{\alpha}$ prvočinitel (protože $\alpha = \beta\gamma \Leftrightarrow \bar{\alpha} = \bar{\beta}\bar{\gamma}$).

Bud' nyní $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ prvočinitel, $\alpha = a + bi$. Máme $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$, což je rozklad na součin prvočinitelů. Pak máme dvě možnosti:

a) $N(\alpha) = p$ je prvočíslo v \mathbb{Z} . Pak $p = a^2 + b^2$.

b) $N(\alpha)$ není prvočíslo v \mathbb{Z} , tedy $N(\alpha) = uv$ pro celá čísla $u, v > 1$.

Tedy platí $uv = \alpha\bar{\alpha}$ a z jednoznačnosti rozkladu v $\mathbb{Z}[i]$ dostáváme býno $u \parallel \alpha, v \parallel \bar{\alpha}$ (protože $\alpha, \bar{\alpha}$ jsou prvočinitele a u, v nejsou invertibilní). To pak implikuje $v = \bar{v} \parallel \alpha \parallel u$.

Tedy $v = \pm u$ nebo $\pm iu$.

$v = \pm iu$ zřejmě nemůže nastat (protože u, v jsou celá, a tedy reálná, čísla), a protože $u, v > 1$, nemůže nastat ani $v = -u$. Tedy nutně $v = u$ a máme $N(\alpha) = u^2$.

u musí být nějaké prvočíslo p (jinak $u = yz$ a $y^2z^2 = \alpha\bar{\alpha}$, což by byl spor s jednoznačností rozkladů).

Dostali jsme tedy, že $N(\alpha) = p^2$ a $\alpha \parallel p$. Navíc kdyby $p = c^2 + d^2$, pak $\alpha \parallel (c + di)(c - di)$, což by byl spor s tím, že α je prvočinitel.

Tedy jsme dokázali: Pokud je α prvočinitel, pak

a) $\alpha = a + bi$ pro prvočíslo $p = a^2 + b^2 \in \mathbb{Z}$, nebo

b) $\alpha \parallel p$ pro prvočíslo $p \in \mathbb{Z}, p \neq c^2 + d^2$.

Naopak máme:

Cvičení. Atž $\beta \in \mathbb{Z}[i]$. Pokud $N(\beta) = p$ je prvočíslo v \mathbb{Z} , pak β je prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$.

Tedy pokud $p = a^2 + b^2$, pak $\alpha = a \pm bi$ má normu $N(\alpha) = p$, a tedy α je prvočinitel.

Konečně atž je p prvočíslo, $p \neq a^2 + b^2$, a pro spor atž p není prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$, čili $p = (c + di)(e + fi)$ je jeho rozklad na součin dvou neinvertibilních prvků.

Pak $p^2 = N(p) = N(c + di)N(e + fi)$, a tedy $N(c + di) = p$ (protože $N(e + fi) \neq 1$). To ale znamená, že $c^2 + d^2 = p$, což je spor. \square

Která prvočísla jdou vyjádřit jako součet dvou čtverců?

Věta 3.2. a) Prvočíslo $p \in \mathbb{N}$ jde vyjádřit jako $p = a^2 + b^2$, právě když $p = 2$ nebo $p \equiv 1 \pmod{4}$.

b) Všichni prvočiniteli v $\mathbb{Z}[i]$ jsou (až na přenásobení jednotkami):

- $p \in \mathbb{N}, p \equiv 3 \pmod{4}$,
- $a \pm bi$, kde $p = a^2 + b^2 \equiv 1 \pmod{4}$ pro $a, b \in \mathbb{N}$,
- $1 + i$

(kde $p \in \mathbb{N}$ je vždy prvočíslo).

Důkaz. Stačí dokázat první část a).

„ \Rightarrow “ Cvičení (použij, že $x^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$).

„ \Leftarrow “ Atž $p \equiv 1 \pmod{4}$. Wilsonova věta 3.3 říká, že $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$. Máme tedy

$$\begin{aligned} (p - 1)! &= 1 \cdot 2 \cdots \frac{p-1}{2} \cdot \left(p - \frac{p-1}{2}\right) \cdots (p-2) \cdot (p-1) \\ &\equiv 1 \cdot 2 \cdots \frac{p-1}{2} \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot \frac{p-1}{2} \cdots 2 \cdot 1 \stackrel{p \equiv 1 \pmod{4}}{=} \left(1 \cdot 2 \cdots \frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}. \end{aligned}$$

Tedy existuje $x = (\frac{p-1}{2})!$ takové, že $p \mid x^2 + 1 = (x+i)(x-i)$. Kdyby p byl prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$, pak $p \mid x \pm i$.

Ale $x \pm i = p(c + di) \Rightarrow \pm 1 = pd$, což je spor. Tedy p není prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$. Lemma 3.1 pak implikuje, že $p = a^2 + b^2$. \square

Zbývá tedy dokázat Wilsonovu větu:

Věta 3.3 (Wilsonova). Pro prvočíslo p platí $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Pro složené $n > 4$ platí $(n - 1)! \equiv 0 \pmod{n}$.

Důkaz. Dokážeme pouze první část pro liché prvočíslo p (pro $p = 2$ platí zřejmě), druhou necháme jako cvičení.

Polynom $x^{p-1} - 1$ nad tělesem \mathbb{Z}_p má kořeny $1, 2, \dots, p-1$, takže se rovná součinu příslušných kořenových činitelů

$$x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - (p-1)).$$

Porovnáním konstantních členů vidíme, že $(p-1)! = (-1)^{p-1}(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. \square

To byl ale zvláštní trik s Wilsonem! Naštěstí se dá nahradit kvadratickými zbytky: v tvrzení 4.16 například popíšeme, když $p = a^2 + 2b^2$, což charakterizuje prvočinitely v $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

3.2 Cyklotomické polynomy

Nyní budeme zkoumat ireducibilní rozklad polynomu $x^n - 1$, který má za kořeny n -té odmocniny z jedné. Příslušné ireducibilní faktory se nazývají cyklotomické polynomy a my jich využijeme k důkazu speciálního případu Dirichletovy věty, čili že pro každé přirozené číslo a existuje nekonečně mnoho prvočísel p tvaru $ax + 1$.

Zajímá nás ireducibilní rozklad polynomu $x^n - 1$.

Začněme nejjednodušším případem, kdy $n = p$ je prvočíslo. Máme $\zeta_p^p = 1$, tedy ζ_p je kořen $x^p - 1$. Dokonce $x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + \dots + 1)$, a tedy ζ_p je kořen polynomu $f(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$. Dokažme ted', že $f(x)$ je ireducibilní (což ještě obecněji uvidíme ve větě 3.9):

Lemma 3.4. $f(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$ je ireducibilní polynom.

Důkaz. Uvažujme substituci $x = y + 1$. Pak

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^p - 1}{x - 1} = \frac{(y + 1)^p - 1}{y} = \frac{y^p + \binom{p}{1}y^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-1}y}{y} \\ &= y^{p-1} + \binom{p}{1}y^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-2}y + \binom{p}{p-1}. \end{aligned}$$

Vidíme, že p dělí všechny koeficienty $\binom{p}{j}$ pro $j = 1, \dots, p-1$ a p^2 nedělí konstantní koeficient $\binom{p}{p-1}$. Takže jde o ireducibilní polynom podle Eisensteinova kritéria. \square

Definice. Bud' $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ primitivní n -tá odmocnina z 1.

n -tý cyklotomický (kruhový) polynom definujeme jako

$$t_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ (a,n)=1}} (x - \zeta_n^a),$$

kde násobíme přes všechna a , která jsou nesoudělná s n

Příklad. $t_1(x) = x - 1$, protože $\zeta_1 = 1$.

$t_2(x) = (x - \zeta_2^1) = x + 1$, protože $\zeta_2 = -1$.

$t_4(x)$: Máme $\zeta_4 = i$, a tedy

$$t_4(x) = (x - i^1)(x - i^3) = (x - i)(x + i) = x^2 + 1.$$

Je-li p prvočíslo, pak

$$t_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1},$$

což se dokáže ověřením, že polynomy nalevo i napravo mají stejný stupeň $p - 1$ a stejné kořeny.

Tvrzení 3.5.

a) $\deg(t_n) = \varphi(n)$.

b)

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} t_d(x),$$

kde násobíme přes všechna přirozená čísla d , která dělí n .

c) $t_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ a jeho konstantní člen $t_n(0) = \pm 1$.

Příklad. Části b) z tvrzení můžeme výhodně použít k tomu, abychom indukcí počítali cyklotomické polynomy:

Například známe-li už

$$t_1(x) = x - 1, t_2(x) = x + 1, t_3(x) = x^2 + x + 1,$$

pak víme, že

$$t_1 t_2 t_3 t_6 = x^6 - 1 = (x^3 - 1)(x^3 + 1),$$

přičemž $t_1 t_3 = x^3 - 1$, takže

$$t_2 t_6 = x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1),$$

čili konečně $t_6(x) = x^2 - x + 1$.

Důkaz. a) Zřejmě.

b) Každé ζ_n^a pro $1 \leq a \leq n$, je kořen $x^n - 1$, a tedy

$$x^n - 1 = \prod_{1 \leq a \leq n} (x - \zeta_n^a).$$

Rozdělíme si teď různé hodnoty a v součinu podle jejich největšího společného dělitele s n . Pro a bud' $d := (a, n)$, takže máme $a = d \cdot b$, kde $(b, \frac{n}{d}) = 1$ (cvičení).

Máme pak

$$\zeta_n^a = \zeta_n^{db} = e^{2\pi i \frac{b}{n/d}} = \zeta_{n/d}^b.$$

Tedy

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ (a,n)=d}} (x - \zeta_n^a) \stackrel{b=a/d}{=} \prod_{d|n} \prod_{\substack{1 \leq b \leq n/d \\ (b,n/d)=1}} (x - \zeta_{n/d}^b) = \prod_{d|n} t_{n/d}(x) \stackrel{e=n/d}{=} \prod_{e|n} t_e(x).$$

c) Indukcí podle n :

$n = 1 : t_1(x) = x - 1$ – zřejmě.

$n > 1$: At'

$$t_n(x) = \sum a_i x^i (a_i \in \mathbb{C}) \text{ a } \prod_{d|n, d < n} t_d(x) = \sum b_j x^j.$$

Podle IP víme, že $b_j \in \mathbb{Z}$ a $b_0 = \pm 1$.

Máme

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} t_d(x) = (a_0 + a_1 x + \dots)(b_0 + b_1 x + \dots),$$

takže můžeme porovnat koeficienty:

- $-1 = a_0 b_0 \Rightarrow a_0 = \pm 1$.
- $0 = a_0 b_1 + b_0 a_1 \Rightarrow \pm a_1 = -a_0 b_1 \in \mathbb{Z}$.
- \vdots

V každém dalším kroku dostaneme $a_i \in \mathbb{Z}$. □

Poznamenejme, že v důkazu části c) jsme také mohli použít tvrzení z algebry o vztahu dělitelnosti v oboru $\mathbb{Z}[x]$ a nad podílovým tělesem $\mathbb{Q}[x]$.

Ještě zbývá dokázat ireducibilitu $t_n(x)$, což uděláme na závěr ve větě 3.9. K důkazu věty 3.7 o aritmetických posloupnostech ji ale ani nepotřebujeme.

3.3 Prvočísla $kn + 1$

Chceme dokázat, že pro $n \in \mathbb{N}$ existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $kn + 1$, $k \in \mathbb{N}$. Klíčovým krokem v důkazu je existence aspoň jednoho takového prvočísla, jež je založená na tom, že pokud $p \mid t_n(c)$ pro vhodné c , pak $p \equiv 1 \pmod{n}$ (jak záhy uvidíme):

Tvrzení 3.6. *Pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje aspoň jedno prvočíslo $p \equiv 1 \pmod{n}$.*

Důkaz. Bud'

$$g(x) := \prod_{d < n, d|n} t_d(x), \text{ čili } t_n(x) \cdot g(x) = x^n - 1.$$

$t_d(x) \in \mathbb{Z}[x]$ podle tvrzení 3.5c), takže i $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

t_n a g nemají společný kořen v \mathbb{C} , takže jsou nesoudělné jako polynomy v $\mathbb{Q}[x]$, což je eukleidovský obor. Bézoutova věta pro $\mathbb{Q}[x]$ pak implikuje, že existují polynomy $f_0(x), h_0(x) \in \mathbb{Q}[x]$ takové, že $t_n(x) \cdot f_0(x) + g(x) \cdot h_0(x) = 1$. Můžeme vynásobit f_0, h_0 vhodným společným násobkem jmenovatelů $c \in \mathbb{Z}$ tak, aby $c \geq 3$, $f(x) := cf_0(x), h(x) := ch_0(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Pak

$$(\heartsuit) \quad t_n(x)f(x) + g(x)h(x) = c$$

je rovnost polynomů ze $\mathbb{Z}[x]$.

Uvažujme nyní $t_n(c)$. Máme $c \geq 3$ a $|t_n(c)| = \prod_{(a,n)=1} |c - \zeta_n^a|$. Každý ze součinitelů na pravé straně je > 1 (jde o vzdálenost bodů c a ζ_n^a v komplexní rovině – nakreslete si obrázek!), takže máme $|t_n(c)| > 1$.

Tedy existuje prvočíslo p takové, že $p \mid t_n(c)$.

Pozorování. $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Důkaz. $p \mid t_n(c) \mid c^n - 1$, čili $c^n \equiv 1 \pmod{p}$.

Bud' d nejmenší přirozené číslo takové, že $c^d \equiv 1 \pmod{p}$ (takovéto d se nazývá *řád prvku* c). Pak nutně $d \mid n$, protože jinak $n = ud + v$ pro $0 < v < d$ a $c^v \equiv c^n \cdot (c^d)^{-u} \equiv 1 \pmod{p}$.

Chceme dokázat, že $d = n$; pro spor ať $d < n$. Pak

$$p \mid c^d - 1 = \prod_{e|d} t_e(c) \mid g(c).$$

Zároveň $p \mid t_n(c)$, a tedy (\heartsuit) po dosazení $x = c$ implikuje $p \mid c$, což je spor s $c^n \equiv 1 \pmod{p}$.

Tedy $d = n$ je nejmenší přirozené číslo takové, že $c^n \equiv 1 \pmod{p}$. Ovšem podle Eulerovy věty máme $c^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, odkud stejnou úvahou jako výše plyne, že $n \mid p-1$ (jinak bychom vydělili se zbytkem $p-1 = nu' + v'$), neboli $p \equiv 1 \pmod{n}$. \square

Na konci důkazu jsme dokazovali, že $d \mid n$ a že $n \mid p-1$. V obou případech jde o vlastnosti *řádu prvku*, které také souvisí s *Lagrangeovou větou*, kterou uvidíte v Algebře.

Věta 3.7. *Bud' $n \in \mathbb{N}$. Pak existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $p = kn + 1$, $k \in \mathbb{N}$.*

Důkaz. Uvažujme tvrzení 3.6 pro $n, 2n, 3n, \dots$. Vždy existuje nějaké prvočíslo, označme je p_1, p_2, p_3, \dots . Zároveň $p_j \geq jn + 1$, takže posloupnost $\{p_j\}_{j \geq 1}$ jde do nekonečna. Tudíž tato posloupnost obsahuje nekonečně mnoho různých prvočísel. Pro každé z nich ale máme $p_j \equiv 1 \pmod{jn}$, takže $p_j \equiv 1 \pmod{n}$. \square

Poznámka.

- Ve skutečnosti platí: Je-li p dost velké prvočíslo takové, že $p \mid t_n(a)$ pro nějaké a , pak $p \equiv 1 \pmod{n}$. Úzce to souvisí s tím, jestli p zůstane prvočíslem v $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, případně jak se tam rozkládá.
- Podobně se dají dokázat další speciální případy Dirichletovy věty použitím $p \mid f(a)$ pro jiné polynomy f : jde o takzvané eukleidovské důkazy. Ale nejde takto dokázat všechny případy, platí:

Dirichletova věta jde takto dokázat pro $p \equiv m \pmod{n}$, právě když $m^2 \equiv 1 \pmod{n}$.

Viz bakalářka Martina Čecha

https://drive.google.com/file/d/1siGFFDJzCqR5cVCL2a_WapJTsWlt7rxY/

3.4 Ireducibilita cyklotomických polynomů

Chceme dokázat, že $t_n(x)$ je ireducibilní polynom v $\mathbb{Q}[x]$. Z Algebry se nám bude hodit:

Lemma 3.8 (Důsledek Gaussova lemmatu). *Ať nekonstantní polynom $f \in \mathbb{Z}[x]$ není ireducibilní v $\mathbb{Q}[x]$. Pak $f(x)$ není ireducibilní v $\mathbb{Z}[x]$, čili existují nekonstantní polynomy $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ takové, že $f(x) = g(x) \cdot h(x)$.*

Věta 3.9. *Cyklotomický polynom $t_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ je ireducibilní v $\mathbb{Q}[x]$ pro každé $n \geq 1$.*

Důkaz. $t_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ podle tvrzení 3.5. Ať pro spor je reducibilní, čili $t_n(x) = g(x) \cdot h(x)$, přičemž díky Gaussovou lemmatu 3.8 můžeme předpokládat, že $g, h \in \mathbb{Z}[x]$.

Bud' ζ nějaká primitivní n -tá odmocnina z 1. Pak ζ je kořen t_n , takže búno ať ζ je kořen $g(x)$ a g je ireducibilní.

Bud' p prvočíslo, $p \nmid n$. Chceme dokázat, že ζ^p je také kořen $g(x)$. Pro spor ať není. ζ^p je kořen $t_n(x)$, takže ζ^p je kořen $h(x)$, a tedy ζ je kořen $h(x^p)$.

Uvažujme nyní $NSD_{\mathbb{Q}[x]}(g(x), h(x^p))$: Polynom $g(x)$ je ireducibilní, takže toto NSD je 1 nebo $g(x)$. Zároveň polynomy $g(x)$ a $h(x^p)$ mají společný kořen ζ , takže nejsou nesoudělné a tedy jejich $NSD = g(x)$. To ale znamená, že $g(x) \mid h(x^p)$ (poznamenejme, že tato úvaha jde zjednodušit pomocí pojmu minimálního polynomu); ať

$$h(x^p) = g(x) \cdot k(x) \text{ pro nějaké } k \in \mathbb{Z}[x].$$

Máme: Pro všechny $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$, $f(x)^p = f(x^p)$.

Důkaz: $(\sum a_i x^i)^p$ roznásobíme podle multinomické věty, kde všechny koeficienty jsou dělitelné p , až na $\sum a_i^p \cdot x^{pi} = \sum a_i \cdot (x^p)^i = f(x^p)$: Obecně totiž platí, že po roznásobení $(x_1 + \dots + x_k)^p$ jsou všechny koeficienty, vyjma těch u x_i^p , dělitelné p , jak se dokáže indukcí z binomické věty (cvičení).

Uvažujme projekci modulo p :

$$\begin{aligned}\pi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_p \\ a &\mapsto a \pmod{p}.\end{aligned}$$

Ta indukuje homomorfismus okruhů polynomů

$$\begin{aligned}\pi_x : \mathbb{Z}[x] &\rightarrow \mathbb{Z}_p[x] \\ \sum a_i x^i &\mapsto \sum \pi(a_i) x^i.\end{aligned}$$

Máme tedy

$$\pi_x(g)(x) \cdot \pi_x(k)(x) = \pi_x(h)(x^p) = (\pi_x(h)(x))^p.$$

Bud' $a(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ nějaký ireducibilní faktor $\pi_x(g)$. Potom $a(x) \mid \pi_x(g) \mid \pi_x(h)^p$, takže $a \mid \pi_x(h)$, protože a je ireducibilní. Ale pak

$$a(x)^2 \mid \pi_x(g) \cdot \pi_x(h) = \pi_x(t_n) \mid \pi_x(x^n - 1),$$

neboli polynom $\pi_x(x^n - 1) = x^n - 1$ má násobný kořen v kořenovém nadtělese polynomu $a(x)$ nad tělesem \mathbb{Z}_p , což je spor s:

Tvrzení 3.10. Bud' T těleso charakteristiky p , kde $p \nmid n$. Pak polynom $x^n - 1$ nemá v T násobné kořeny.

Toto tvrzení dokážeme za chvíli, až dokončíme důkaz věty.

Dostali jsme tedy spor, čili ζ^p je kořen $g(x)$. Tedy jsme dokázali:

Pokud $g \in \mathbb{Z}[x]$ je ireducibilní, ζ je primitivní n -tá odmocnina z 1 a $p \nmid n$, pak

$$g(\zeta) = 0 \Rightarrow g(\zeta^p) = 0.$$

Ale ζ^p je opět primitivní n -tá odmocnina z 1, můžeme tedy volit další prvočíslo p' (klidně $p = p'$) a dostat $g(\zeta^{p \cdot p'}) = 0$, a tak dále.

Postupně dostaneme:

$$g(\zeta^m) = 0 \text{ pro všechna } (m, n) = 1.$$

Tedy g má za kořeny všechny primitivní n -té odmocniny z 1 (protože jsou to ζ^a , kde $1 \leq a \leq n, (a, n) = 1$). Ale ty jsou z definice všechny kořeny t_n , takže $t_n \mid g$. Zároveň na začátku jsme g volili tak, že $g \mid t_n$, a proto $g(x) = t_n(x)$. Navíc g je ireducibilní, a tedy i t_n je ireducibilní. \square

Zbývá dokázat tvrzení 3.10:

Důkaz tvrzení 3.10. Uvažujme formální derivaci polynomu $f \in T[x]$, definovanou jako

$$\left(\sum a_i x^i \right)' = \sum i a_i x^{i-1}$$

(čili normálním vzorečkem z analýzy pro derivaci polynomu). Splňuje obvyklé vzorce pro součet a součin, a tedy také:

Ať má $f(x)$ dvojnásobný kořen α , čili $f(x) = (x - \alpha)^2 \cdot g(x)$. Pak

$$f'(x) = 2(x - \alpha) \cdot g(x) + (x - \alpha)^2 \cdot g'(x) = (x - \alpha) \cdot [2g(x) + (x - \alpha)g'(x)].$$

Tedy $x - \alpha \mid NSD(f, f')$.

Ale $(x^n - 1)' = nx^{n-1}$, takže pokud $n \neq 0$ v \mathbb{Z}_p (čili $p \nmid n$), pak jediná možnost pro násobný kořen je $\alpha = 0$. Ale 0 samozřejmě není kořen $f(x) = x^n - 1$. Tedy $x^n - 1$ nemá násobné kořeny. \square

4. Charaktery a kvadratická reciprocita

4.1 Primitivní prvky pro začátečníky

Za chvíli budeme potřebovat použít pojem primitivního prvku, se kterým se potkáte na Algebře (a také ještě v sekci 5.4 později ve skriptech).

Definice. Bud' p prvočíslo. *Primitivní prvek modulo p* je prvek $g \in \mathbb{Z}_p^*$, který splňuje libovolnou z následujících ekvivalentních podmínek:

- g je generátor multiplikativní grupy \mathbb{Z}_p^* ,
- g je prvek řádu $p - 1$ v \mathbb{Z}_p^* ,
- g je prvek takový, že

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p - 1\} = \{g^0 = 1, g^1, g^2, \dots, g^{p-2}\}$$

(kde mocniny g^k samozřejmě počítáme modulo p).

Pro důkaz jeho existence pro prvočíslo p viz přednášku z Algebry nebo větu 5.1.

Obecněji, pro přirozené číslo n je *primitivní prvek modulo n* libovolný generátor multiplikativní grupy \mathbb{Z}_n^* . Pro složená čísla n ale primitivní prvek obecně neexistuje, viz důsledek 5.6.

4.2 Kvadratické zbytky

Definice. Bud' $n, a \in \mathbb{Z}$. Pak a je *kvadratický zbytek modulo n* , pokud existuje b takové, že $a \equiv b^2 \pmod{n}$; jinak je to *kvadratický nezbytek*.

Pro liché prvočíslo p dále definujeme *Legendreův symbol*:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{pokud } p \nmid a \text{ a } a \text{ je kvadratický zbytek modulo } p, \\ -1, & \text{pokud } p \nmid a \text{ a } a \text{ je kvadratický nezbytek modulo } p, \\ 0, & \text{pokud } p \mid a. \end{cases}$$

Zřejmě platí následující základní vlastnosti:

- $a \equiv b \pmod{p} \Rightarrow \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$
- $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$

- $\left(\frac{0}{p}\right) = 0$
- $\left(\frac{ac^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$, pokud $c \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Zdůrazněme, že pro složené číslo n nepoužíváme značení $\left(\frac{a}{n}\right)$ (protože se takto značí Jacobiho symbol, viz sekci 4.6).

Všimněme si také, že v důkazu věty 3.2 jsme dokázali, že $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, pokud $p \equiv 1 \pmod{4}$. Ve tvrzení 4.3 za chvíli dokážeme, že to platí jako ekvivalence.

Věta 4.1. Bud' p liché prvočíslo a $a \in \mathbb{Z}$. Pak

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Důkaz. Pokud $p \mid a$, je tvrzení zřejmé. Ať tedy $p \nmid a$.

Bud' g primitivní prvek modulo p .

Všimněme si, že $\left(\frac{g}{p}\right) = -1$, protože kdyby $g \equiv b^2 \pmod{p}$, pak bychom podle malé Fermatovy věty měli $g^{(p-1)/2} \equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, a tedy řád g by byl nejvýše $\frac{p-1}{2}$.

Máme $a \equiv g^k \pmod{p}$ pro jednoznačně určené $0 \leq k \leq p-2$. Protože $\left(\frac{bg^2}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$, máme

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{g^k}{p}\right) = \begin{cases} \left(\frac{1}{p}\right) = 1, & \text{pokud } 2 \mid k, \\ \left(\frac{g}{p}\right) = -1, & \text{pokud } 2 \nmid k. \end{cases}$$

Zároveň

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{k(p-1)}{2}} \begin{cases} \equiv 1, & \text{pokud } 2 \mid k, \\ \not\equiv 1, & \text{pokud } 2 \nmid k, \end{cases} \pmod{p}.$$

Navíc $a^{\frac{p-1}{2}}$ je kořen polynomu $x^2 - 1$ nad tělesem \mathbb{Z}_p , takže $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$. Tedy pokud $a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$, pak $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

Dohromady vidíme, že pokud $2 \mid k$, pak se levá i pravá strana věty rovnají 1. Pokud $2 \nmid k$, pak se obě strany rovnají -1 . \square

Důsledek 4.2. $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ pro $a, b \in \mathbb{Z}$ a liché prvočíslo p .

Důkaz. Podle věty 4.1 máme

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} = a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

Pravá a levá strana této kongruence jsou ale 0, 1, -1 , a tedy se musejí rovnat, když jsou kongruentní modulo p . \square

Důsledek 4.3. Bud' p liché prvočíslo. Pak

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

čili -1 je kvadratický zbytek modulo $p \iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

Důkaz. Opět vyplývá z věty 4.1. \square

Tvrzení 4.4. *Bud' p liché prvočíslo. Pak*

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}},$$

čili 2 je kvadratický zbytek modulo $p \iff \pm 1 \pmod{8}$.

Důkaz. Počítejme modulo p v $\mathbb{Z}[i]$, čili

$$a + bi \equiv c + di \pmod{p\mathbb{Z}[i]} \Leftrightarrow a \equiv c \pmod{p}, b \equiv d \pmod{p}.$$

Kongruence modulo p v $\mathbb{Z}[i]$ budeme typicky značit prostě jako \pmod{p} .

Binomická věta dává

$$(1+i)^p = 1 + \binom{p}{1}i + \binom{p}{2}i^2 + \cdots + \binom{p}{p-1}i^{p-1} + i^p \equiv 1 + i^p \pmod{p},$$

protože $p \mid \binom{p}{j}$. Zároveň

$$\begin{aligned} (1+i)^p &= (1+i)((1+i)^2)^{\frac{p-1}{2}} = (1+i)(2i)^{\frac{p-1}{2}} \\ &= (1+i)i^{\frac{p-1}{2}}2^{\frac{p-1}{2}} \stackrel{4.1}{=} (1+i)i^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}. \end{aligned}$$

Budeme porovnávat pravé strany těchto dvou kongruencí, k čemuž rozlišíme dva případy:
a) $p \equiv 1 \pmod{4}$. Pak $i^p = i$ a $i^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$, tedy

$$1+i \equiv (1+i)(-1)^{\frac{p-1}{4}}\left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}.$$

Vynásobením $1-i$ dostaneme

$$2 \equiv 2(-1)^{\frac{p-1}{4}}\left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p},$$

což platí už jako kongruence v \mathbb{Z} . Tedy $\left(\frac{2}{p}\right) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}$. Na obou stranách kongruence máme ± 1 , takže nutně máme rovnost $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$.

b) $p \equiv -1 \pmod{4}$. Pak $i^p = -i$, $i^{\frac{p-1}{2}} = i^{-1} \cdot i^{\frac{p+1}{2}} = -i \cdot (-1)^{\frac{p+1}{4}}$ a podobně se ukáže, že $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p+1}{4}}$. \square

Klíčovou větou je zákon kvadratické reciprocity 4.11: Pro různá lichá prvočísla p, q platí

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

Ten si dokážeme časem.

4.3 Charaktery

Při počítání $\binom{\frac{2}{p}}{p}$ jsme silně využili to, že $(1+i)^2 \equiv 2$. Podobně pro důkaz kvadratické reciprocity chceme něco, co splňuje $(\text{něco})^2 \equiv p$. K tomu nám poslouží charaktery a Gaussovy součty.

Definice. *Multiplikativní charakter modulo n* je grupový homomorfismus

$$\chi : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{C}^*,$$

tedy zobrazení takové, že $\chi(uv) = \chi(u)\chi(v)$ pro všechna $u, v \in \mathbb{Z}_n^*$.

Poznámka. Pro $a \in \mathbb{Z}_n^*$ máme $a^{\varphi(n)} = 1$, a tedy $1 = \chi(1) = \chi(a^{\varphi(n)}) = \chi(a)^{\varphi(n)}$, takže hodnota $\chi(a)$ je $\varphi(n)$ -tá odmocnina z jedné.

Příklad. $\mathbb{Z}_5^* = \{1, 2, 3, 4\}$.

2 je primitivní prvek modulo 5 (a $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$), takže $\mathbb{Z}_5^* = \{2^0, 2^1, 2^2, 2^3\}$. Jak vypadají charaktery modulo 5?

Pro charakter χ máme $\chi(2^k) = (\chi(2))^k$, takže charakter je jednoznačně určený hodnotou $\chi(2)$, jež musí být být čtvrtou odmocninou z 1, protože $1 = \chi(1) = (\chi(2))^4$.

Například volbou $\chi(2) = i$ dostaneme charakter $\chi = \chi_1$ takový, že

$$\chi(1) = 1, \chi(2) = i, \chi(3) = \chi(2)^3 = -i, \chi(4) = \chi(2)^2 = -1.$$

Všechny charaktery modulo 5 pak jsou dané v této tabulce:

	1	2	3	4
$\chi_0 = \varepsilon$	1	1	1	1
χ_1	1	i	$-i$	-1
χ_2	1	-1	-1	1
χ_3	1	$-i$	i	-1

Všimněme si, že $\chi_2(a) = \left(\frac{a}{5}\right)$ je Legendreův symbol modulo 5!

Mezi charaktery platí různé vztahy, například

$$\chi_2(a) = \chi_1(a)^2 \text{ nebo } \overline{\chi_1(a)} = \chi_1(a)\chi_2(a) = \chi_3(a)$$

pro všechna a .

Lemma 4.5. *Bud' p prvočíslo, g primitivní prvek modulo p a $b \in \mathbb{Z}$. Pak zobrazení*

$$\begin{aligned} \chi_b : \mathbb{Z}_p^* &\rightarrow \mathbb{C}^* \\ g^k &\mapsto \zeta_{p-1}^{kb} \quad (\text{pro } 0 \leq k \leq p-2) \end{aligned}$$

je charakter modulo p .

Pro $0 \leq b \leq p-2$ jsou tyto charaktery po dvou různé a obecně $\chi_b = \chi_b \pmod{p-1}$.

Pokud (pro dané složené n) v grupě \mathbb{Z}_n^* existuje primitivní prvek g , pak podobně máme charaktery $g \mapsto \zeta_{\varphi(n)}^b$ (kde stačí brát $0 \leq b < \varphi(n)$). Tento primitivní prvek ale obecně existovat nemusí – viz důsledek 5.6.

Důkaz. Ať $u = g^k, v = g^l \in \mathbb{Z}_p^*$. Pro ověření multiplikativity si uvědomme, že $uv = g^{k+l} \pmod{p-1}$.

Pak

$$\chi_b(uv) = \chi_b(g^{k+l} \pmod{p-1}) = \zeta_{p-1}^{b(k+l) \pmod{p-1}} = \zeta_{p-1}^{b(k+l)} = \zeta_{p-1}^{bk} \zeta_{p-1}^{bl} = \chi_b(u)\chi_b(v).$$

Uvědomme si, že ve 3. rovnosti jsme použili toho, že máme $(p-1)$ -ní odmocninu ζ_{p-1} . Zbytek důkazu je jasný (charaktery jsou různé, protože mají různou hodnotu $\chi_b(g)$). \square

Definice. Množina všech charakterů modulo n tvoří grupu, kterou značíme $X(\mathbb{Z}_n^*)$. Grupové operace jsou definované (pro všechna $a \in \mathbb{Z}_n^*$) takto:

- Součin: $(\chi_1\chi_2)(a) := \chi_1(a)\chi_2(a)$.
- Jednotka: *triviální charakter* $\varepsilon(a) := 1$. Ostatní charaktery se nazývají *netriviální*.
- Inverzní prvek: $\bar{\chi}(a) := \overline{\chi(a)}$.

Cvičení. Ověřte, že jde skutečně o grupu.

Tvrzení 4.6. Bud' p prvočíslo. Pak $X(\mathbb{Z}_p^*) \simeq \mathbb{Z}_{p-1}(+)$.

Podobné tvrzení platí i pro složené n , kde $X(\mathbb{Z}_n^*) \simeq \mathbb{Z}_n^*$, důkaz je ale o něco složitější.

Důkaz. Buď $g \in \mathbb{Z}_p^*$ primitivní prvek, čili $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\} = \{g^0 = 1, g^1, g^2, \dots, g^{p-2}\}$. χ je jednoznačně určený hodnotou $\chi(g)$, což je nějaká $(p-1)$ -ní odmocnina z 1, tedy $\chi(g) = \zeta_{p-1}^b$ pro nějaké $b = 0, 1, \dots, p-2$. Pak $\chi(g^j) = \zeta_{p-1}^{bj} = \chi_b(g^j)$ pro každé j , což je charakter podle lemmatu 4.5.

Ted' zbývá jen ověřit, že zobrazení

$$\begin{aligned} X(\mathbb{Z}_p^*) &\rightarrow \mathbb{Z}_{p-1} \\ \chi_b &\mapsto b, \quad \text{kde } \chi_b(g) = \zeta_{p-1}^b, \end{aligned}$$

je izomorfismus: Surjektivita a injektivita jsou jasné.

K tomu, že jde o homomorfismus, stačí ověřit toto: Označíme-li χ_b charakter takový, že $\chi_b(g^j) = \zeta_{p-1}^{bj}$, pak platí $\chi_b \cdot \chi_c = \chi_{b+c \pmod{p-1}}$ (cvičení). \square

Tvrzení 4.7. Bud' $n > 1$, χ charakter modulo n a $a, b \in \mathbb{Z}_n^*$. Pak

$$a) \quad \sum_{a \in \mathbb{Z}_n^*} \chi(a) = \begin{cases} 0, & \text{pokud } \chi \neq \varepsilon, \\ \varphi(n), & \text{pokud } \chi = \varepsilon. \end{cases}$$

b)

$$\sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_n^*)} \chi(b) = \begin{cases} 0, & \text{pokud } b \neq 1, \\ \varphi(n), & \text{pokud } b = 1. \end{cases}$$

Povšimněme si, že části a) a b) tohoto lemmatu dávají vlastně doplňkové vlastnosti: část a) určuje, jak dopadne součet všech různých hodnot daného charakteru, zatímco část b) udává, co se stane, když tutéž hodnotu dosadíme do všech možných charakterů a výsledky sečteme.

Cvičení. Ověřte, že tyto vzorce fungují na příkladě charakterů modulo 5 uvedených výše.

Důkaz. a) Pokud je χ netriviální, existuje nějaké $c \in \mathbb{Z}_n^*$ takové, že $\chi(c) \neq 1$. Pak máme $\mathbb{Z}_n^* = \{ac \mid a \in \mathbb{Z}_n^*\}$, a tedy se rovnají množiny hodnot

$$\{\chi(a) \mid a \in \mathbb{Z}_n^*\} = \{\chi(ac) \mid a \in \mathbb{Z}_n^*\}.$$

Tedy tyto množiny mají i stejné součty

$$\sum \chi(a) = \sum \chi(ac) = \chi(c) \sum \chi(a),$$

takže

$$(\chi(c) - 1) \sum \chi(a) = 0, \text{ a tudíž konečně } \sum \chi(a) = 0.$$

Pro triviální charakter ε zřejmě máme $\sum \varepsilon(a) = \sum 1 = \varphi(n)$, protože v obou sumách sčítáme přes právě $\varphi(n)$ prvků \mathbb{Z}_n^* .

b) Tuto část dokážeme jen pokud $n = p$ je prvočíslo.

Pokud $b \neq 1$, pak charakter χ_1 splňuje, že $\chi_1(b) \neq 1$ (cvičení).

Tedy podobně jako v části a) máme

$$\sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_p^*)} \chi(b) = \sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_p^*)} (\chi \chi_1)(b) = \chi_1(b) \sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_p^*)} \chi(b),$$

což opět implikuje $\sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_p^*)} \chi(b) = 0$, protože $\chi_1(b) \neq 1$.

Konečně $\sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_p^*)} \chi(1) = \sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_p^*)} 1 = |X(\mathbb{Z}_p^*)| = p - 1$ díky lemmatu 4.6. □

Poznámka. Využili jsme obecného pozorování, že je-li G grupa a $g_0 \in G$, pak $\{g \in G\} = \{gg_0 \mid g \in G\}$.

Například takto taky $\sum_{a \in \mathbb{Z}_n} \zeta_n^a = 0$, protože $\sum \zeta_n^a = \sum \zeta_n^{a+1} = \zeta_n \sum \zeta_n^a$.

4.4 Gaussovy součty

Definice. Ať $\chi \in X(\mathbb{Z}_n^*)$ je charakter modulo n . *Gaussův součet* charakteru χ je

$$g(\chi) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_n^*} \chi(a) \zeta_n^a, \text{ kde } \zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}.$$

Všimněme si, že dává smysl sčítat přes \mathbb{Z}_n^* , čili že pokud $a \equiv b \pmod{n}$, pak také $\chi(a) \zeta_n^a = \chi(b) \zeta_n^b$ (protože $\zeta_n^n = 1$ a χ je charakter modulo n).

Pokud $n = p$ je prvočíslo, pak

$$g(\varepsilon) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \zeta_p^a = \left(\sum_{a \in \mathbb{Z}_p} \zeta_p^a \right) - \zeta_p^0 = 0 - 1 = -1.$$

Tvrzení 4.8. Bud' χ netriviální charakter modulo prvočíslo p . Pak $|g(\chi)| = \sqrt{p}$.

Důkaz. Chceme dokázat, že $g(\chi) \cdot \overline{g(\chi)} = p$.
 Pro $y \in \mathbb{Z}_p^*$ máme $\overline{\chi(y)} = \chi(y^{-1})$ a $\overline{\zeta_p^y} = \zeta_p^{-y}$, takže

$$g(\chi)\overline{g(\chi)} = \left(\sum_x \chi(x)\zeta_p^x \right) \cdot \left(\sum_y \chi(y^{-1})\zeta_p^{-y} \right) = \sum_{x,y} \chi(xy^{-1})\zeta_p^{x-y},$$

kde sčítáme přes uspořádané dvojice $(x, y) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$. Abychom tento součet spočítali, uděláme vhodnou substituci.

Bud' $z = xy^{-1}$, čili $x = zy$.

Máme $(x, y) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$, právě když $(xy^{-1}, y) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$. Tedy můžeme sčítat přes dvojice (z, y) :

$$g(\chi)\overline{g(\chi)} = \sum_{(z,y) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*} \chi(z)\zeta_p^{y(z-1)} = \sum_{z \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\chi(z) \cdot \sum_{y \in \mathbb{Z}_p^*} \zeta_p^{y(z-1)} \right) = \heartsuit.$$

Máme dvě možnosti pro hodnotu vnitřní sumy:

a) $z = 1$. Pak $\zeta_p^{y(z-1)} = \zeta_p^0 = 1$ pro všechna y . Zároveň $\chi(1) = 1$, takže dostaneme

$$1 \cdot \sum_{y \in \mathbb{Z}_p^*} 1 = p - 1.$$

b) $z \neq 1$. Pak $z - 1$ je invertibilní modulo p , takže $\{y(z-1) \pmod{p} \mid y \in \mathbb{Z}_p^*\} = \mathbb{Z}_p^*$.
 Tudíž příslušný člen v závorce ve \heartsuit je

$$\chi(z) \cdot \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \zeta_p^a = \chi(z) \cdot (-1) = -\chi(z).$$

Dohromady dostáváme

$$\heartsuit = p - 1 - \sum_{z \neq 1} \chi(z) = p - 1 - (-1) = p,$$

protože $\sum_{z \in \mathbb{Z}_p} \chi(z) = 0$. □

Připomeňme, že Legendreův symbol $\left(\frac{a}{p}\right)$ dává charakter

$$\begin{aligned} \chi : \mathbb{Z}_p^* &\rightarrow \{\pm 1\} \subset \mathbb{C}^* \\ a &\mapsto \chi(a) = \left(\frac{a}{p}\right) \end{aligned}$$

Tvrzení 4.7 pak například implikuje (pro liché prvočíslo p), že $\sum_{a \in \mathbb{Z}_p} \left(\frac{a}{p}\right) = 0$ (což je ale jasné, protože zbytků je stejně jako nezbytků).

Definice. Bud' p liché prvočíslo. Kvadratický Gaussův součet je

$$S := \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a.$$

Jedná se tedy o Gaussův součet odpovídající charakteru $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$.

Lemma 4.9. Bud' p liché prvočíslo. Pak $S = i^{\frac{p-1}{2}} \cdot r$ pro $r = \pm\sqrt{p}$.

Je dobré si rozmyslet, co lemma říká v závislosti na $p \pmod{4}$:

Pokud $p \equiv 1 \pmod{4}$, pak $\frac{p-1}{2}$ je sudé, čili $i^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1$ a lemma říká, že $S \in \mathbb{R}$.

Naopak pokud $p \equiv 3 \pmod{4}$, pak $S \in i\mathbb{R}$ leží na imaginární ose.

Důkaz. Rozlišíme dva případy podle $p \pmod{4}$.

a) $p \equiv 1 \pmod{4}$. Pak $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$ podle tvrzení 4.4, a tedy $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{-a}{p}\right)$ a

$$\left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a + \left(\frac{-a}{p}\right) \zeta_p^{-a} = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot (\zeta_p^a + \zeta_p^{-a}) \in \mathbb{R},$$

protože ζ_p^{-a} je komplexně sdružené číslo k ζ_p^a .

S je součet takovýchto výrazů pro $a = 1, \dots, \frac{p-1}{2}$, takže $S \in \mathbb{R}$, což sedí s tím, že $\frac{p-1}{2}$ je sudé, čili $i^{\frac{p-1}{2}} \in \mathbb{R}$.

b) $p \equiv 3 \pmod{4}$. Podobně máme $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$. Ted'

$$\left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a + \left(\frac{-a}{p}\right) \zeta_p^{-a} = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot (\zeta_p^a - \zeta_p^{-a}) \in i\mathbb{R}.$$

Toto opět platí pro všechna a , takže $S \in i\mathbb{R}$, což sedí.

Konečně v obou případech díky tvrzení 4.8 víme, že $|S| = \sqrt{p}$, tedy máme $|r| = \sqrt{p}$. \square

Důsledek 4.10. Bud' p liché prvočíslo. Pak $S^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot p$.

Důkaz. Podle lemmatu 4.9 máme $S^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot r^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot p$. \square

Toto je obdoba vztahu $2 = -i \cdot (1+i)^2$ z důkazu tvrzení 4.4.

Dokonce se dá přímo určit i S : Platí

$$S = \begin{cases} \sqrt{p}, & \text{pokud } p \equiv 1 \pmod{4} \\ i\sqrt{p}, & \text{pokud } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

(zatímco my toto víme v obou případech až na \pm).

4.5 Zákon reciprocity

Už se konečně můžeme pustit do důkazu zákona reciprocity.

Věta 4.11 (Kvadratická reciprocity). Bud'te p, q různá lichá prvočísla. Potom

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

K důkazu potřebujeme pracovat v okruhu

$$R = \mathbb{Z}[\zeta_p] := \left\{ \sum_{j=0}^N a_j \zeta_p^j \mid N \in \mathbb{N}_0, a_j \in \mathbb{Z} \right\},$$

kde stejně jako v celé sekci je p liché prvočíslo a $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$.

Tvrzení 4.12. Máme

$$R = \mathbb{Z}[\zeta_p] = \{a_0 + a_1\zeta_p + \cdots + a_{p-2}\zeta_p^{p-2} \mid a_j \in \mathbb{Z}\}$$

a

$$a_0 + \cdots + a_{p-2}\zeta_p^{p-2} = 0 \Leftrightarrow a_0 = \cdots = a_{p-2} = 0.$$

Důkaz. Platí $\zeta_p^{p-1} = -\zeta_p^{p-2} - \cdots - \zeta_p - 1$, a tedy pro $j \geq p-1$ máme $\zeta_p^j = -\zeta_p^{j-1} - \cdots - \zeta_p^{j-(p-1)}$. Každý výraz $\sum_{j=0}^N a_j \zeta_p^j$ jde tedy postupně přepsat tak, že zmizí všechny členy ζ_p^j pro $j \geq p-1$.

At $a_0 + \cdots + a_{p-2}\zeta_p^{p-2} = 0$. Tedy polynom $A(x) := a_0 + a_1x + \cdots + a_{p-2}x^{p-2}$ má kořen ζ_p . Podle lemmatu 3.4 je cyklotomický polynom $t_p(x) = x^{p-1} + \cdots + x + 1$ irreducibilní a má také kořen ζ_p .

Tedy $NSD_{\mathbb{Q}[x]}(A(x), t_p(x)) = t_p(x)$ (protože tyto polynomy nejsou nesoudělné a $NSD \mid t_p$). To znamená, že $t_p(x) \mid A(x)$, ale stupeň t_p je větší než stupeň A . Takže musí jít o nulový násobek $A(x) = 0 \cdot t_p(x) = 0$. \square

Definice. Podobně jako v důkazu tvrzení 4.4 budeme potřebovat počítat modulo ωR , kdy pro $\alpha, \beta \in R$ říkáme, že $\alpha \equiv \beta \pmod{\omega R}$, pokud ω dělí $\alpha - \beta$ v R , čili $\exists \gamma \in R : \alpha - \beta = \omega \gamma$ (neboli $\alpha - \beta \in \omega R$, proto značení).

Důsledek 4.13. Mějme $a, b, n \in \mathbb{Z}, n > 0$. Pak $a \equiv b \pmod{n\mathbb{Z}}$, právě když $a \equiv b \pmod{nR}$.

Důkaz. „ \Rightarrow “ Máme $a - b = nc$ pro nějaké $c \in \mathbb{Z}$. Zároveň taky $c \in R$, takže $a \equiv b \pmod{nR}$.

„ \Leftarrow “ At $a - b = n\gamma$ pro nějaké $\gamma \in R$, $\gamma = a_0 + \cdots + a_{p-2}\zeta_p^{p-2}$. Tedy

$$(na_0 - a + b) + na_1\zeta_p + \cdots + na_{p-2}\zeta_p^{p-2} = 0,$$

přičemž všechny koeficienty jsou zjevně v \mathbb{Z} . Podle tvrzení 4.12 jsou tedy všechny koeficienty rovné 0, takže speciálně $na_0 - a + b = 0$.

Máme tedy $a - b = na_0$, kde $a_0 \in \mathbb{Z}$, čili $a \equiv b \pmod{n\mathbb{Z}}$, jak jsme chtěli. \square

Už se konečné můžeme pustit do důkazu kvadratické reciprocity!

Důkaz věty 4.11. Uvažujme kvadratický Gaussův součet

$$S = \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{a}{p} \right) \cdot \zeta_p^a.$$

Spočítáme S^q modulo qR dvěma způsoby:

a) Máme $S^q = S \cdot S^{q-1}$ a dále

$$S^{q-1} = (S^2)^{\frac{q-1}{2}} \stackrel{4.10}{=} \left(\frac{-1}{p} \right)^{\frac{q-1}{2}} \cdot p^{\frac{q-1}{2}} \stackrel{4.4}{=} (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \cdot p^{\frac{q-1}{2}}.$$

Podle věty 4.1 máme $p^{\frac{q-1}{2}} \equiv \left(\frac{p}{q}\right) \pmod{q\mathbb{Z}}$. Tato kongruence tedy také platí modulo qR podle důsledku 4.13. Dohromady dostáváme

$$S^q \equiv S \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) \pmod{qR}.$$

b) Po roznásobení $(x_1 + \dots + x_k)^q$ jsou všechny koeficienty, vyjma těch u x_i^q , dělitelné q , jak se dokáže indukcí z binomické věty (cvičení). Tedy mod qR máme:

$$\begin{aligned} S^q &= \left(\sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a \right)^q \equiv \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{a}{p}\right)^q \zeta_p^{aq} \stackrel{q \text{ liché}}{=} \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^{aq} = \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{aq^2}{p}\right) \zeta_p^{aq} \\ &= \left(\frac{q}{p}\right) \cdot \sum_{a \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{aq}{p}\right) \zeta_p^{aq} \stackrel{b=aq}{=} \left(\frac{q}{p}\right) \cdot \sum_{b \in \mathbb{Z}_p^*} \left(\frac{b}{p}\right) \zeta_p^b = \left(\frac{q}{p}\right) \cdot S \pmod{qR}. \end{aligned}$$

Porovnáním a) a b) vidíme, že

$$uS \equiv 0 \pmod{qR}, \text{ kde } u := (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) - \left(\frac{q}{p}\right).$$

Zřejmě $u = 0, 2, -2$, protože jde o rozdíl dvou čísel, jež jsou obě ± 1 .

My chceme dokázat, že $u = 0$, ať tedy pro spor $u = \pm 2$.

Pak $2S \equiv 0 \pmod{qR}$. Prvočíslo $q = 2k + 1$ je liché, takže

$$S \equiv -2k \cdot S = -k \cdot (2S) \equiv 0 \pmod{qR}.$$

Využitím důsledku 4.10 pak máme $\left(\frac{-1}{p}\right) \cdot p = S^2 \equiv S \cdot 0 = 0 \pmod{qR}$, takže $p \equiv 0 \pmod{qR}$. Důsledek 4.13 pak implikuje $p \equiv 0 \pmod{q\mathbb{Z}}$, což je spor.

Tedy $u = 0$ a věta je dokázaná. \square

4.6 Jacobiho symbol

Zákon kvadratické reciprocity se využívá k výpočtu Legendreova symbolu $\left(\frac{a}{p}\right)$, kde můžeme předpokládat $a < p$. Abychom mohli použít reciprocity, bud' $a = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ je prvočíselný rozklad a .

Pak podle důsledku 4.2 máme

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{p_1}{p}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{p_k}{p}\right)^{e_k},$$

stačí tedy určit $\left(\frac{p_i}{p}\right)$. Je-li nějaké z prvočísel 2, použijeme tvrzení 4.4.

Pro liché prvočíslo p_i příslušný člen pomocí reciprocity převedeme na výpočet $\left(\frac{p}{p_i}\right) = \left(\frac{p \bmod p_i}{p_i}\right)$, címž si pomůžeme, protože $p_i < a < p$.

Opět můžeme $b := p \pmod{p_i}$ rozložit na prvočísla atd. Postupně se čísla snižují, takže časem skončíme a dostaneme výsledek.

Tento postup funguje, ale má dva problémy:

Jednak se nám potenciálně výpočet hodně větví a narůstá počet případů, které uvažujeme. Ale zejména je potřeba rozkládat na součin prvočísel, což je výpočetně velmi náročné!

Hodilo by se tedy postup vylepšit tak, aby nevyžadoval rozklad na prvočísla (čímž by se zároveň vyřešil i první z problémů). To je možné pomocí Jacobiho symbolu.

Definice. Mějme celé číslo a a liché přirozené číslo n . *Jacobiho symbol* $\left(\frac{a}{n}\right)$ definujeme jako

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{q_1}\right) \cdots \left(\frac{a}{q_k}\right),$$

kde $n = q_1 \cdots q_k$ je součin (ne nutně různých) prvočísel a výrazy na pravé straně jsou Legendreovy symboly.

Také definujeme $\left(\frac{a}{1}\right) = 1$.

Pozor! $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$, ale $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$ nemá řešení.

Hodnota Jacobiho symbolu tedy může být 1 i pokud a je kvadratický nezbytek modulo složené číslo n .

Věta 4.14 (Vlastnosti Jacobiho symbolu). *Mějme celá čísla $a, b \in \mathbb{Z}$ a lichá přirozená $n, m \in \mathbb{N}$. Pak:*

a)

$$\left(\frac{a}{nm}\right) = \left(\frac{a}{n}\right) \left(\frac{a}{m}\right), \quad \left(\frac{ab}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right) \left(\frac{b}{n}\right).$$

b)

$$a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right).$$

c)

$$\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}, \quad \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}.$$

d)

$$\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2} \frac{m-1}{2}} \left(\frac{m}{n}\right)$$

Jacobiho symbol tedy má stejné základní vlastnosti jako Legendreův symbol.

Všimněme si, že díky poslední vlastnosti d) můžeme „převracet“ Jacobiho symboly ve výpočtu bez nutnosti faktorizovat! Potřebujeme jenom umět hledat rozklady tvaru $a = 2^e \cdot b$ pro liché b , což není problém.

Důkaz částí a), b) je jasný. Ke zbytku se nám bude hodit toto lemma:

Lemma 4.15. *Ať jsou a_1, \dots, a_k lichá celá čísla. Pak:*

$$\frac{a_1 - 1}{2} + \cdots + \frac{a_k - 1}{2} \equiv \frac{a_1 \cdots a_k - 1}{2} \pmod{2},$$

$$\frac{a_1^2 - 1}{8} + \cdots + \frac{a_k^2 - 1}{8} \equiv \frac{(a_1 \cdots a_k)^2 - 1}{8} \pmod{8}.$$

Důkaz. Cvičení. Dokáže se indukcí podle k , k čemuž je klíčem případ $k = 2$:

$$\frac{a_1 a_2 - 1}{2} - \frac{a_1 - 1}{2} - \frac{a_2 - 1}{2} = \frac{(a_1 - 1)(a_2 - 1)}{2} \equiv 0 \pmod{2},$$

protože $2 \mid a_i - 1$.

Druhý vztah podobně platí díky tomu, že $8 \mid a_i^2 - 1$. \square

Důkaz věty 4.14. Até $n = q_1 \cdots q_k$, kde q_i jsou lichá prvočísla (ne nutně různá). c)

$$\left(\frac{-1}{n} \right) \stackrel{\text{def}}{=} \prod \left(\frac{-1}{q_i} \right) \stackrel{4.4}{=} (-1)^{\frac{q_1-1}{2} + \cdots + \frac{q_k-1}{2}} \stackrel{4.15}{=} (-1)^{\frac{q_1 \cdots q_k - 1}{2}}.$$

Vzoreček pro $\left(\frac{2}{n} \right)$ se dokáže podobně (cvičení).

d) Até $m = p_1 \cdots p_l$, kde p_j jsou lichá prvočísla.

Pokud $(n, m) \neq 1$, pak $p_i = q_j$ pro nějaká i, j , a tedy $\left(\frac{n}{m} \right)$ obsahuje $\left(\frac{q_j}{p_i} \right) = 0$ a $\left(\frac{m}{n} \right)$ obsahuje $\left(\frac{p_i}{q_j} \right) = 0$. Obě strany d) se tedy v tomto případě rovnají 0.

Até dále $(n, m) = 1$. Máme

$$\left(\frac{m}{n} \right) = \prod_{i,j} \left(\frac{p_i}{q_j} \right), \quad \left(\frac{n}{m} \right) = \prod_{i,j} \left(\frac{q_j}{p_i} \right).$$

Podle kvadratické reciprocity pro Legendreův symbol 4.11 víme, že

$$\left(\frac{p_i}{q_j} \right) \left(\frac{q_j}{p_i} \right) = (-1)^{\frac{p_i-1}{2} \cdot \frac{q_j-1}{2}}.$$

Tedy

$$\left(\frac{n}{m} \right) \left(\frac{m}{n} \right) = (-1)^s,$$

kde

$$\begin{aligned} s &:= \sum_{i,j} \frac{p_i - 1}{2} \cdot \frac{q_j - 1}{2} = \left(\sum_i \frac{p_i - 1}{2} \right) \cdot \left(\sum_j \frac{q_j - 1}{2} \right) \\ &\stackrel{4.15}{=} \frac{p_1 \cdots p_l - 1}{2} \cdot \frac{q_1 \cdots q_k - 1}{2} = \frac{m - 1}{2} \cdot \frac{n - 1}{2} \pmod{2}. \end{aligned}$$

Tím jsme tedy dokázali, že

$$\left(\frac{n}{m} \right) \left(\frac{m}{n} \right) = (-1)^s = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}$$

a důkaz je hotov – pokud jsou m, n nesoudělná, Jacobiho symboly jsou ± 1 , takže jeden z nich můžeme přehodit na druhou stranu rovnosti. \square

4.7 Prvočísla tvaru $a^2 + 2b^2$

Pomocí Legendreových symbolů můžeme rozšířit větu 3.2, která popisovala prvočísla tvaru $a^2 + b^2$.

Tvrzení 4.16. *Bud' $p \in \mathbb{N}$ prvočíslo. Pak $p = a^2 + 2b^2$ pro nějaká $a, b \in \mathbb{Z}$, právě když $p = 2$ nebo $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$.*

Důkaz. Dokážeme jen těžší implikaci zprava doleva (v případě $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$), tu druhou necháme jako cvičení.

Okruh $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ je eukleidovský, a proto i gaussovský.

Stejně jako v lemmatu 3.1 se dokáže: $p = a^2 + 2b^2$, právě když p není prvočinitel v $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Předpokládejme ted' pro spor, že $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$ je prvočinitel v $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Výpočtem s Legendreovými symboly pro $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$ dostaneme $\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot \left(\frac{2}{p}\right) = 1$ (cvičení).

Tedy existuje x takové, že $x^2 \equiv -2 \pmod{p}$, čili $p \mid x^2 + 2 = (x + \sqrt{-2})(x - \sqrt{-2})$ v $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Podle předpokladu je p prvočinitel v $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, takže $p \mid x \pm \sqrt{-2}$. Tedy $x \pm \sqrt{-2} = p \cdot (c + d\sqrt{-2})$, odkud ale porovnáním imaginárních částí dostaneme, že $\pm 1 = pd$, což je spor. \square

Poznamenejme, že obecně se kolem zkoumání toho, která prvočísla jsou tvaru $a^2 + nb^2$ pro dané přirozené číslo n rozvinula bohatá teorie. Pro seznámení se s ní doporučuji knížku od Coxe nebo přednášku Kvadratické formy a třídová tělesa I.

David A. Cox, Primes of the Form $x^2 + ny^2$: Fermat, Class Field Theory, and Complex Multiplication, Wiley, 1989.

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=N MAG455>

5. Testování prvočíselnosti

V první části této kapitoly popíšeme obecný princip pravděpodobnostních testů prvočíselnosti a několik konkrétních testů založených na látce z předchozích kapitol.

Ve druhé části kapitoly pak využijeme strukturu \mathbb{Z}_n^* k sestrojení lepšího testu prvočíselnosti.

5.1 Opakování a Fermatův test

Připomeňme, že *Eulerova funkce* $\varphi(n)$ udává počet přirozených čísel k , $1 \leq k \leq n$, jež jsou nesoudělná s n . Platí:

- $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$.
- $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$, kde násobíme přes všechna prvočísla p , která dělí n .
- *Malá Fermatova věta*. $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, pokud je p prvočíslo a $(a, p) = 1$.
- *Eulerova věta*. $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, pokud $(a, n) = 1$.
- $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$, kde sčítáme přes všechna přirozená čísla d , která dělí n .

Fermatův test prvočíselnosti. Buď $a, N \in \mathbb{N}$, $(N, a) = 1$. Pokud $a^{N-1} \not\equiv 1 \pmod{N}$, pak je N složené.

Existují ale *Carmichaelova čísla*, pro něž $a^{N-1} \equiv 1 \pmod{N}$ platí pro všechna a . Nejmenší z nich je $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ (cvičení).

Fermatův test tedy obecně nefunguje, zanedlouho si ale popíšeme jeho vylepšenou verzi, tzv. Rabin–Millerův test.

5.2 Pravděpodobnostní testy obecně

Napřed si ale popišme obecnou myšlenku pravděpodobnostních testů prvočíselnosti.

Předpokládejme, že máme nějaký efektivní algoritmus $A_a(N)$, který v závislosti na parametru a částečně testuje, jestli je přirozené číslo N prvočíslo.

Výstupem algoritmu je buď „ N je složené“ nebo „ N je možná prvočíslo“, a to:

- Pokud N je prvočíslo, pak algoritmus vždy odpoví „ N je možná prvočíslo“.
- Pokud N je složené, pak algoritmus odpoví „ N je složené“ s pravděpodobností $\geq \alpha$ (a jinak odpoví „ N je možná prvočíslo“).

Přičemž α je nějaká fixní pravděpodobnost nezávislá na a ani N , např. $\alpha = 0,5$ nebo $\alpha = 0,1$.

Tedy o prvočíslech algoritmus nikdy nelže, kdežto u složených čísel může dát obě odpovědi (ale pokud odpoví, že N je složené, tak je to pravda).

Pokud byla odpověď „ N je složené“, pak také říkáme, že a je *svědek složenosti* N ; pokud je odpověď „ N je možná prvočíslo“ (a N je složené), pak a je *lhář*.

Fermatův test, v němž testujeme, jestli $a^{N-1} \equiv 1 \pmod{N}$, je skoro takovýmto testem – až na to, že pro Carmichaelova čísla skoro žádní svědci neexistují (jediní svědci jsou soudělní $(a, N) > 1$, ale stejně je pro ně pravděpodobnost odhalení složeného čísla $\alpha = 0$). Poznamenejme, že tento test je efektivní, protože *umocňovat modulo N umíme rychle*. Pro detaily viz kurz Algebry, ale základní myšlenka je založená na tom, že napřed spočítáme hodnoty $a^2 \pmod{N}$, $a^4 \pmod{N}$, $a^8 \pmod{N}$, … postupným umocňováním na druhou. Číslo n potom vyjádříme ve dvojkové soustavě, takže k výpočtu $a^n \pmod{N}$ stačí vynásobit příslušné hodnoty $a^{2^j} \pmod{N}$.

Tyto výpočty navíc jde zrychlit použitím rychlého násobení (např.) založeného na diskrétní Fourierově transformaci.

Mohlo by se zdát, že test s pravděpodobností úspěchu třeba $\alpha = 0,5$ je na nic. Výhodou ale je, že test můžeme opakovat pro různé volby parametru a ! Když takto vyzkoušíme 10 různých a (která musí být zvolena náhodně tak, aby příslušné experimenty byly nezávislé), tak hned máme pravděpodobnost odhalení složeného čísla $1 - 0,5^{10} = 0,999$.

Se zvyšujícím počtem opakování testu tedy umíme dostat libovolně velkou pravděpodobnost úspěchu, což pro praktické účely stačí.

5.3 Solovay–Strassenův test prvočíselnosti

Je-li N liché složené číslo, nemusí platit $(\frac{a}{N}) \equiv a^{\frac{N-1}{2}} \pmod{N}$ (kdežto pro prvočíslo to platit musí). Obě strany této kongruence umíme rychle počítat (tu levou pomocí kvadratické reciprocity pro Jacobiho symboly), takže můžeme zkoušet různá a a testovat to, což dává Solovay–Strassenův test prvočíselnosti.

Je-li N složené, tak vždy existuje a , pro které platí $(\frac{a}{N}) \not\equiv a^{\frac{N-1}{2}} \pmod{N}$; dokonce většina $a \pmod{N}$ má tuto vlastnost.

Tento test prvočíselnosti je tedy pravděpodobnostní: pokud najdeme jediný protipříklad na $(\frac{a}{N}) \equiv a^{\frac{N-1}{2}} \pmod{N}$, tak víme, že N je složené. Naopak pokud vyzkoušíme dost různých a , pak můžeme říct, že N je s vysokou pravděpodobností prvočíslo.

Formálně, pro N přirozené a $(a, N) = 1$,

$$\text{algoritmus } A_a(N) \text{ vrátí } \begin{cases} N \text{ je složené,} & \text{pokud } (\frac{a}{N}) \not\equiv a^{\frac{N-1}{2}} \pmod{N}, \\ N \text{ je možná prvočíslo,} & \text{pokud } (\frac{a}{N}) \equiv a^{\frac{N-1}{2}} \pmod{N}. \end{cases}$$

Přičemž pravděpodobnost odhalení složeného čísla $\alpha = 0,5$ (toto je samozřejmě potřeba dokázat, můžete zkousit jako cvičení).

Dokonce za předpokladu platnosti zobecněné Riemannovy hypotézy jde takto sestavit deterministický polynomiální test prvočíselnosti.

Historicky byl tento test poměrně významný, později ho ale zastínil Rabin–Millerův test (viz sekci 5.7).

Pro více detailů o tomto testu viz článek Keitha Conrada nebo bakalářku Sáry Vyhnašové.
<https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/ugradnumthy/solovaystrassen.pdf>
<https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/209396/>

Poznamenejme, že na podobné myšlence je založený také Goldwasser–Micaliho kryptosystém. Jednotlivé byty zprávy jsou v něm kódované pomocí hodnot $a \pmod{pq}$ (pro velká prvočísla p, q) takových, že Jacobiho symbol $\left(\frac{a}{pq}\right) = 1$, přičemž a kóduje 0, pokud je to kvadratický zbytek modulo pq , a 1, pokud jde o nezbytek. Viz například
https://en.wikipedia.org/wiki/Goldwasser%20-%20Micali_cryptosystem

5.4 Primitivní prvky pro pokročilé

V sekci 4.1 jsme už potkali základní verzi primitivních prvků. Jejich algebraická formulace je následující:

Primitivní prvky. Bud' p prvočíslo. Pak $\mathbb{Z}_p^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_{p-1}(+)$ je cyklická grupa, libovolný její generátor se nazývá *primitivní prvek*. Jde o speciální případ věty 5.1, jejíž důkaz je níže (ale bere se také na Algebře).

Jak to je se strukturou \mathbb{Z}_n^* pro složené n ?

Čínská zbytková věta. $\mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$ jako okruh, kde $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ a izomorfismus je daný zobrazením $a \mapsto (a \pmod{p_1^{e_1}}, \dots, a \pmod{p_k^{e_k}})$.

Proto $\mathbb{Z}_n^* \simeq \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}^*$ (cvičení).

Tedy stačí určit strukturu $\mathbb{Z}_{p^e}^*$, což ted' uděláme.

Napřed si ale ještě pro úplnost uvedeme i důkaz existence primitivních prvků modulo p .

Věta 5.1. *Bud' K těleso a G konečná podgrupa množiny $K^*(\cdot)$. Pak je G cyklická.*

Speciálně jde věta použít pro podgrupu \mathbb{Z}_p^* tělesa \mathbb{Z}_p .

Důkaz. Bud' n řád (= počet prvků) grupy G . Podle Lagrangeovy věty pak řád každého prvku $g \in G$ dělí n . Pro $d \mid n$ bud' $\tau(d)$ počet prvků řádu d v G . Zřejmě pak $n = \sum_{d \mid n} \tau(d)$, kde sčítáme přes všechna přirozená čísla d , která dělají n .

Chceme dokázat, že $\tau(d) \leq \varphi(d)$ pro každé $d \mid n$, protože pak $n = \sum_{d \mid n} \tau(d) = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$ implikuje, že dokonce $\tau(d) = \varphi(d)$ pro každé $d \mid n$. Každý z $\tau(n) = \varphi(n)$ prvků řádu rovného n pak generuje G .

Pro spor tedy předpokládejme, že $\tau(d) > \varphi(d)$ pro nějaké $d \mid n$. Využijeme toho, že každý prvek řádu d v G je kořenem polynomu $x^d - 1$ nad tělesem K .

Bud' g nějaký prvek řádu d . Pak i každý z d prvků cyklické grupy $\{g^i \mid 0 \leq i < d\} \simeq \mathbb{Z}_d$ je kořenem polynomu $x^d - 1$ (neboť $(g^i)^d = (g^d)^i = 1^i = 1$).

Ovšem cyklická grupa \mathbb{Z}_d obsahuje právě $\varphi(d)$ prvků řádu rovného d – jsou to přesně g^i pro $(i, d) = 1$ (cvičení). Protože $\tau(d) > \varphi(d)$, musí v G ležet nějaký prvek h , který má také řád d , ale který *neleží* v $\{g^i \mid 0 \leq i < d\} \simeq \mathbb{Z}_d$.

Dostali jsme, že polynom $x^d - 1$ nad tělesem K má stupeň d , ale aspoň $d + 1$ kořenů, a sice $g^0, g^1, \dots, g^{d-1}, h$, což je spor. \square

5.5 Valuace a mocniny

Pro příští sekci si ted' ještě připravíme dvě pomocná tvrzení o valuacích.

Lemma 5.2.

- a) $v_p(p^s - a) = v_p(a)$ pro každé $s \geq 1, 1 \leq a < p^s$.
- b) $v_p\left(\binom{p^s}{k}\right) = s - v_p(k)$ pro každé $s \geq 0, 1 \leq k \leq p^s$.

Důkaz.

a) At' $a = p^j b$, kde $j = v_p(a)$ (tedy $p \nmid b$). Protože $1 \leq a < p^s$, máme $j < s$. Tedy $p^s - a = p^s - p^j b = p^j(p^{s-j} - b)$. Protože $p \nmid p^{s-j} - b$, dostáváme $v_p(p^s - a) = j$.

b) Máme $\binom{p^s}{k} = \frac{p^s(p^s-1)(p^s-2)\dots(p^s-(k-1))}{1\cdot 2 \cdots (k-1)k}$.

Dále podle části a) máme $v_p(p^s - a) = v_p(a)$ pro $a = 1, 2, \dots, k-1$, takže se nám skoro všechny valuace ve zlomku odečtou:

$$\begin{aligned} v_p\left(\binom{p^s}{k}\right) &= v_p(p^s) + v_p(p^s - 1) + v_p(p^s - 2) + \dots + v_p(p^s - (k-1)) \\ &\quad - v_p(1) - v_p(2) - \dots - v_p(k-1) - v_p(k) = v_p(p^s) - v_p(k). \end{aligned}$$

□

Tvrzení 5.3.

a) Bud' p liché prvočíslo a $e \geq 2$. Pak

$$(1+p)^{p^{e-2}} \equiv 1 + p^{e-1} \pmod{p^e}.$$

b) At' $e \geq 3$. Pak

$$5^{2^{e-3}} \equiv 1 + 2^{e-1} \pmod{2^e}.$$

Důkaz.

a) Podle binomické věty máme

$$(1+p)^{p^{e-2}} = 1 + p^{e-2}p + \binom{p^{e-2}}{2}p^2 + \dots + \binom{p^{e-2}}{p^{e-2}}p^{p^{e-2}}.$$

Chceme: $p^e \mid \binom{p^{e-2}}{k}p^k$ pro $\forall k \geq 2$, protože pak na pravé straně kongruence zůstanou jen první dva členy.

Lemma 5.2b) dává $v_p\left(\binom{p^{e-2}}{k}p^k\right) = e-2-v_p(k)+k$. Aby toto bylo větší než e , potřebujeme $k \geq v_p(k) + 2$.

At' $k = p^j l, p \nmid l$. Pak $2 + v_p(k) = 2 + j$ a $k \geq p^j$, čili chceme $p^j \geq 2 + j$. To se dokáže snadno indukcí.

b) Dokáže se podobně jako část a) umocněním rozkladu $5 = 1 + 4$: cvičení. □

5.6 Multiplikativní grupa modulo p^e

Bud' p prvočíslo a $e \geq 1$. Pak

$$|\mathbb{Z}_{p^e}^*| = \varphi(p^e) = (p-1)p^{e-1}.$$

Zároveň $\mathbb{Z}_p^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_{p-1}(+)$. Jaká je struktura pro $e \geq 2$?

Budeme často pracovat s řádem prvku g v grupě G . Připomeňme, že tím myslíme nejmenší pírozené číslo m takové, že $g^m = 1$; často ho budeme značit jako $\text{ord } g$.

Také když budeme mluvit o \mathbb{Z}_n^* jako o grupě, myslíme tím vždy multiplikativní grupu $\mathbb{Z}_n^*(\cdot)$. Naopak \mathbb{Z}_n myslíme vždy aditivní grupu $\mathbb{Z}_n(+)$.

Lemma 5.4. a) Je-li p liché prvočíslo, pak množina

$$P := \{1 + ap \mid 0 \leq a < p^{e-1}\} < \mathbb{Z}_{p^e}^*$$

tvoří cyklickou podgrupu $\mathbb{Z}_{p^e}^*$, která má řád p^{e-1} a je generovaná prvkem $1 + p$.

b) $P := \{1 + 4a \mid 0 \leq a < 2^{e-2}\}$ je cyklická podgrupa $\mathbb{Z}_{2^e}^*$ řádu 2^{e-2} generovaná prvkem 5.

Důkaz. a) Máme

$$(1 + ap)(1 + bp) = 1 + (a + b + abp)p = 1 + [(a + b + abp) \pmod{p^{e-1}}] p \in P,$$

takže P je uzavřené na násobení. P je tedy podgrupa díky následujícímu cvičení; její řád je zřejmě p^{e-1} .

Cvičení (z algebry). Bud' $G(\cdot)$ konečná grupa a P její podmnožina, která je uzavřená na násobení. Pak je P podgrupa G .

Prvek $1 + p$ patří do P , takže $\text{ord}(1 + p) \mid p^{e-1}$ podle Lagrangeovy věty. Tvrzení 5.3a) ale říká, že $(1 + p)^{p^{e-2}} \neq 1$ v $\mathbb{Z}_{p^e}^*$. Tedy jediná možnost je $\text{ord}(1 + p) = p^{e-1}$, takže $1 + p$ generuje P .

b) Analogicky. \square

Věta 5.5.

a) Je-li p liché prvočíslo a $e \geq 1$, pak

$$\mathbb{Z}_{p^e}^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_{p-1}(+) \times \mathbb{Z}_{p^{e-1}}(+) \simeq \mathbb{Z}_{(p-1)p^{e-1}}(+)$$

je cyklická grupa.

b) Je-li $e \geq 2$, pak

$$\mathbb{Z}_{2^e}^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_2(+) \times \mathbb{Z}_{2^{e-2}}(+).$$

Toto není cyklická grupa, pokud $e \geq 3$.

Důkaz. Druhá část je o něco lehčí dokázat, takže s ní začneme.

b) Každý prvek v $\mathbb{Z}_{2^e}^*$ je kongruentní 1 nebo $-1 \pmod{4}$, a tedy jde vyjádřit jednoznačně jako

$$\pm 1 \cdot (1 + 4a) \text{ pro nějaké } 0 \leq a < 2^{e-2}.$$

Podle předchozího lemmatu 5.4b) je dále

$$P = \{1 + 4a \mid 0 \leq a < 2^{e-2}\} = \{5^j \mid j = 0, \dots, 2^{e-2} - 1\} < \mathbb{Z}_{2^e}^*.$$

Tedy každý prvek $\mathbb{Z}_{2^e}^*$ je tvaru $(-1)^i 5^j$ pro jednoznačné $i = 0, 1; j = 0, \dots, 2^{e-2} - 1$. Máme tedy zobrazení

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{e-2}} &\rightarrow \mathbb{Z}_{2^e}^* \\ (i, j) &\mapsto (-1)^i 5^j, \end{aligned}$$

což je bijekce a zřejmě i homomorfismus.

Nejedná se o cyklickou grupu, protože každý prvek $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{e-2}}$ má řád nejvýše 2^{e-2} (protože $2^{e-2}(i, j) = 0$ v $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{e-2}}$).

a) K důkazu první části využijeme následujícího lemmatu; nalezený prvek u bude hrát roli prvku -1 z důkazu předchozí části.

Lemma. Existuje prvek $u \in \mathbb{Z}_{p^e}^*$ takový, že $\text{ord}(u) = p - 1$.

Důkaz. Bud' $g \in \mathbb{Z}_p^*$ primitivní prvek. Máme surjekci

$$\pi : \mathbb{Z}_{p^e} \rightarrow \mathbb{Z}_p; a \mapsto a \pmod{p}.$$

Bud' $v \in \mathbb{Z}_{p^e}$ nějaký vzor g , tedy $\pi(v) = g$. Protože $p \nmid g$, také $p \nmid v$, čili $v \in \mathbb{Z}_{p^e}^*$.

Bud' k řád prvku v v $\mathbb{Z}_{p^e}^*$. Pak v \mathbb{Z}_p^* platí $1 = \pi(v^k) = (\pi(v))^k = g^k$. Jelikož g má řád $p - 1$, tak $p - 1 \mid k$, proto at' $k = (p - 1)l$. Pak prvek $u = v^l$ má řád $k/l = p - 1$ v $\mathbb{Z}_{p^e}^*$. \square

Připomeňme, že podle lemmatu 5.4a)

$$P = \{1 + ap \mid 0 \leq a < p^{e-1}\} = \{(1 + p)^j \mid 0 \leq j < p^{e-1}\}.$$

Uvažujme nyní prvek u^i pro nějaké $i = 1, \dots, p - 2$. Tento prvek má řád, který dělí $p - 1$ a je ostře větší než 1. Tedy $\text{ord}(u^i)$ není mocninou p , takže $u^i \notin P$.

Podívejme se ted' množinu

$$M = \{u^i(1 + p)^j \mid i = 0, \dots, p - 2; j = 0, \dots, p^{e-1} - 1\} \subseteq \mathbb{Z}_{p^e}^*.$$

Její prvky jsou po dvou různé (cvičení) a jejich počet je $(p - 1)p^{e-1} = |\mathbb{Z}_{p^e}^*|$, takže $M = \mathbb{Z}_{p^e}^*$ a každý prvek $\mathbb{Z}_{p^e}^*$ jde jednoznačně vyjádřit jako $u^i(1 + p)^j$.

To dává hledaný izomorfismus

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_{p-1} \times \mathbb{Z}_{p^{e-1}} &\rightarrow \mathbb{Z}_{p^e}^* \\ (i, j) &\mapsto u^i(1 + p)^j. \end{aligned}$$

Navíc podle čínské zbytkové věty je tato grupa izomorfní $\mathbb{Z}_{(p-1)p^{e-1}}$. \square

Důsledek 5.6. Bud' $n \geq 2$. Pak \mathbb{Z}_n^* je cyklická grupa, právě když $n = 2, 4, p^e, 2p^e$ pro liché prvočíslo $p, e \geq 1$.

Důkaz. Použijte ČZV (cvičení). \square

Dále chceme využít strukturu \mathbb{Z}_n^* ke zformulovaní lepšího testu prvočíselnosti, než je ten Fermatův.

5.6* Alternativní důkaz existence primitivních prvků

Tento důkaz sepsal Martin Čech na základě přednášek Andrewa Granvillea (je psán asi o něco stručněji, než jiné důkazy ve skriptech). Tento důkaz nepřednášíme (ani nebude u zkoušky), a to hlavně proto, že sice dokáže existenci primitivních prvků modulo p^e o něco jednodušejí než důkaz v předcházející sekci, ale zase nic neřekne o tom, jak vypadají grupy $\mathbb{Z}_{2^e}^*(\cdot)$. (Na zkouškové písemce ale příslušnou část věty 5.5 samozřejmě můžete dokázat i

takto; stejně tak v početních zkouškových příkladech můžete případně hledat primitivní prvky takto, pokud správně zformulujete tvrzení, která přitom používáte.)

Bud' p liché prvočíslo. Ukážeme, že pokud a je primitivní prvek modulo p , pak a nebo $a+p$ je primitivní prvek modulo p^2 . Podobný důkaz navíc funguje indukcí i pro libovolnou vyšší mocninu p .

Navíc platí, že pokud a je primitivní prvek modulo p^2 , pak a je primitivní prvek modulo p^ℓ pro všechna ℓ .

Primitivní prvek modulo p^2

Bud' a primitivní prvek modulo liché prvočíslo p . Ukážeme, že bud' a nebo $a+p$ je primitivní prvek modulo p^2 .

Jaký může být řád a modulo p^2 ? Určitě to musí být násobek $p-1$. Navíc $a^{p-1} \equiv 1 + kp \pmod{p^2}$ pro nějaké k .

Pokud $k \neq 0$, pak

$$a^{r(p-1)} \equiv (1 + kp)^r \equiv 1 + rkp \pmod{p^2},$$

což může být $\equiv 1$ jenom když $p|r$. Tím pádem pokud $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, pak už a je primitivní prvek modulo p^2 .

Pokud $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$, tj. řád a modulo p^2 je přesně $p-1$, pak můžeme místo a vzít $a+p$: to je taky primitivní prvek modulo p , takže jeho řád bude násobek $p-1$ a navíc

$$(a+p)^{p-1} \equiv a^{p-1} + (p-1)p \equiv 1 + (p-1)p \pmod{p^2},$$

tudíž „nové k “ pro tenhle prvek je $p-1 \not\equiv 0 \pmod{p}$, a jeho řád je tedy podle důkazu nahoře $p(p-1) = \varphi(p^2)$.

Primitivní prvek modulo p^ℓ pro $\ell \geq 3$

Nechť a je primitivní prvek modulo $p^{\ell-1}$. Pak stejně jako nahoře je bud' a nebo $a+p$ primitivní prvek modulo p^ℓ .

Řád a modulo p^ℓ je násobek $\varphi(p^{\ell-1})$ a máme

$$a^{\varphi(p^{\ell-1})} \equiv 1 + kp^{\ell-1} \pmod{p^\ell},$$

takže

$$a^{r \cdot \varphi(p^{\ell-1})} \equiv (1 + kp^{\ell-1})^r \equiv 1 + rkp^{\ell-1} \pmod{p^\ell}.$$

Vidíme, že pokud $k \neq 0$ výsledek je $\equiv 1 \pmod{p^\ell}$ jen když $p|r$, tj. řád bude aspoň $p \cdot \varphi(p^{\ell-1}) = \varphi(p^\ell)$.

Pokud $k = 0$, pak můžeme stejně jako nahoře nahradit a za $a+p^{\ell-1}$.

Primitivní prvek modulo p^2 je primitivní prvek modulo p^ℓ pro všechna $\ell \geq 3$

Z důkazu nahoře víme, že a je primitivní prvek modulo p^2 , pokud $a^{p-1} \equiv 1 + kp \pmod{p^2}$ pro nějaké $k \neq 0$. Pro takové a máme

$$a^{r(p-1)} \equiv (1 + pk)^r \equiv 1 + \sum_{n=1}^{\ell-1} \binom{r}{n} p^n k^n \pmod{p^\ell}.$$

První člen v sumě je rpk a druhý je $r(r-1)p^2k^2/2$, takže mají různou p -valuaci, první člen je navíc $\equiv 0 \pmod{p^\ell}$, právě když $p^{\ell-1}|r$. Tím pádem řád a je aspoň $(p-1)p^{\ell-1} = \varphi(p^\ell)$, takže a je primitivní prvek modulo p^ℓ .

5.7 Rabin-Millerův test

Idea.

Bud' $p > 2$ prvočíslo, $a \in \mathbb{Z}$ nesoudělné s p .

MFV: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Ať $p = 2k + 1$, čili $(a^k)^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Tedy a^k je kořen polynomu $x^2 - 1$ nad tělesem \mathbb{Z}_p . $x^2 - 1$ má právě dva kořeny ± 1 (protože jsme nad tělesem), takže $a^k \equiv 1, -1 \pmod{p}$. Pokud je k sudé a $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, můžeme pokračovat.

Obecněji: Ať $p - 1 = 2^e m$ pro m liché.

Pak

$$a^{2^e m} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a^{2^{e-1} m} \equiv 1, -1 \pmod{p}.$$

Pokud je to -1 , tak skončíme. Jinak opět máme $a^{2^{e-1} m} \equiv 1 \pmod{p}$, takže $a^{2^{e-2} m}$ je kořen $x^2 - 1$, a tedy $a^{2^{e-2} m} \equiv \pm 1 \pmod{p}$. Takto pokračujeme, dokud nějaké $a^{2^j m} \equiv -1 \pmod{p}$, nebo než dostaneme $a^m \equiv 1 \pmod{p}$. Dokázali jsme tím následující tvrzení:

Tvrzení 5.7. Bud' $p > 2$ prvočíslo, kde $p - 1 = 2^e m$ pro liché m . Pro každé $a \in \mathbb{Z}_p^*$ máme $a^{m \cdot 2^j} \equiv -1 \pmod{p}$ pro nějaké $0 \leq j < e$ nebo $a^m \equiv 1 \pmod{p}$.

Definice. Bud' $N \in \mathbb{N}$ složené liché, $N - 1 = 2^e m$, m liché. Pokud pro $0 < a < N$ platí, že

$$(\heartsuit) \quad \begin{cases} a^{m \cdot 2^j} \equiv -1 \pmod{N} & \text{pro nějaké } 0 \leq j < e, \text{ nebo} \\ a^m \equiv 1 \pmod{N}, & \end{cases}$$

nazývá se N silné pseudoprvočíslo v bázi a , neboli a je lhář pro N .

Naopak, pokud a nesplňuje podmínu (\heartsuit) , nazývá se a svědek složenosti N .

Několik poznámek:

- N je (slabé) pseudoprvočíslo v bázi a , pokud platí MFV, čili $a^{N-1} \equiv 1 \pmod{N}$.
- Pokud je $(a, N) > 1$, pak je a vždy svědek. Těchto soudělných svědků ale může být velmi málo.

Rabin-Millerův test prvočíselnosti spočívá v testování, zda různá čísla a jsou svědci nebo lháři: jakmile najdeme jednoho svědka, tak podle tvrzení 5.7 víme, že N musí být složené. Formálněji, algoritmus $A_a(N)$ dle sekce 5.2 testuje, zda platí podmínka (\heartsuit) .

Existují ale svědci vždy (čili je pravděpodobnost $\alpha > 0$)?

Například pro Fermatův test prvočíselnosti v případě Carmichaelových čísel jsou jedinými svědky, pro které platí $a^{N-1} \not\equiv 1 \pmod{N}$, čísla a soudělná s N .

Pro Rabin-Millerův test naštěstí vždy existuje dostatek svědků:

Věta 5.8. Bud' N liché složené číslo. Pak počet a , $0 < a < N$, takových, že N je silné pseudoprvočíslo v bázi a , je menší než $\frac{N}{2}$. Tedy existuje alespoň $\frac{N}{2}$ svědků.

Tuto větu si dokážeme v sekci 5.9 poté, co napřed vybudujeme teorii kolem míjení involucí.

Stačí tedy testovat dostatečně mnoho různých (nezávislých) hodnot a . Otestujeme-li:

- 1 hodnotu ... pravděpodobnost(lhář) < $\frac{1}{2}$;
- 2 hodnoty ... pravděpodobnost(oba lháři) < $\frac{1}{4}$;
- \vdots
- k hodnot ... pravděpodobnost(všichni lháři) < $\frac{1}{2^k}$.

Dokonce sa dá dokázat, že počet lhářů je < $\frac{N}{4}$, viz skripta Aleše Drápala [Dr, sekce 2.13] – je to jen trochu techničtější.

Pomocí Bayesovy věty se pak dá i odhadnout, že pokud číslo N Rabin-Millerovým testem k -krát úspěšně prošlo, pak je N prvočíslo s pravděpodobností větší než $1 - \frac{\log N - 1}{4^k}$.

5.8 Míjení involucí

Půjde o technický nástroj užitečný k důkazu správnosti Rabin-Millerova testu.

Definice. Bud' $G(\cdot)$ grupa, $a, b \in G$. Prvek a míjí prvek b , pokud $a^i \neq b$ a $b^i \neq a$ pro všechna $i \in \mathbb{Z}$, čili $b \notin \langle a \rangle$ a $a \notin \langle b \rangle$.

Zřejmě a míjí b , právě když b míjí a (jde tedy o symetrickou relaci, jež ale např. není tranzitivní ani reflexivní).

Jako první rozvíčku si rozmysleme toto lemma (které se nám později bude hodit).

Lemma 5.9. *Mějme grupu $G = A \times B$, kde A, B jsou konečné grupy, a její prvek $(e, f) \in G$.*

Jestliže počet prvků $a \in A$, jež míjí e , je aspoň $\alpha \cdot |A|$ (pro nějaké $\alpha \in \mathbb{R}$), pak počet prvků $g \in G$, jež míjí (e, f) , je aspoň $\alpha \cdot |G|$.

Důkaz. Máme $|G| = |A| \cdot |B|$ a stačí si uvědomit, že pokud a míjí e , pak (a, b) míjí (e, f) pro všechna $b \in B$. \square

Definice. Bud' $G(\cdot)$ grupa. Prvek $a \in G$ je involuce, pokud má řád 2, čili $a \neq 1$ a $a^2 = 1$.

Příklad. $\mathbb{Z}_{2^k}(+)$ má právě jednu involuci, a to prvek 2^{k-1} .

Poznámka. Je-li e involuce, pak a míjí e , právě když $a \neq 1$ a $e \neq a^i$ pro všechna $i \in \mathbb{Z}$.

Lemma 5.10. *Bud' $G = G_1 \times \cdots \times G_k$. Řád prvku $a = (a_1, \dots, a_k)$ v G je roven nejmenšímu společnému násobku řádů prvků a_1 v G_1 , a_2 v G_2, \dots, a_k v G_k .*

Důkaz. At' d_i je řád a_i v grupě G_i a d je řád prvku a v grupě G . Bud' $n = \text{nsn}(d_1, \dots, d_k)$. Pak $a_i^n = 1$ pro každé i , a tedy $a^n = 1$. Tedy $d \mid n$, protože d je řád prvku a v G .

Naopak, pokud $a^d = 1$, pak $a_i^d = 1$ pro každé i , takže $d_i \mid d$ pro každé i , tedy $n \mid d$. Dohromady dostáváme $d = n$. \square

Důsledek 5.11. *Bud' p prvočíslo a k_1, \dots, k_r přirozená čísla.*

Prvek $a = (a_1, \dots, a_r) \in \mathbb{Z}_{p^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{k_r}}$ má řád p^s , kde

$$s = \max(k_1 - v_p^*(a_1), \dots, k_r - v_p^*(a_r)).$$

Tady pro $c \in \mathbb{Z}_{p^k}$ používáme upravené značení:

- $v_p^*(c) := v_p(c)$ je exponent p v prvočíselném rozkladu čísla $c \in \{1, 2, \dots, p^k - 1\}$,

- $v_p^*(0) := v_p(p^k) = k$.

Připomeňme, že $v_p(a)$ je exponent p v prvočíselném rozkladu čísla $a \in \mathbb{Z}$, kdežto v důsledku jsme potřebovali pracovat s valuacemi prvků \mathbb{Z}_{p^k} .

Naštěstí platí

Cvičení. Pro $a, b \not\equiv 0 \pmod{p^k}$ platí

- $a \equiv b \pmod{p^k} \Rightarrow v_p(a) = v_p(b)$,
- $v_p^*(ab) = \min(v_p^*(a) + v_p^*(b), k)$.

Důkaz důsledku 5.11. Klíčem je dokázat důsledek v případě $r = 1$.

Prvek $a = 0$ má řád $1 = p^0$, což sedí s tím, co chceme dokázat.

Mějme prvek $0 \neq a \in \mathbb{Z}_{p^k}$; ať $a = p^v b$, kde $v = v_p^*(a)$ a $p \nmid b$. Pak se ověří, že řád prvku a v \mathbb{Z}_{p^k} je rovný p^{k-v} (cvičení).

Pro $r > 1$ pak podle lemmatu 5.10 a případu $r = 1$ víme, že řád a se rovná

$$\text{nsn}(p^{k_1 - v_p^*(a_1)}, \dots, p^{k_r - v_p^*(a_r)}) = p^s. \quad \square$$

Tvrzení 5.12. Mějme přirozená čísla k_1, k_2, \dots, k_r , kde $r \geq 2$.

Prvek $e = (2^{k_1-1}, \dots, 2^{k_r-1})$ je involuce v aditivní grupě $G = \mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}}$.

Počet prvků $a \in G$, které míjí e , je aspoň $\frac{1}{2}|G|$.

Důkaz. $e \neq 0$ a $2e = (2^{k_1}, \dots, 2^{k_r}) = 0$, takže e opravdu je involuce.

Ať $a = (a_1, \dots, a_r) \in G$.

Dokažme napřed, že

$$a \text{ nemíjí } e \Leftrightarrow \text{ord}(a_i) \text{ je stejný pro všechna } i.$$

Pro $a = 0$ tato ekvivalence platí; dále ať $a \neq 0$.

„ \Rightarrow “ Ať

$$ma = (ma_1, \dots, ma_r) = e.$$

Ať $m = 2^j s$, kde $2 \nmid s$ (čili $j = v_2(m)$).

Prvek $s2^j a_i = 2^{k_i-1}$ pak má řád 2 v $\mathbb{Z}_{2^{k_i}}$. Důsledek 5.11 aplikovaný na tento prvek ($a = 1$) dává $2 = 2^1$, tedy $1 = k_i - v_2(s2^j a_i)$.

Odtud vidíme, že $v_2(a_i) = k_i - j - 1$, takže opět podle důsledku je řád $\text{ord}(a_i) = 2^{j+1}$.

Tedy všechny prvky a_i opravdu mají v $\mathbb{Z}_{2^{k_i}}$ stejné řády 2^{j+1} .

„ \Leftarrow “ Pokud $\text{ord}(a_i) = 2^h$ pro všechna i , pak $m := 2^{h-1}$ splňuje, že $ma = (ma_1, \dots, ma_r) = e$ (protože ma_i pak má řád 2 v $\mathbb{Z}_{2^{k_i}}$ a jediný takový prvek je 2^{k_i-1}).

Dokázali jsme, že

$$a \text{ míjí } e \Leftrightarrow \text{ord}(a_i) \neq \text{ord}(a_j) \text{ pro nějaké } i \neq j.$$

Nyní potřebujeme udělat dolní odhad na počet takovýchto prvků pro $r = 2$, přičemž rozlišíme dva případy:

a) $k_1 = k_2 = k$. Pokud a je liché, pak má řád 2^k , zatímco sudé b má řád $\leq 2^{k-1}$. Tedy (a, b) i (b, a) míjí e . Takovýchto dvojic je

$$2_{\text{liché}}^{k-1} \cdot 2_{\text{sudé}}^{k-1} + 2_{\text{sudé}}^{k-1} \cdot 2_{\text{liché}}^{k-1} = 2^{2k-2} = \frac{1}{2}2^{2k} = \frac{1}{2}|G|.$$

b) $k_1 \neq k_2$, přičemž býme předpokládejme $k_1 > k_2$.

Pokud je $a \in \mathbb{Z}_{2^{k_1}}^*$ (čili a je liché), má řád 2^{k_1} , ale každý prvek $b \in \mathbb{Z}_{2^{k_2}}$ má řád $\leq 2^{k_2} < 2^{k_1}$.

Tedy všechny prvky $\{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}_{2^{k_1}}^*, b \in \mathbb{Z}_{2^{k_2}}\}$ míví e a je jich $2^{k_1-1}2^{k_2} = \frac{|G|}{2}$.

At $r \geq 3$. Stačí volit $A = \mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \mathbb{Z}_{2^{k_2}}, B = \mathbb{Z}_{2^{k_3}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}}$ a použít lemma 5.9. \square

5.9 Počet Rabin-Millerových lhářů

Nyní se můžeme vrátit k Rabin-Millerovu testu. V důkazu klíčové věty 5.8 přitom použijeme jak míjení involucí, tak struktury multiplikativních grup \mathbb{Z}_N^* .

Cvičení. Argument s $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ v sekci 5.7 dokázal, že -1 je jediná involuce v $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$. Dokaž to pomocí $\mathbb{Z}_p^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_{2^e} \times \mathbb{Z}_m(+)$, kde $p-1 = 2^e m$ pro liché m .

Důkaz věty 5.8. At $N-1 = 2^e m, 2 \nmid m$.

Je-li $0 < a < N$ lhář, pak nutně $a^{2^e m} \equiv 1 \pmod{N}$. Tedy $a \in \mathbb{Z}_N$ není lhář (čili je svědek), pokud

A) a není invertibilní, to jest $a \notin \mathbb{Z}_N^*$, nebo

B) $a \in \mathbb{Z}_N^*$ má řád, který nedělí $2^e m$.

Rozlišme dva hlavní případy:

1. N není bezčtvercové, neboli $k = v_p(N) \geq 2$ pro nějaké prvočíslo p (nutně liché).

Tedy $N = p^k s, p \nmid s$. Podle ČZV máme

$$\mathbb{Z}_N \simeq \mathbb{Z}_{p^k} \times \mathbb{Z}_s \quad \text{a} \quad \mathbb{Z}_N^* \simeq \mathbb{Z}_{p^k}^* \times \mathbb{Z}_s^*.$$

Spočteme prvky v jednotlivých případech:

A) V \mathbb{Z}_{p^k} je p^{k-1} neinvertibilních prvků u . Pak (u, v) je neinvertibilní pro libovolné $v \in \mathbb{Z}_s$, takže máme aspoň $p^{k-1}s$ neinvertibilních prvků v \mathbb{Z}_N .

B) Pokud p dělí řád prvku $a \in \mathbb{Z}_N^*$, pak a splňuje B), protože $p \nmid 2^e m = N-1$, takže není možné, aby $p \mid \text{ord}(a) \mid 2^e m$. Pojd'me tedy odhadnout počet prvků, jejichž řád je dělitelný p .

Podle věty 5.5 máme

$$\mathbb{Z}_{p^k}^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_{p^{k-1}}(+) \times \mathbb{Z}_{p-1}(+).$$

V $\mathbb{Z}_{p^{k-1}}(+)$ mají všechny nenulové prvky řád dělitelný p , je jich tedy $p^{k-1} - 1$. Řád je dělitelný p po doplnění čímkoli ze \mathbb{Z}_{p-1} (podle lemmatu 5.10), takže $\mathbb{Z}_{p^k}^*(\cdot)$ má aspoň $(p^{k-1} - 1)(p - 1)$ prvků řádu dělitelného p . Připomeňme, že máme $\mathbb{Z}_N \simeq \mathbb{Z}_{p^k} \times \mathbb{Z}_s$, a pojďme tedy tyto prvky $\mathbb{Z}_{p^k}^*$ doplnit, abychom dostali prvky ze \mathbb{Z}_N .

Tyto prvky spolu s čímkoli ze \mathbb{Z}_s bud' to

- jsou neinvertibilní \Rightarrow započítáme do A (ale jde o jiné prvky, než předtím) nebo
- jsou invertibilní \Rightarrow splňují B.

Tedy máme aspoň $(p^{k-1} - 1)(p - 1)s$ dalších prvků v \mathbb{Z}_N splňujících A nebo B.

Dohromady to je aspoň

$$sp^{k-1} + (p^{k-1} - 1)(p - 1)s = s(p^k - p + 1)$$

svědků z celkem $p^k s$ prvků. Počet lhářů je tedy $\leq (p-1)s < \frac{p^k s}{2}$ (tento odhad dokaž jako cvičení; ná pověda: vlož doprostřed $\frac{p^k s}{2}$).

2. N je bezčtvercové, $N = p_1 \cdots p_r$, kde p_i jsou po 2 různá prvočísla. Dokážeme, že \mathbb{Z}_N^* obsahuje nejvýše $\frac{\varphi(N)}{2}$ lhářů: to stačí, protože prvky mimo \mathbb{Z}_N^* splňují A, takže celkem bude lhářů $\leq \frac{\varphi(N)}{2} < \frac{N}{2}$.
Até $p_i - 1 = 2^{k_i}m_i$, $2 \nmid m_i$. Máme

$$\mathbb{Z}_N^* \simeq \mathbb{Z}_{p_1}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r}^* \quad \text{a} \quad \mathbb{Z}_{p_i}^*(\cdot) \simeq \mathbb{Z}_{p_i-1}(+) \simeq \mathbb{Z}_{2^{k_i}}(+) \times \mathbb{Z}_{m_i}(+).$$

Tedy máme izomorfismus

$$\alpha : \mathbb{Z}_N^* \simeq \mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}} \times M, \quad \text{kde } M = \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}.$$

Zajímá nás podmínka $a^{m2^j} \equiv -1 \pmod{N}$, podívejme se tedy na $\alpha(-1) = \alpha(N-1)$:

První izomorfismus využívající ČZV je daný

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_N^* &\simeq \mathbb{Z}_{p_1}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r}^* \\ t &\mapsto (t \pmod{p_1}, \dots, t \pmod{p_r}) \end{aligned}$$

V něm tedy $-1 \mapsto (-1, \dots, -1)$.

Dále uvažujme

$$\mathbb{Z}_{p_i}^* \simeq \mathbb{Z}_{2^{k_i}} \times \mathbb{Z}_{m_i}.$$

-1 má řád 2 v $\mathbb{Z}_{p_i}^*$, a tedy její obraz v $\mathbb{Z}_{2^{k_i}} \times \mathbb{Z}_{m_i}$ má taky řád 2. Ale m_i je liché, takže neexistuje prvek řádu 2 v \mathbb{Z}_{m_i} , takže -1 se tam zobrazí na 0, což je prvek řádu 1 (v \mathbb{Z}_{m_i} totiž platí, že $2\varphi(-1) = 0 \Rightarrow \varphi(-1) = 0$).

Aby řád v $\mathbb{Z}_{2^{k_i}} \times \mathbb{Z}_{m_i}$ byl rovný 2, musí se -1 v $\mathbb{Z}_{2^{k_i}}$ zobrazit na prvek řádu 2. Ten je jediný, a sice 2^{k_i-1} . Tedy izomorfismus $\mathbb{Z}_{p_i}^* \simeq \mathbb{Z}_{2^{k_i}} \times \mathbb{Z}_{m_i}$ zobrazí -1 na $(2^{k_i-1}, 0)$.

Dohromady jsme dostali, že

$$\alpha(-1) = (2^{k_1-1}, \dots, 2^{k_r-1}, 0) =: (u, 0).$$

Vraťme se teď k podmínce $a^{m2^j} \equiv -1 \pmod{N}$; até $\alpha(a) = (v, c)$, kde $v \in \mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}}$, $c \in M$.

Pozorování. Pokud v míjí involuci u v $\mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}}$, pak a není lhář.

Důkaz. Até pro spor je a lhář.

a) Pokud $a^m = 1$ pro liché m , pak a má lichý řád. Ale jediný prvek lichého řádu v $\mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}}$ je 0, takže $v = 0$.

b) Pokud $a^{m2^j} = -1$, pak máme $\alpha(-1) = (u, 0)$ a $\alpha(a^{m2^j}) = m2^j\alpha(a) = (m2^jv, m2^jc)$. Tedy $u = m2^jv$.

Ani v jednom případě v neminulo u . □

Přesně kvůli tomuto jsme si chystali tvrzení 5.12!

Podle něj víme, že počet prvků v , jež míjí u , je aspoň $\frac{1}{2}|\mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}}|$, takže podle lemmatu 5.9 počet (v, c) , jež míjí $(u, 0)$, je aspoň

$$\frac{1}{2}|\mathbb{Z}_{2^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{2^{k_r}} \times M| = \frac{1}{2}|\mathbb{Z}_N^*| = \frac{\varphi(N)}{2}. \quad \square$$

6. Příklady

Následují sebrané příklady ze cvičení, domácích úkolů a písemek.

Příklady s ! jsou obzvláště důležité, ty s * jsou těžší (rozhodně ne všechny stejně).

6.1 Základy

1. Dokažte následující tvrzení, nebo najděte protipříklady:
 - (a) $a^2 \mid b^2$, právě když $a \mid b$.
 - (b) Pokud $a^2 \mid n$, $b^2 \mid n$ a $a^2 \leq b^2$, pak $a \mid b$.
 - (c) Pokud $NSD(a, b) = 1$, pak $NSD(a^n, b^m) = 1$ pro všechna $m, n \in \mathbb{N}$.
 - (d) Pokud $n^n \mid m^m$, pak $n \mid m$.
2. Rozhodněte, jestli jsou přirozená čísla a a b jednoznačně určena svým nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem.
3. Nechť A je matice typu 7×7 s prvky $a_{ij} = ij \pmod{7}$. Jaký je součet všech prvků matice A ?
4. Ukažte, že prvočíslo $p \geq 3$ dělí čitatel zlomku $1 + 1/2 + \dots + 1/(p-1)$. * Ukažte, že pokud $p \geq 5$, je tento čitatel dělitelný dokonce p^2 .
5. * Ukažte, že $n^4 + 4$ nikdy není prvočíslo.
6. * Ukažte, že pro každé n existuje n po sobě jdoucích přirozených čísel, z nichž každé je dělitelné čtvercem nějakého prvočísla.
7. * Ukažte, že pro každé n existuje n po sobě jdoucích složených čísel.

6.2 Valuace

1. ! Spočtěte $v_p(n)$ pro všechna prvočísla p a pro

- (a) $n = 250$,
- (b) $n = 51$,
- (c) $n = 61$,
- (d) $n = 170$,
- (e) $n = 360$.

2. Spočtěte

- (a) $v_2(2^{60} - 3)$,

(b) $v_3\left(\binom{81}{40}\right)$.

3. ! Ukažte, že pro prvočíslo p a $m, n \in \mathbb{Z}$ platí:

- (a) multiplikativita: $v_p(mn) = v_p(m) + v_p(n)$,
- (b) celé číslo dané zlomkem: pokud je $\frac{m}{n}$ celé číslo, tak $v_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$,
- (c) trojúhelníková nerovnost: $v_p(m+n) \geq \min\{v_p(m), v_p(n)\}$. Ukažte, že pokud $v_p(m) \neq v_p(n)$, pak nastává rovnost.

4. Najděte příklad, kdy $v_p(a+b) > \max(v_p(a), v_p(b))$.

5. Nechť p je prvočíslo, pro $c \in \mathbb{Z}_{p^k}$ značíme

- $v_p^*(c) := v_p(c)$, pokud $c \neq 0$,
- $v_p^*(0) := v_p(p^k) = k$.

Ukažte, že pro $a, b \not\equiv 0 \pmod{p^k}$ platí:

- (a) $a \equiv b \pmod{p^k} \Rightarrow v_p(a) = v_p(b)$,
- (b) $v_p^*(ab) = v_p^*(a) + v_p^*(b)$.

6. Rozmyslete si hodnoty valuace faktoriálů:

- (a) Pro přirozené číslo n a kladné reálné číslo $x \geq 1$ určete, kolik čísel z intervalu $[1, x]$ je dělitelných n .
- (b) Ukažte, že pro prvočíslo p je $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = (p-1)p^{k-1}$.
- (c) Dokažte Legendreův vzorec, že $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$. (Návod: Uvědomte si, že suma je ve skutečnosti konečná. Kolik z činitelů v $n!$ přispěje do $v_p(n!)$ jedničkou? Kolik dvojkou?)
- (d) Spočtěte kolika nulami končí číslo $100!$.
- 7. * Jsou dána přirozená čísla a, b, c splňující $a^b \mid b^c, a^c \mid c^b$. Dokažte, že $a^2 \mid bc$.
- 8. * Ukažte, že pro libovolná nezáporná celá čísla m, n platí, že $\binom{m+n}{m}$ dělí $\binom{2m}{m} \binom{2n}{n}$.
- 9. * Dokažte $2^n \nmid n!$. Obecně pro prvočíslo p dokažte $p^n \nmid ((p-1)n)!$.
- 10. * Pro přirozené číslo n dokažte $v_p(n!) \leq \lfloor \frac{n-1}{p-1} \rfloor$.
- 11. * Dokažte, že pro přirozená čísla a, b, c, d splňující $ab = cd$ platí

$$NSD(a, c) \cdot NSD(a, d) = a \cdot NSD(a, b, c, d).$$

6.3 Eulerova a Malá Fermatova věta

1. Nechť $a \in \mathbb{Z}$. Ukažte, že pokud $17 \mid a$, pak $17 \mid a^{80} - 1$.
2. Bud' p prvočíslo. Ukažte, že pokud $p \mid 2^{2^n} + 1$, pak $2^{n+1} \mid p-1$.
3. Nechť p, q jsou prvočísla taková, že $p \mid 2^q - 1$. Ukažte, že potom $q \mid p-1$.
4. Najděte příklad $m, n \in \mathbb{N}$ splňující $\varphi(m) = \varphi(n)$.
5. Nechť p, q jsou dvě různá prvočísla a a přirozené číslo nedělitelné p ani q . Ukažte, že pak $a^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$.

6. Ukažte, že prvočíslo p dělí $ab^p - ba^p$ pro libovolná celá čísla a, b .
7. Pro různá prvočísla p, q ukažte, že $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.
8. * Nechť $p > 3$ je prvočíslo. Ukažte, že potom $p \mid 2^{p-2} + 3^{p-2} + 6^{p-2} - 1$.
9. * Najděte všechna n , pro která $\varphi(n) \mid n$.

6.4 Čínská zbytková věta

1. Řešte následující soustavy kongruencí:
 - (a) $x \equiv 1 \pmod{3}, x \equiv 2 \pmod{5}, x \equiv 3 \pmod{7}$;
 - (b) $x \equiv 2 \pmod{4}, x \equiv 5 \pmod{6}, x \equiv 1 \pmod{7}$;
 - (c) $x \equiv 2 \pmod{3}, x \equiv 3 \pmod{4}, x \equiv 4 \pmod{5}$;
 - (d) $x \equiv 1 \pmod{3}, x \equiv 3 \pmod{4}, x \equiv 1 \pmod{6}$;
 - (e) $x \equiv 0 \pmod{3}, x \equiv 1 \pmod{4}, x \equiv 2 \pmod{5}$;
 - (f) $x \equiv 0 \pmod{4}, x \equiv 2 \pmod{5}, x \equiv 4 \pmod{6}$;
 - (g) $x \equiv 1 \pmod{3}, x \equiv 2 \pmod{4}, x \equiv 3 \pmod{6}$.
2. Rozmyslete si verzi Čínské zbytkové věty pro grupy:
 - (a) Najděte celočíselné řešení rovnice $3x + 5y = 1$.
 - (b) S pomocí předchozí úlohy najděte nějaký izomorfismus $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \longrightarrow \mathbb{Z}_{15}$.
3. Nechť a_1, \dots, a_k jsou po dvou soudělná přirozená čísla. Řešte následující soustavy kongruencí:
 - (a) $x \equiv 0 \pmod{a_i}$ pro $i = 1, \dots, k-1$ a $x \equiv 1 \pmod{a_k}$;
 - (b) $x \equiv 1 \pmod{a_i}$ pro $i = 1, \dots, k-1$ a $x \equiv b \pmod{a_k}$ pro nějaké celé číslo b .
4. * Zformulujte kritérium, kdy má soustava kongruencí řešení i pro soudělné moduly.
5. Ukažte, že platí opačná implikace k Čínské zbytkové větě (pro grupy), t.j. pro soudělná m, n nejsou grupy \mathbb{Z}_{mn} a $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ izomorfní, takže grupa $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ není cyklická. Jde to například takto:
 - (a) Ukažte, že součin grup $G \times H$ obsahuje podgrupy izomorfní G, H . (Nápoředa: Uvažujte množiny $\{(1, g) : g \in G\}$ resp. $\{(1, h) : h \in H\}$.)
 - (b) Ukažte, že pokud jsou m a n soudělná, pak $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ obsahuje dvě různé podgrupy rádu $\text{NSD}(m, n)$, takže nemůže být cyklická.
6. Nechť n_1, \dots, n_k jsou přirozená čísla. Jaký největší řád může mít prvek grupy $\mathbb{Z}_{n_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_k}$? Zamyslete se, jak by toho šlo využít k jinému důkazu tvrzení z předchozí úlohy.

6.5 Cyklické grupy

1. Rozhodněte, zda následující jsou (cyklické) grupy:
 - (a) Celá čísla se sčítáním.

- (b) Nenulová celá čísla s násobením.
 (c) Celá čísla dělitelná 7 se sčítáním.
 (d) Racionální čísla se sčítáním.
 (e) Nenulová racionální čísla s násobením.
 (f) Iracionální čísla se sčítáním.
 (g) Množina $\{0, 1, \dots, n-1\}$ se sčítáním modulo n .
 (h) Množina $\{1, -1, i, -i\}$ s násobením.
 (i) Množina $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ s násobením.
2. Ukažte, že grupa z příkladu 1. h) je izomorfní se \mathbb{Z}_4 . * Zobecněte.
3. ! Najděte v \mathbb{Z}_6 nenulový prvek, který nemá inverz vzhledem k násobení. * Zobecněte.
4. ! Najděte všechny generátory a podgrupy grupy \mathbb{Z}_{12} .
5. ! Určete počet prvků řádu 3 a prvků řádu 13 v grupě \mathbb{Z}_{260} .
6. * Dokažte, že každá cyklická grupa je izomorfní \mathbb{Z} nebo \mathbb{Z}_n pro nějaké n .
7. ! Najděte nějaký netriviální homomorfismus následujících grup, nebo ukažte, že žádný neexistuje:
- (a) Ze \mathbb{Z}_3 do \mathbb{Z}_6 .
 - (b) Ze \mathbb{Z}_5 do \mathbb{Z}_6 .
 - (c) Ze \mathbb{Z}_4 do \mathbb{Z}_8 .
 - (d) Ze \mathbb{Z}_4 do \mathbb{Z}_6 .
 - (e) Ze \mathbb{Z}_4 do \mathbb{Z}_7 .
8. ! Rozhodněte, zda jsou následující grupy cyklické a pokud ano, najděte v nich primitivní prvek:
- (a) \mathbb{Z}_{11}^* ,
 - (b) \mathbb{Z}_8^* .
9. ! Ukažte, že pro libovolné n je grupa \mathbb{Z}_n cyklická.
10. Rozmyslete si následující fakty o generátorech grup \mathbb{Z}_n :
- (a) ! Najděte všechny generátory grupy \mathbb{Z}_{18} .
 - (b) Které prvky \mathbb{Z}_n nemohou generovat celou grupu \mathbb{Z}_n ?
 - (c) Popište všechny generátory grupy \mathbb{Z}_n . (Návod: Bézoutovy koeficienty)
11. Rozhodněte, zda jsou následující zobrazení homomorfismy grup:
- (a) $\varphi : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_3$, $\varphi(a) = a \bmod 3$
 - (b) $\varphi : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_3$, $\varphi(a) = a \bmod 3$
12. ! Najděte všechny homomorfismy z grupy $\mathbb{Z}_9(+)$ do grupy $\mathbb{Z}_6(+)$.
13. ! Určete řády všech prvků v grupách \mathbb{Z}_7 a \mathbb{Z}_7^* .
14. Rozhodněte, které z grup \mathbb{Z}_5^* , \mathbb{Z}_6^* , \mathbb{Z}_9^* , \mathbb{Z}_{12}^* jsou cyklické.

15. ! Najděte prvky \mathbb{Z}_p^* , kde p je prvočíslo. Kolik má prvků? Kolik má primitivních prvků?
16. ! Z věty víme, že pro každé prvočíslo p existuje primitivní prvek modulo p .
 - (a) Najděte nějaký primitivní prvek modulo 3, 5 a 7.
 - (b) Pomocí části a) sestrojte izomorfismus grup \mathbb{Z}_7^* a \mathbb{Z}_6 .
17. Najděte všechny primitivní prvky modulo 7.
18. Víme, že grupa \mathbb{Z}_p^* , p prvočíslo, je cyklická, označme nějaký její generátor a .
 - (a) Jaký řád má a v grupe \mathbb{Z}_p^* ?
 - (b) Najděte izomorfismus grupy \mathbb{Z}_p^* a grupy \mathbb{Z}_{p-1} . (Nápořeďa: Generátor a grupy \mathbb{Z}_p^* se musí zobrazit na nějaký generátor grupy \mathbb{Z}_{p-1} .)

6.6 Fareyho zlomky

1. ! Dokažte **Cauchyho větu**: Nechť $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ jsou sousední položky seznamu F_n . Pak $bc - ad = 1$.
2. ! Najděte posloupnost Fareyho zlomků řádu 6. Jaké vlastnosti má posloupnost jejich jmenovatelů?
3. Znázorněte graf posloupnosti jmenovatelů Fareyho zlomků řádu n pro $n = 6$ a $n = 10$.
4. ! Určete počet Fareyho zlomků řádu n .
5. ! Dokažte, že pro libovolné dva zlomky $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ je $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} \geq \frac{1}{bd}$. Ukažte, že pro sousední Fareyho zlomky nastává rovnost. * Platí opačná implikace?
6. Ukažte, že posloupnost jmenovatelů prvků F_n tvoří palindrom.
7. ! Dokažte mediánovou vlastnost Fareyho zlomků: Nechť $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} < \frac{e}{f}$ jsou tři po sobě jdoucí položky seznamu F_n , kde $n \in \mathbb{N}$. Pak $\frac{c}{d} = \frac{a+e}{b+f}$.
8. ! Pomocí Fareyho zlomků dokažte **Dirichletovu větu**: Nechť $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Pak existuje nekonečně mnoho zlomků $\frac{p}{q}$ takových, že $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.
9. * Dokažte, že délka posloupnosti F_n splňuje

$$|F_n| = \frac{1}{2} \cdot \left(3 + \sum_{d=1}^n \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor^2 \right) = \frac{1}{2}(n+3)n - \sum_{d=2}^n |F_{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor}|,$$

kde $\mu(d)$ je Möbiova funkce, která je definovaná pro každé $n \in \mathbb{N}$ následovně:

- $\mu(n) = 1$, pokud n je bezčtvercové se sudým počtem prvočíselných dělitelů;
- $\mu(n) = -1$, pokud n je bezčtvercové s lichým počtem prvočíselných dělitelů;
- $\mu(n) = 0$, pokud n je dělitelné druhou mocninou nějakého prvočísla.

6.7 Řetězové zlomky

1. ! Vyjádřete následující konečné řetězové zlomky jako racionální čísla:

- (a) $[3, 5, 8]$;
 (b) $[1, 2, 3, 4]$;
 (c) $[2, 5, 1, 7]$.
2. ! Spočtěte řetězové zlomky pro následující racionální čísla:
- (a) $\frac{4}{3}$;
 (b) $\frac{25}{7}$;
 (c) $\frac{415}{93}$;
 (d) $\frac{35}{8}$;
 (e) $\frac{50}{23}$;
 (f) $\frac{34}{43}$.
3. ! Najděte řetězový zlomek a všechny sblížené zlomky čísla $\frac{87}{38}$.
4. V závislosti na n určete, jakému racionálnímu číslu se rovná zlomek $[0, \overbrace{1, 1, \dots, 1}^n]$.
5. Rozmyslete si následující rekurentní vztahy pro konečné řetězové zlomky:
- (a) $[a_0, a_1, \dots, a_n] = a_0 + [a_1, \dots, a_n]^{-1}$;
 (b) $[a_0, a_1, \dots, a_n] = \left[a_0, \dots, a_{n-1} + \frac{1}{a_n} \right]$;
 (c) $[a_0, a_1, \dots, a_n] = [a_0, \dots, a_{k-1}, [a_k, \dots, a_n]]$ pro každé $0 < k \leq n$.
6. ! K zadanému periodickému řetězovému zlomku určete příslušné reálné číslo:
- (a) $[2, \overline{5, 3}]$;
 (b) $[5, \overline{2, 4}]$;
 (c) $[1, \overline{3, 3}]$;
 (d) $[1, \overline{6, 9}]$;
 (e) $[1, \overline{1, 1, 2}]$;
 (f) $[3, \overline{4, 5}]$;
 (g) $[1, \overline{1, 2, 3}]$.
7. ! Určete řetězové zlomky a první tři sblížené zlomky čísla \sqrt{n} pro $n = 2, 3, 11, 13$.
8. Najděte řetězový zlomek zlatého řezu $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
9. ! Nechť $k \in \mathbb{N}$. Určete, čemu se rovná:
- (a) $[k, \overline{1, 2k}]$;
 (b) $[\overline{k}]$;
 (c) $[1, \overline{2, k}]$;
 (d) $[\overline{k, 2}]$.
10. Najděte n -tý sblížený zlomek ke $\frac{k+\sqrt{k^2+4}}{2}$ pro
 (a) $k = 1$;

(b) * obecné k .

11. Nechť $k \in \mathbb{N}$. Vyjádřete $\sqrt{k^2 + 1}$ a $\sqrt{k^2 - 1}$ (pro $k > 1$) jako nekonečné řetězové zlomky.
12. ! Nechť $k \in \mathbb{N}_0$. Najděte řetězový zlomek čísel
 - (a) $\sqrt{k^2 + k}$,
 - (b) $\frac{\sqrt{4n^2+4n+5}+1}{2}$,
 - (c) $\sqrt{9n^2 + 2n}$.
13. * Předpokládejte, že znáte řetězový zlomek pro prvek $\frac{p}{q}$ Fareyho posloupnosti F_q . Vyjádřete pomocí něj řetězové zlomky sousedních prvků.
14. Dokažte, že pokud máme libovolná čísla $a_0 \in \mathbb{Z}$, $a_i \in \mathbb{N}$ pro $i \geq 1$, tak existuje právě jedno reálné číslo ξ , že $[a_0, a_1, \dots]$ je řetězovým zlomkem ξ . Jde postupovat například následujícími kroky:
 - (a) Označme klasicky $\frac{p_n}{q_n} = [a_0, a_1, \dots, a_n]$. Cílem bude ukázat, že to splňuje číslo $\xi := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}$.
 - (b) Z identit z přednášky ukažte $\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| < \frac{1}{q_n^2}$. Pomocí tohoto a znalosti konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ukažte, že je posloupnost $\frac{p_n}{q_n}$ Cauchyovská (a definice ξ je tak korektní).
 - (c) Ukažte $a_0 = \lfloor \xi \rfloor$ a podobně indukcí pro další koeficienty.
15. * Ukažte, že pokud je řetězový zlomek čísla $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ od jistého místa periodický, pak je α algebraické číslo stupně 2.
16. * Pokud $D \in \mathbb{N}$ není čtverec, pak je řetězový zlomek čísla \sqrt{D} od jistého místa periodický (můžete taky zkusit ukázat). Ať $\sqrt{D} = [\lfloor \sqrt{D} \rfloor, \overline{a_1, a_2, \dots, a_l}]$. Ukažte:
 - (a) Pokud $l = 1$, $a_1 = 2 \cdot \lfloor \sqrt{D} \rfloor$.
 - (b) Pokud $l = 2$, $a_2 = 2 \cdot \lfloor \sqrt{D} \rfloor$.
 - (c) Pokud $l = 3$, $a_1 = a_2$ a $a_3 = 2 \cdot \lfloor \sqrt{D} \rfloor$.
 - (d) Pro obecné l ukažte, že platí $a_i = a_{l-i}$ pro $i = 1, \dots, l-1$ a $a_l = 2 \cdot \lfloor \sqrt{D} \rfloor$.

6.8 Pellova rovnice

1. ! Řešte rovnici $x^2 - 2y^2 = 1$ v \mathbb{Z}^2 a najděte alespoň dvě konkrétní řešení (x, y) takové, že $x > 0$, $y > 0$.
2. ! Ukažte, že následující rovnice nemají v \mathbb{Z}^2 řešení:
 - (a) $x^2 - 3y^2 = -1$;
 - (b) $x^2 - 7y^2 = -1$;

(c) $x^2 - 7y^2 = -4$.

3. !V \mathbb{Z}^2 řešte rovnice:

(a) $x^2 - 3y^2 = 1$;

(b) $x^2 - 5y^2 = 1$;

(c) $x^2 - 7y^2 = 1$.

4. Ověrte, že množina všech řešení Pellovy rovnice $x^2 - my^2 = 1$ tvoří grupu.
5. Dokažte, že pokud (x, y) je řešením Pellovy rovnice $x^2 - my^2 = 1$, pak $x + y\sqrt{m} > 1 \iff x, y > 0$.
6. Dokažte, že pokud má řešení Pellova rovnice $x^2 - my^2 = -1$, pak má řešení i rovnice $x^2 - my^2 = 1$.
7. Nechť $B \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sqrt{m} \notin \mathbb{Q}$. Dokažte, že pokud má zobecněná Pellova rovnice $x^2 - my^2 = B$ alespoň jedno řešení, potom má nekonečně mnoho řešení.
8. Najděte alespoň čtyři řešení (x, y) , $x > 0$, $y > 0$ rovnice $x^2 - 3y^2 = -2$ v \mathbb{Z}^2 .
* Vyřešte tuto rovnici.
9. * Vyřešte rovnici $x^2 - 5y^2 = 2$ v \mathbb{Z}^2 .

Věta: Nechť $m \in \mathbb{N}$, $\sqrt{m} \notin \mathbb{N}$. Nechť $l \in \mathbb{N}$ je minimální takové, že $\sqrt{m} = [a_0, \overline{a_1, \dots, a_{l-1}, 2a_0}]$. Označme $\frac{p_n}{q_n}$ n -tý sblížený zlomek čísla \sqrt{m} .

- (a) Pokud je l sudé, tak rovnice $x^2 - my^2 = -1$ nemá řešení $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ a minimální řešení (x, y) rovnice $x^2 - my^2 = 1$ je rovné (p_{l-1}, q_{l-1}) .
- (b) Pokud je l liché, tak minimální řešení rovnice $x^2 - my^2 = -1$ je rovné (p_{l-1}, q_{l-1}) a minimální řešení rovnice $x^2 - my^2 = 1$ je rovné (p_{2l-1}, q_{2l-1}) . Navíc platí, že $p_{2l-1} + q_{2l-1}\sqrt{m} = (p_{l-1} + q_{l-1}\sqrt{m})^2$.

10. ! V \mathbb{Z}^2 řešte rovnice:

(a) $x^2 - 10y^2 = \pm 1$;

(b) $x^2 - 41y^2 = \pm 1$;

(c) $x^2 - 14y^2 = \pm 1$;

(d) $x^2 - 17y^2 = \pm 1$;

(e) $x^2 - 23y^2 = \pm 1$;

(f) $x^2 - 13y^2 = \pm 1$;

(g) $x^2 - 29y^2 = \pm 1$;

(h) $x^2 - 61y^2 = \pm 1$.

11. * Bud' $m \in \mathbb{N}$, $\sqrt{m} \notin \mathbb{Q}$. Předpokládejme, že rovnice $x^2 - my^2 = -1$ má řešení. Bud' $a + b\sqrt{m}$, $a, b > 0$, minimální řešení. Dokažte, že pak $\pm(a + b\sqrt{m})^k$, $k \in \mathbb{Z}$, dává všechna řešení rovnice $x^2 - my^2 = \pm 1$.
12. * Najděte všechny celočíselné hodnoty $A \in (-\sqrt{41}, \sqrt{41})$, pro které existují $x, y \in \mathbb{Z}$, že $x^2 - 41y^2 = A$.
13. Řešte v \mathbb{Z} rovnici $x^2 + y^2 - 1 = 4xy$.

14. Najděte všechna přirozená čísla n , pro která je $\frac{n(n+1)}{2}$ čtverec.
15. Ukažte, že existuje nekonečně mnoho $n \in \mathbb{N}$, že $n + 1$ i $3n + 1$ jsou druhé mocniny přirozených čísel.
16. * Bud' (x, y) celočíselným řešením rovnice $x^2 - 2y^2 = 1$. Ukažte, že $6 \mid xy$.

6.9 Dobré approximace

1. ! Určete všechny dobré approximace čísel
 - (a) $\frac{2}{5}$,
 - (b) $\frac{5}{3}$,
 - (c) $\frac{3}{10}$,
 - (d) $\frac{7}{8}$,
 - (e) $\frac{24}{7}$,
 - (f) $\frac{19}{11}$.
2. ! Najděte řetězový zlomek a všechny sblížené zlomky čísla $\frac{78}{47}$. Určete, které z nich dávají dobré approximace.
3. Nechť $n \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{\alpha\} \neq 0, \frac{1}{2}$, $n > \alpha > 0$. Nechť $\alpha = [a_0, a_1, \dots]$ a $n - \alpha = [b_0, b_1, \dots]$. Ukažte, že pak platí:
 - (a) $b_0 = n - a_0 - 1$;
 - (b) $a_1 = 1 \iff \{\alpha\} \in (\frac{1}{2}, 1) \iff b_1 \geq 2$;
 - (c) $\frac{r}{s}$ je dobrá approximace $\alpha \iff n - \frac{r}{s}$ je dobrá approximace $n - \alpha$.
4. ! Určete všechny dobré approximace čísla $\alpha \in \mathbb{R}$, pokud $\{\alpha\} = 0$, nebo $\{\alpha\} = \frac{1}{2}$.
5. ! Vyjádřete $\sqrt{10}$ jako nekonečný řetězový zlomek a nalezněte první dvě dobré approximace tohoto čísla.
6. Nalezněte prvních 5 členů řetězového zlomku $\pi = 3.1415926\dots$ a prvních 5 jeho dobrých approximací.
7. Nechť $n > 0$ a nechť $\frac{p_n}{q_n}$ je n -tý sblížený zlomek čísla $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $\alpha > 0$. Pak každý jiný zlomek $\frac{p}{q}$ s jmenovatelem q , $0 < q \leq q_n$, splňuje, že $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right|$.
8. * Ukažte, že jeden z libovolných dvou po sobě jdoucích sblížených zlomků čísla $\alpha > 0$ splňuje $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$.
9. * Ukažte, že pokud $\{\alpha\} > \frac{1}{2}$, pak sblížené zlomky $\frac{p_n}{q_n}$, $n \geq 1$, jsou všechny dobré approximace α .

6.10 Gaussovská celá čísla

1. ! Určete, čemu se rovná:

- (a) $\frac{5+i}{3+2i}$;
- (b) $N(4+3i)$;

- (c) $\overline{7 - 8i}$.
2. ! V $\mathbb{Z}[i]$ rozložte na prvočinitele čísla 7 a $5 + i$.
 3. ! Ukažte, že pro libovolné $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ platí $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta)$.
 4. ! Ukažte, že prvek $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ je invertibilní právě tehdy, když $N(\alpha) = 1$. Najděte všechny invertibilné prvky v $\mathbb{Z}[i]$.
 5. ! Ukažte, že pokud je $N(\alpha)$ prvočíslo, pak je α prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$.
 6. Nechť $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$. Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení a své tvrzení dokažte.
 - (a) Pokud $\alpha | \beta$, pak $N(\alpha) | N(\beta)$.
 - (b) Pokud $N(\alpha) | N(\beta)$, pak $\alpha | \beta$.
 - (c) Pokud $\gamma = \alpha^2 + \beta^2$, pak γ není prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$.
 7. ! V $\mathbb{Z}[i]$ platí $5 = (1 + 2i)(1 - 2i) = (2 + i)(2 - i)$. Rozmyslete si, proč to není spor s tím, že $\mathbb{Z}[i]$ je gaussovský obor.
 8. Ukažte, že α je prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$ právě tehdy, když $\overline{\alpha}$ je prvočinitel.
 9. ! Ukažte, že pro $a, b \in \mathbb{Z}$ platí, že a dělí b v \mathbb{Z} právě tehdy když a dělí b v $\mathbb{Z}[i]$.
 10. Ukažte, že pro $n \in \mathbb{Z}$ a $a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ platí, že $n|(a + bi) \iff n|a$ a $n|b$.
 11. ! V $\mathbb{Z}[i]$ rozložte na prvočinitele čísla 15 , $5 + i$, $12 + 21i$ a $3 + 21i$.
 12. V $\mathbb{Z}[i]$ určete $NSD(12 + 21i, 3 + 21i)$:
 - (a) z rozkladu na prvočinitele;
 - (b) pomocí Euklidova algoritmu a určete Bézoutovy koeficienty.
 13. Popište, které čísla v $\mathbb{Z}[i]$ jsou dělitelné $1 + i$.

6.11 Diofantické rovnice

1. ! V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 1 = y^5$.
2. ! Dokažte, že obor $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ je euklidovský.
3. ! V \mathbb{Z}^3 řešte rovnici $x^2 + y^2 = z^2$.
4. ! V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 1 = y^3$.
5. ! Dokažte, že obor $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ je euklidovský.
6. ! V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 2 = y^3$.
7. ! Najděte všechny jednotky (čili invertibilní prvky) v oboru:
 - (a) $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$,
 - (b) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$,
 - (c) $\mathbb{Z}[\sqrt{79}]$,
 - (d) $\mathbb{Z}[\sqrt{58}]$.
8. V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 8 = y^3$.
9. V \mathbb{Z}^3 řešte rovnici $x^2 + y^2 = z^3$ pro x, y nesoudělná.

10. V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 4 = y^3$ pro:
- x liché,
 - * x sudé.
11. V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 4 = 3y^3$ pro:
- x liché,
 - x sudé.
12. V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 36 = y^3$.
13. * V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 - 2 = y^3$. (Poznámka: Rovnice $1 = a^3 + 3a^2b + 6ab^2 + 2b^3$ má v \mathbb{Z}^2 jediné řešení $(a, b) = (1, 0)$.)
14. * V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 - 1 = y^3$.
15. Ukažte, že obor $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ není euklidovský, dokonce ani gaussovský. Najděte ireducelní prvek, který není prvočinitel. (Ná pověda: Zkuste rozložit 4 na součin.)
16. * Bud' $R = \mathbb{Z} \left[\frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \right] = \mathbb{Z} \left[e^{\frac{2\pi i}{3}} \right]$.
- Dokažte, že R je euklidovský s normou danou $N(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2$.
 - Určete všechny invertibilní prvky v R .
 - V \mathbb{Z}^2 řešte rovnici $x^2 + 3 = y^3$.

6.12 Kvadratické zbytky a Legendreovy symboly

- ! Najděte všechny kvadratické zbytky modulo n , kde $n = 4, 7, 8, 9, 17$.
- Nechť $x, y, z \in \mathbb{Z}$ a platí $x^2 + y^2 = z^2$. Ukažte, že potom je aspoň jedno z čísel x, y, z dělitelné 3, aspoň jedno je dělitelné 4 a aspoň jedno je dělitelné 5.
- ! Určete hodnotu výrazů
 - $\left(\frac{3}{7}\right)$,
 - $\left(\frac{-1}{7}\right)$,
 - $\left(\frac{2}{7}\right)$,
 - $\left(\frac{11}{31}\right)$,
 - $\left(\frac{17}{37}\right)$,
 - $\left(\frac{523}{269}\right)$,
 - $\left(\frac{61}{31}\right)$,
 - $\left(\frac{337}{211}\right)$,
 - $\left(\frac{367}{241}\right)$.
- ! V závislosti na prvočísle p určete hodnotu výrazů
 - $\left(\frac{3}{p}\right)$,
 - $\left(\frac{5}{p}\right)$,

- (c) $\left(\frac{7}{p}\right)$,
 (d) $\left(\frac{13}{p}\right)$,
 (e) $\left(\frac{17}{p}\right)$.
5. Bez použití kvadratické reciprocity spočtěte $\left(\frac{17}{5}\right)$ a $\left(\frac{5}{17}\right)$.
 6. ! Určete kolik řešení má kongruence $x^2 \equiv 31 \pmod{71}$ a $x^2 \equiv 293 \pmod{347}$.
 7. ! Najděte všechna prvočísla p , pro která existuje $a \in \mathbb{Z}$ takové, že $p \mid a^2 + 7$.
 8. Ukažte, že pokud $3 \mid a^2 + b^2$, pak $3 \mid a$ a $3 \mid b$.
 9. Ukažte, že pro liché n platí $8 \mid n^2 - 1$.
 10. Najděte všechna celočíselná řešení rovnice $x^2 + y^2 = 4z - 1$.
 11. Ukažte, že rovnice $x^2 + y^2 = 8z + 6$ nemá žádné celočíselné řešení. Najděte další rovnici o třech neznámých, která nemá žádné celočíselné řešení.
 12. Najděte všechna prvočísla p , pro které platí: Pokud je x kvadratický zbytek modulo p , pak je i $-x$ kvadratický zbytek modulo p .
 13. * Ukažte, že pokud $p > 3$ je prvočíslo, pak p dělí součet všech kvadratických zbytků modulo p .
 14. * Bud' p prvočíslo, $a \in \mathbb{Z}_p^*$, $b \in \mathbb{Z}$. Ukažte, že $\sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{ka+b}{p}\right) = 0$
 15. * Bud' p liché prvočíslo a $0, a_1, \dots, a_{\frac{p-1}{2}}$ všechny kvadratické zbytky modulo p . Kolik z čísel $a_1 + 1, \dots, a_{\frac{p-1}{2}} + 1$ jsou taky kvadratické zbytky modulo p ?
 16. * Ukažte, že pokud $n \in \mathbb{N}$ je kvadratický zbytek modulo každé prvočíslo, pak n je čtverec.

6.13 Charakterы a Gaussovy součty

1. ! Určete všechny charaktery modulo n a jejich řády v grupě $X(\mathbb{Z}_n^*)$ pro
 (a) $n = 3$,
 (b) $n = 5$,
 (c) $n = 7$,
 (d) $n = 4$,
 (e) $n = 8$,
 (f) $n = 12$,
 (g) $n = 17$,
 (h) $n = 18$.

Nemusíte vyčíslit hodnoty na jednotlivých prvcích, ale nějak je jednoznačně popište.

2. ! Pro každý charakter modulo 3 spočtěte jeho Gaussův součet.
 3. Ověřte, že $X(\mathbb{Z}_n^*)$ s operacemi definovanými výše tvoří grupu.
 4. ! Označme $S_n := \left\{ e^{\frac{2\pi ik}{n}} : k = 0, \dots, n-1 \right\}$ množinu všech n -tých komplexních odmocnin z 1.

- (a) Ukažte, že S_n s operací násobení (jako v \mathbb{C}) je grupa. Které grupě je S_n izomorfní?
- (b) Ukažte, že generátory grupy S_n (čili primitivní n -té odmocniny z 1) jsou právě ζ_n^k , pro které $\text{NSD}(k, n) = 1$. Určete rád zbylých prvků.
- (c) Ukažte, že součet všech prvků S_n je 0.
- (d) Nechť χ je charakter modulo n . Ukažte, že jeho obraz $Im(\chi) := \{x \in \mathbb{C}^* : \exists a \in \mathbb{Z}_n^*; x = \chi(a)\}$ je podgrupa $S_{\varphi(n)}$.
- (e) Popište všechny charaktery modulo 11, jejichž obraz je celá S_{10} .
- (f) Nechť a je kvadratický zbytek a χ charakter modulo n . Popište, jaké hodnoty může nabývat $\chi(a)$.
5. Ukažte, že Legendreův symbol $\left(\frac{a}{p}\right)$ je charakter modulo p (p prvočíslo). Najděte všechny charaktery χ modulo p takové, že $\chi^2 = \varepsilon$, kde ε značí triviální charakter.
6. Určete hodnotu $\sum_{a \in \mathbb{Z}_n} \zeta_n^a$.
7. Spočtěte Gaussův součet nějakého netriviálního charakteru modulo
- (a) 5,
(b) 7.
8. Ukažte, že pro charakter χ platí $g(\bar{\chi}) = \chi(-1)\overline{g(\chi)}$.
9. ! Bud' p prvočíslo, $p \equiv 3 \pmod{4}$, a bud' S kvadratický Gaussův součet. Podrobně ukažte, že $S \in i\mathbb{R}$, tedy že $S = i^{\frac{p-1}{2}} \cdot r$ pro nějaké $r \in \mathbb{R}$.
10. * Ukažte, že $X(\mathbb{Z}_n^*) \simeq \mathbb{Z}_n^*$.
11. * Ukažte, že pokud $k \in \mathbb{N}, a, n \in \mathbb{Z}_k^*$, pak platí:

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \in X(\mathbb{Z}_k^*)} \chi(n) \cdot \bar{\chi}(a) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } n \not\equiv a \pmod{k} \\ 1 & \text{pokud } n \equiv a \pmod{k} \end{cases}$$

6.14 Jacobiho symboly

1. ! Určete hodnotu výrazů
- (a) $\left(\frac{477}{247}\right)$,
(b) $\left(\frac{98}{51}\right)$,
(c) $\left(\frac{89}{63}\right)$,
(d) $\left(\frac{347}{221}\right)$,
(e) $\left(\frac{675}{223}\right)$,
(f) $\left(\frac{735}{263}\right)$.
2. ! Řešte kongruenci $x^2 \equiv 53 \pmod{77}$.
3. ! Vyšetřete vztah Jacobiho symbolů a kongruencí. Konkrétně:
- (a) Rozhodněte, jestli mají kongruence $x^2 \equiv 18 \pmod{127}$ a $x^2 \equiv 14 \pmod{127}$ řešení. (127 je prvočíslo.)

- (b) Řešte kongruenci $x^2 \equiv 58 \pmod{209}$. ($209 = 11 \cdot 19$)
- (c) Rozhodněte, jestli má kongruence $x^2 \equiv 58 \pmod{65}$ řešení.
- (d) Řešte kongruenci $x^2 \equiv 2 \pmod{1081}$. ($1081 = 23 \cdot 47$)
4. ! V závislosti na lichém prvočísle p určete hodnotu $\left(\frac{5}{3p}\right)$.
5. ! Nechť n je liché přirozené číslo. Pomocí vztahů pro $\left(\frac{-1}{n}\right)$ a $\left(\frac{2}{n}\right)$ určete explicitně hodnotu $\left(\frac{-1}{n}\right)$, $\left(\frac{2}{n}\right)$ a $\left(\frac{-2}{n}\right)$ v závislosti na $n \pmod{4}$, resp. 8 .
6. Vyšetřete vztah Jacobiho symbolů a kvadratických zbytků. Konkrétně:
- (a) Ukažte, že pokud $n = p_1 \cdots p_k$ je prvočíselný rozklad čísla n , pak kongruence $x^2 \equiv a \pmod{n}$ má řešení právě tehdy, když má řešení každá z kongruencí $x^2 \equiv a \pmod{p_1}, \dots, x^2 \equiv a \pmod{p_k}$.
- (b) Odvodte, že pokud $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$, pak a není kvadratický zbytek modulo n .
- (c) Najděte příklad, kdy $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ a a není kvadratický zbytek modulo n .
7. Nechť a_1, \dots, a_k jsou lichá celá čísla. Pak platí:
- (a) $\frac{a_1-1}{2} + \dots + \frac{a_k-1}{2} \equiv \frac{a_1 \cdots a_k - 1}{2} \pmod{2}$,
- (b) $\frac{a_1^2-1}{8} + \dots + \frac{a_k^2-1}{8} \equiv \frac{(a_1 \cdots a_k)^2 - 1}{8} \pmod{8}$.
8. Vyzkoušejte si testování prvočíselnosti pomocí Solovay-Strassenova testu:
- (a) Ukažte, že 15 není prvočíslo.
- (b) Ukažte, že 7 je prvočíslo.

6.15 Prvočísla speciálních tvarů

1. Dokončete důkaz tvrzení 2.18 ve skriptech:
- (a) Ukažte chybějící implikaci: Pokud pro prvočíslo $p > 2$ platí $p = a^2 + 2b^2$ pro nějaká $a, b \in \mathbb{Z}$, pak platí $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$.
- (b) Ukažte, že pro prvočíslo p platí: $p = a^2 + 2b^2$ pro nějaké $a, b \in \mathbb{Z}$, právě když p není prvočinitel v $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.
2. Uvažte obor $\mathbb{Z} \left[\frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \right]$ s normou danou $N(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2$.
- (a) Vyjádřete normu prvku $a + b\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$, $a, b \in \mathbb{Z}$.
- (b) * Ukažte, že tento obor je eukleidovský.
- (c) Najděte všechna prvočísla p taková, že kongruence $x^2 \equiv -3 \pmod{p}$ má řešení.
- (d) * Charakterizujte všechna prvočísla, která jdou napsat ve tvaru $a^2 - ab + b^2$, kde $a, b \in \mathbb{Z}$. Postupujte podobně jako v důkazu tvrzení 2.18 ve skriptech.

6.16 Rozklad na součin cyklických grup

1. ! Rozložte následující grupy na součin cyklických grup:
 - (a) \mathbb{Z}_{360}^* ,
 - (b) \mathbb{Z}_{45}^* ,
 - (c) \mathbb{Z}_{200}^* ,
 - (d) \mathbb{Z}_{64}^* ,
 - (e) \mathbb{Z}_{81}^* ,
 - (f) \mathbb{Z}_{120}^* ,
2. ! Rozložte grupy \mathbb{Z}_{150}^* , \mathbb{Z}_{294}^* a \mathbb{Z}_{400}^* na součin cyklických grup, jejichž řády jsou mocniny prvočísel.
3. ! Nechť R a S jsou komutativní okruhy s jednotkou. Dokažte:
 - (a) $(R \times S)^* = R^* \times S^*$,
 - (b) $R \cong S \implies R^* \cong S^*$.
 - (c) Pomocí Čínské věty o zbytcích dokažte: Pokud $n = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k}$ je rozklad na prvočísla, pak $\mathbb{Z}_n^* \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}}^* \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}^*$.
4. Ukažte, že $\mathbb{Z}_{24}^* \not\cong \mathbb{Z}_4^* \times \mathbb{Z}_6^*$. Rozložte \mathbb{Z}_{24}^* na součin cyklických grup.

6.17 Primitivní prvky

1. ! Najděte všechny primitivní prvky modulo 5, 11, 13 a 19.
2. ! Najděte primitivní prvek modulo n , pro
 - (a) $n = 125$,
 - (b) $n = 250$,
 - (c) $n = 17$,
 - (d) $n = 49$,
 - (e) $n = 81$,
 - (f) $n = 26$,
 - (g) $n = 98$,
 - (h) $n = 45$.
3. ! Které z následujících grup jsou cyklické?
 - (a) \mathbb{Z}_4^* ,
 - (b) \mathbb{Z}_{14}^* ,
 - (c) \mathbb{Z}_{16}^* ,
 - (d) \mathbb{Z}_{35}^* .
4. ! Najděte alespoň dva primitivní prvky modulo 49, 121. Určete celkový počet primitivních prvků modulo tyto čísla.

5. Určete počet primitivních prvků modulo p , kde p je prvočíslo.
6. Najděte izomorfismus mezi množinou $\{1, -1, i, -i\}$ s násobením a \mathbb{Z}_4 .
7. * Najděte všechny $n \in \mathbb{N}$ takové, že grupa \mathbb{Z}_n^* je cyklická.
8. Bud' $G(\cdot)$ konečná grupa a P její podmnožina, která je uzavřená na násobení. Pak je P podgrupa.
9. Dokažte, že pro $e \geq 3$ je $5^{2^{e-3}} \equiv 1 + 2^{e-1} \pmod{2^e}$.
10. Ukažte, že množina $P = \{1 + 4a \mid 0 \leq a < 2^{e-2}\} \subseteq \mathbb{Z}_{2^e}^*$ je cyklická podgrupa $\mathbb{Z}_{2^e}^*$ generovaná prvkem 5 a její řád je roven 2^{e-2} .
11. Nechť G je podgrupa grupy \mathbb{Z}_{61}^* generovaná prvky 9 a 11. Kolik má grupa G prvků? Je cyklická? Pokud ano, najděte nějaký její generátor.
12. Ukažte, že pokud p, q jsou prvočísla a $q = 4p+1$, potom 2 je primitivní prvek modulo q . (Ná pověda: Zamyslete se, jaký řád může mít prvek 2 v grupě \mathbb{Z}_q^* , a vylučte zbylé případy.)
13. Nechť a je primitivní prvek modulo prvočíslo p . Ukažte, že a není kvadratický zbytek.
14. Nechť χ je charakter a a primitivní prvek modulo prvočíslo p . V závislosti na řádu $\chi(a)$ v grupě S_{p-1} určete $|\text{Im}(\chi)|$.

6.18 Řešení kongruencí pomocí primitivních prvků

1. ! Vyřešte kongruenze

- (a) $x^3 \equiv 1 \pmod{13}$,
- (b) $x^5 \equiv 1 \pmod{13}$,
- (c) $x^{10} \equiv 1 \pmod{13}$,
- (d) $x^4 \equiv 3 \pmod{13}$,
- (e) $x^5 \equiv 2 \pmod{13}$,
- (f) $x^5 \equiv 8 \pmod{11}$,
- (g) $x^4 \equiv 9 \pmod{11}$,
- (h) $x^6 \equiv 4 \pmod{11}$,
- (i) $x^{12} \equiv -1 \pmod{17}$,
- (j) $x^{10} \equiv 16 \pmod{23}$.

6.19 Carmichaelova čísla

1. ! Ukažte, že 561 je Carmichaelovo číslo.
2. ! Ukažte, že 1105 je Carmichaelovo číslo.
3. * Zformulujte obecné kritérium, kdy je součin různých prvočísel Carmichaelovo číslo.
4. * Bud' p prvočíslo. Dokažte, že pak číslo p^k není Carmichaelovo číslo pro libovolné $k \in \mathbb{N}$.

5. * Nechť p a q jsou dvě různá prvočísla. Ukažte, že číslo $p \cdot q$ není Carmichaelovo číslo.

6.20 Involuce

1. Dokažte, že pro sudé n obsahuje grupa \mathbb{Z}_n právě jednu involuci a pro liché n neobsahuje \mathbb{Z}_n žádnou involuci. Rozmyslete si, co z toho lze vyvodit pro cyklické grupy.
2. ! Najděte všechny involuce v \mathbb{Z}_{15}^* a dokažte, že tato grupa není cyklická.
3. ! Najděte všechny involuce v grupě
 - (a) \mathbb{Z}_{30}^* ,
 - (b) \mathbb{Z}_{35}^* ,
 - (c) \mathbb{Z}_{51}^* ,
 - (d) \mathbb{Z}_{55}^* .
4. Nechť $p > 2$ je prvočíslo. Pak -1 je jediná involuce v \mathbb{Z}_p^* .
5. * Najděte všechna $n \in \mathbb{N}$ takové, že všechny prvky $\mathbb{Z}_n^* \setminus \{1\}$ jsou involuce.

6.21 Míjení prvků

1. ! V grupě \mathbb{Z}_{45} najděte všechny prvky, které míjí prvek
 - (a) 5,
 - (b) 2,
 - (c) 3.
2. ! V grupě \mathbb{Z}_{60} najděte všechny prvky, které míjí prvek
 - (a) 7,
 - (b) 2,
 - (c) 4,
 - (d) 6.
3. ! V grupě \mathbb{Z}_{72} najděte všechny prvky, které míjí prvek
 - (a) 11,
 - (b) 4.
4. ! V grupě \mathbb{Z}_{100} najděte všechny prvky, které míjí prvek
 - (a) 7,
 - (b) 5.
5. Nechť A, B jsou grupy, $(e, f) \in A \times B$, $a \in A$. Pokud a míjí e v A , pak pro každé $b \in B$ prvek (a, b) míjí prvek (e, f) v $A \times B$.
6. * Najděte obecné kritérium, kdy se v \mathbb{Z}_n míjí prvky a a b .

6.22 Rabin-Millerovi svědci a lháři

1. ! Najděte nějakého lháře různého od 1 a nesoudělného svědka pro

- (a) $N = 51$,
- (b) $N = 221$,
- (c) $N = 39$,
- (d) $N = 121$.

Poznámka: Čísla 1 a $N - 1$ budou lháři vždycky, podobně čísla soudělná s N budou vždycky svědci.

2. ! Najděte a takové, že a je lhář pro 9.

3. ! Najděte nějakého lháře (jiného jako 1) pro číslo 85 a nesoudělného svědka pro číslo 85.

4. ! Najděte všechna $0 < a < N$ taková, že a je lhář pro N pro:

- (a) $N = 15$,
- (b) $N = 21$,
- (c) $N = 27$,
- (d) $N = 35$,
- (e) $N = 77$.

5. ! Pomocí Rabin-Millerova testu ukažte, že 7 je prvočíslo.

6.23 RSA

1. ! Uvažte $p = 19$, $q = 31$ a zprávu $a = 123$. Zvolte si veřejný a soukromý klíč pro šifru RSA a zašifrujte tuto zprávu. Ověřte, že je zprávu možné rozšifrovat pomocí soukromého klíče.

2. ! V této úloze pošlete zprávu zašifrovanou pomocí RSA někomu (spolužákovi, nebo klidně i někomu jinému), kdo ji následně vyluští.

- (a) Zvolte si nějaká dvě prvočísla $p, q \leq 100$.
- (b) Spočtěte $N = pq$ a $m = \text{nsn}(p-1)(q-1)$.
- (c) Najděte nějaká dvě čísla e, d tak, aby $ed \equiv 1 \pmod{m}$. Je možné nejprve zvolit nějaké e nesoudělné s m a dopočítat inverz d pomocí rozšířeného Eukleidova algoritmu. Čísla N , e tvoří veřejný klíč, číslo d je vaším soukromým klíčem. Veřejný klíč dejte spolužákovi, který vám pomocí něj pošle zašifrovanou zprávu. Na oplátku dostanete jeho veřejný klíč, pomocí kterého zašifrujete zprávu vy pro něj.
- (d) Zvolte si nějakou zprávu x (vaše oblíbené číslo od 1 do $N - 1$). Pomocí cizího veřejného klíče ji zašifrujte a pošlete (k výpočtu použijte software, případně rychlé mocnění).
- (e) Použijte svůj soukromý klíč k vyluštění zprávy, která vám přišla.

3. ! Odpovězte na zprávu z předešlé úlohy. Svou odpověď podepište pomocí svého soukromého klíče. Co musí osoba na druhé straně udělat, aby ověřila váš podpis?
4. ! Můj veřejný klíč (modul N) je 667 a exponent (číslo e) je 47, přišla mi zpráva 420 zašifrovaná pomocí RSA. Vyluštěte tuto zprávu.
5. ! Nechť $N = pq$ pro prvočísla p, q . Rozmyslete si, jak můžeme pomocí hodnot čísel N a $\varphi(N)$ určit hodnoty p a q . * Uměli byste to pomocí hodnot N a exponentu monoidu $\mathbb{Z}_N(\cdot)$ (např. s pomocí počítače)?
6. Dokažte lemma 3.13 ze skript: Ať jsou p_1, \dots, p_r po dvou různé lichá prvočísla. Nejmenší možný exponent monoidu $\mathbb{Z}_{p_1 \dots p_r}(\cdot)$ je $\text{nsn}(p_1 - 1, \dots, p_r - 1)$.
7. ! Spočtěte 2^{100} mod 121. (Návod: Napište si exponent v dvojkové soustavě. Pomocí mocnění na druhou spočtěte 2^1 mod 121, 2^2 mod 121, 2^4 mod 121, ..., 2^{64} mod 121. Vynásobte mezi sebou vhodné výsledky z předchozí části.) * Zobecněte a odhadněte počet kroků potřebných na výpočet k mod n v závislosti na k .
8. Obecně se věří, že rozložit číslo na prvočísla je výpočetně složité. Pokud je však číslo nějakého speciálního tvaru, lze jej občas rozložit jednoduše. Způsob známý jako *Fermatova metoda* využívá vzorce $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.
 - (a) Rozložte číslo 249 919 tak, že jej napíšete jako rozdíl čtverců.
 - (b) Ukažte, že každé číslo lze zapsat jako rozdíl čtverců.
9. Složitější *Eulerova metoda* je založena na tom, že se nám nějaké číslo podaří napsat jako součet dvou čtverců dvěma různými způsoby, t.j. máme $N = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$, kde $a > b > 0, c > d > 0$ a N je liché.
 - (a) Ukažte, že v tomto tvaru nejde napsat žádné $N \equiv 3 \pmod{4}$.
 - (b) Ukažte, že v tomto tvaru nejde napsat žádné prvočíslo $p \equiv 1 \pmod{4}$.
 - (c) * Ukažte jak pomocí tohoto zápisu najít nějaký rozklad N .

6.24 Cyklotomické polynomy

1. ! Spočtěte n -tý cyklotomický polynom pro $1 \leq n \leq 6$ a pro $n = 12, 18$.
2. ! Rozložte polynom $x^n - 1$ na součin ireducibilních polynomů v $\mathbb{Q}[x]$ pro
 - (a) $n = 7$,
 - (b) $n = 12$,
 - (c) $n = 15$,
 - (d) $n = 18$,
 - (e) $n = 20$.
3. Spočtěte osmý cyklotomický polynom a výpočtem ukažte, že je ireducibilní v $\mathbb{Q}[x]$.
4. Dokažte, že $t_{p^k}(x) = \sum_{i=0}^{p-1} x^{ip^{k-1}}$ pro každé prvočíslo p a $k \in \mathbb{N}$.
5. Dokažte, že $t_{2n}(-x) = t_n(x)$ pro každé liché $n > 1$.

6.25 Dirichletova věta o prvočíslech

1. Rozmyslete si některé speciální případy Dirichletovy věty:
 - (a) Připomeňte si Eukleidův důkaz, že existuje nekonečně mnoho prvočísel.
 - (b) Upravte ho a ukažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $4k + 3$ nebo $6k + 5$.
 - (c) Vysvětlete, proč předchozí postup nefunguje pro prvočísla jiného tvaru, například $4k + 1$, nebo obecně $ak - 1$ pro nějaké $a \in \mathbb{N}$.
 - (d) Ukažte, že pokud pro liché prvočíslo p platí $p|n^2 + 1$ pro nějaké $n \in \mathbb{N}$, potom p musí být tvaru $4k + 1$.
 - (e) Pomocí předchozí úlohy a Eukleidova důkazu ukažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $4k + 1$.
 - (f) Ukažte, že pro prvočíslo p je $\left(\frac{-2}{p}\right) = 1$, právě když p je tvaru $8k + 1$ nebo $8k + 3$.
 - (g) Podobně jako v části e) odvod'te, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $8k + 3$.
 - (h) Najděte všechna prvočísla p , pro která je 5 kvadratický zbytek modulo p .
 - (i) Převed'te výsledek předchozí úlohy na podmítku modulo 10 a pomocí toho ukažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru $10k + 9$.
2. Ukažte, že Dirichletova věta je ekvivalentní tvrzení, že pro každé $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$, pro které $\text{NSD}(a, b) = 1$, existuje alespoň 1 prvočíslo $p \equiv b \pmod{a}$. Uvědomte si, že z toho neplýne, že z existence jednoho prvočísla $p \equiv 5 \pmod{11}$ je takových prvočísel nekonečně mnoho.

6.26 Jiné

1. * Ukažte, že pro $n > 1$ výraz $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ nikdy není celé číslo. (Ná pověda: Použijte Bertrandův postulát, že mezi n a $2n$ vždy existuje aspoň jedno prvočíslo).
2. * Rozhodněte, jestli existuje nějaká mocnina 2, jejíž cifry lze přeskládat tak, aby vznikla jiná mocnina 2.
3. * Ukažte, že každá grupa, jejíž všechny prvky mají řád 2, je komutativní.
4. * Dokažte, že pro $n > 1$ platí $n \nmid 2^n - 1$.
5. * Ukažte, že pokud čísla a, b jdou zapsat jako součet dvou čtverců, pak jde takto zapsat i ab . Pomocí toho charakterizujte všechna taková čísla.

7. Výsledky a řešení vybraných příkladů

Tato kapitola obsahuje výsledky, návody či podrobná řešení vybraných příkladů z předchozí kapitoly, které sepsal Martin Raška.

7.1 Základy

1. (a) Platí.
(b) Neplatí.
(c) Platí. Pro spor předpokládejme, že nějaké přirozené číslo dělí zároveň a^n a b^m , BÚNO je to prvočíslo p . Poté ale p dělí i a a b , neboť jejich mocniny mají ve svém prvočíselném rozkladu stejná prvočísla. To je chtěný spor..
(d) Neplatí.
2. Ne.
7. Funguje například $(n+1)! + 2, (n+1)! + 3, \dots$

7.2 Valuace

1. (d) $v_2(170) = 1, v_5(170) = 1, v_{17}(170) = 1, v_p(170) = 0$ pro ostatní prvočísla p ,
(e) $v_2(360) = 3, v_3(360) = 2, v_5(360) = 1, v_p(170) = 0$ pro ostatní prvočísla p .
3. (a) Uvědomíme si, že p -valuace odpovídají exponentům v prvočíselném rozkladu. Tedy $a = \pm \prod_p \text{prvočíslo } p^{v_p(a)}$, $b = \pm \prod_p \text{prvočíslo } p^{v_p(b)}$ a $ab = \pm \prod_p \text{prvočíslo } p^{v_p(ab)}$. Pronásobením prvních dvou vztahů dostaneme $ab = \pm \prod_p \text{prvočíslo } p^{v_p(a)v_p(b)}$. Z jednoznačnosti prvočíselných rozkladů už dostaneme chtěnou rovnost.
- (b) Protože je $\frac{m}{n}$ celé číslo, tak n dělí m a můžeme psát $m = nk$. Potom

$$v_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(k) = v_p(k) + v_p(n) - v_p(n) = v_p(nk) - v_p(n) = v_p(m) - v_p(n).$$

4. Například $a = b = 1$ a $p = 2$ ($v_2(1) = 0$ a $v_2(1+1) = 1$).
6. (d) 24.

7.3 Eulerova a Malá Fermatova věta

7.4 Čínská zbytková věta

7.5 Cyklické grupy

4. Postup řešení jak najít všechny generátory:

$\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, \dots, 11\}$. Zřejmě $a \in \mathbb{Z}_{12}$ generuje \mathbb{Z}_{12} právě tehdy když $\mathbb{Z}_{12} = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Vzhledem k tomu, že navíc $12a = 0$, tak se ekvivalentně ptáme, kdy $\mathbb{Z}_{12} = \{na \mid n = 0, 1, \dots, 11\}$.

Dále si všimněme, že pokud $d = NSD(a, 12) > 1$, tak $d \mid na$ pro všechna n , tedy se nikdy nemůže stát $na = 1$ a a negeneruje celou \mathbb{Z}_{12} . Zbývá dokázat, že všechny zbylé $a \in \mathbb{Z}_{12}$, $NSD(a, 12) = 1$ jsou generátory \mathbb{Z}_{12} .

Zřejmě $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$. Pro $a \in \{5, 7, 11\}$ si jde buď vypsat celou množinu $\{na \mid n = 0, 1, \dots, 11\}$ (např. pro $a = 5$ vyjde $0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7$, tedy $\langle 5 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$), nebo můžeme najít odpověď na otázku, zda má kongruence $na \equiv b \pmod{12}$ řešení $n \in \mathbb{Z}$ pro libovolné $b \in \mathbb{Z}$.

Pro $a = 5$ z Bézoutovy rovnosti díky $NSD(5, 12) = 1$ najdeme $n, m \in \mathbb{Z}$, že $5n + 12m = 1$, tedy $5n \equiv 1 \pmod{12}$. Neboli 5 má inverz modulo 12 a kongruence $5n \equiv 1 \pmod{12}$ má řešení. Rovněž pak má řešení i kongruence $b \equiv 5(nb) \pmod{12}$, a tedy $\langle 5 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$.

Rozmyslete si, že podobný argument lze použít i pro $a = 7, 11$. Tento argument jde zobecnit pro libovolné \mathbb{Z}_n .

Generátory \mathbb{Z}_{12} jsou $1, 5, 7, 11$.

7. Najdeme všechny homomorfismy.

Při určování homomorfismů je klíčové pozorování, že pokud $a^k = 1$, tak $1 = \varphi(1) = \varphi(a^k) = \varphi(a \cdot a \cdots a) = \varphi(a)^k$ neboli pokud má prvek a řád k , tak řád prvků $\varphi(a)$ dělí k . (Pro sčítací grupy jde tohle pozorování přepsat jako $na = 0 \Rightarrow n\varphi(a) = 0$.)

- (a) Uvažujme nějaký homomorfismus $\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$. Vidíme, že $\mathbb{Z}_3 = \langle 1 \rangle$, jako důsledek tak $\varphi(a) = a\varphi(1)$ pro libovolné $a \in \mathbb{Z}_3$. Pokud tedy určíme $\varphi(1)$, tak už máme vynucené podmínky pro to, jak musí celé zobrazení vypadat. Dále si všimněme, že $3 \cdot 1 = 0$ v \mathbb{Z}_3 (řád 1 v \mathbb{Z}_3 je 3), a tedy podle výše uvedeného pozorování rovněž $3\varphi(1) = 0$ v \mathbb{Z}_6 (neboli $\varphi(1)$ má v \mathbb{Z}_6 řád 1 nebo 3). Rovnost $3n = 0$ v \mathbb{Z}_6 splňují pouze prvky $\{0, 2, 4\}$, a tedy $\varphi(1) \in \{0, 2, 4\}$.

Dostáváme, tak tři potenciální zobrazení:

- i. $\varphi_0 : \varphi_0(0) = \varphi_0(1) = \varphi_0(2) = 0$, což je triviální homomorfismus,
- ii. $\varphi_2 : \varphi_2(0) = 0, \varphi_2(1) = 2, \varphi_2(2) = 2 \cdot 2 = 4$,
- iii. $\varphi_4 : \varphi_4(0) = 0, \varphi_4(1) = 4, \varphi_4(2) = 2 \cdot 4 = 2$.

Ověřte si, že skutečně všechna tato tři zobrazení jsou dobře definované homomorfismy (tj. vztah $\varphi(g \cdot h) = \varphi(g) * \varphi(h)$ je zachován po složkách pro všechna $g, h \in \mathbb{Z}_3$). Budě to jde vyloženě po prvcích nebo si uvědomte, jak jsou homomorfismy definované pomocí $\varphi(1)$.

Dohromady tak máme triviální homomorfismus (ten existuje vždy) a dva netriviální.

- (b) Podobně jako v a) si uvědomíme, že 1 je generátor \mathbb{Z}_5 a φ je určené obrazem $\varphi(1)$. Vzhledem k tomu, že řád 1 v \mathbb{Z}_5 je 5 ($5 \cdot 1 = 0$), tak máme, že $5 \cdot \varphi(1) = 0$ neboli řád $\varphi(1)$ v \mathbb{Z}_6 dělí 5. Prvek $\varphi(1)$ má tedy buď řád 1 (pak $\varphi(1) = 0$ a dostáváme triviální homomorfismus), nebo má řád 5. Nicméně v grupě \mathbb{Z}_6 není žádný prvek řádu 5, neboť z Lagrangeovy věty musí řád prvku dělit řád grupy ($|\mathbb{Z}_6| = 6$). Tento případ tak nemůže nastat.
- Jediný homomorfismus mezi zadánými grupami je triviální.
- (c) $\varphi(1)$ se musí zobrazit na prvek řádu 1, 2 nebo 4, tedy $\varphi(1) \in \{0, 2, 4, 6\}$. Všechny tyto možnosti dají homomorfismus definovaný po prvcích jako $\varphi(a) = a\varphi(1)$. (To, že jsou to skutečně homomorfismy je třeba ověřit – buď ručně, nebo to dokázat obecně).
- (d) Podobně jako výše se $\varphi(1)$ musí zobrazit na prvek řádu 1, 2 nebo 4. Prvky řádu 4 v \mathbb{Z}_6 nejsou, pro ostatní dostaneme možnosti $\varphi(1) \in \{0, 3\}$, oba opět dají funkční homomorfismy.
- (e) Podobně jako výše se $\varphi(1)$ musí zobrazit na prvek řádu 1, 2 nebo 4. Nicméně z těchto řadů existuje v \mathbb{Z}_7 pouze prvek řádu 1 (je jím 0), a tedy dostaneme pouze možnost $\varphi(1) = 0$ a triviální homomorfismus.
8. (a) Protože 11 je prvočíslo, tak z přednášky víme, že grupa je cyklická. Pojd'me tedy najít nějaký primitivní prvek. $|\mathbb{Z}_{11}^*| = 10$, řád libovolného prvku $a \in \mathbb{Z}_{11}^*$ tak z Lagrangeovy věty dělí 10, tedy je to jedno z čísel 1 (jednotka), 2, 5 nebo 10 (primitivní prvky). Takže na ověření, že je a primitivní prvek, stačí ukázat, že $a, a^2, a^5 \neq 1$.
Zkusme například $a = 2$. Pak $a = 2 \neq 1$, $a^2 = 2^2 = 4 \neq 1$ a $a^5 = 10 \neq 1$. Řád 2 je tak nutně 10 a 2 je primitivní prvek.
- (b) $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$, hledáme prvek řádu 4. Nicméně 1 má řád 1 a pro zbylé prvky platí $3^2 = 5^2 = 7^2 = 1$, a tedy mají řád 2. Vidíme tedy, že žádný prvek negeneruje celou \mathbb{Z}_8^* a grupa není cyklická.
10. (a) $\mathbb{Z}_{18} = \{0, 1, \dots, 17\}$. Analogicky k předchozímu pro $a \in \mathbb{Z}_{18}$ platí, že pokud $NSD(a, 18) > 1$, tak $NSD(a, 18) \mid na$ pro všechna n a $\langle a \rangle \subsetneq \mathbb{Z}_{18}$. Pro $NSD(a, 18) = 1$, tedy $a \in \{1, 5, 7, 11, 13, 17\}$, lze stejně jako v předchozích úlohách ukázat, že skutečně generují celou \mathbb{Z}_{18} .
- (b) Pokud pro $a \in \mathbb{Z}_n$ platí $d = NSD(a, n) > 1$, tak $d \mid na$ pro všechna n , $1 \notin \langle a \rangle \subsetneq \mathbb{Z}_{18}$ a a tak negeneruje celou \mathbb{Z}_n .
- (c) V návaznosti na část b) si rozmyslíme, že všechny prvky splňující $NSD(a, n) = 1$ už jsou generátory. Jde o přímé zobecnění důkazu provedeného v příkladu 4.
11. (a) Na to, aby byl φ homomorfismus, tak musíme ukázat, že pro všechna $a, b \in \mathbb{Z}_6$ platí

$$\varphi((a + b) \mod 6) = (\varphi(a) + \varphi(b)) \mod 3.$$

Z definice ϕ , tak chceme ukázat, že

$$((a+b) \mod 6) \mod 3 =^? ((a \mod 3) + (b \mod 3)) \mod 3 = a+b \mod 3.$$

Pokud si označíme $c = (a + b) \pmod{6}$, tak chceme vlastně říct, že $c \equiv a + b \pmod{3}$. Nicméně víme, že $a + b \equiv c \pmod{6}$ a protože 3 dělí 6, tak i $a + b \equiv c \pmod{3}$. Tedy se skutečně jedná o homomorfismus. (Podmínu bychom přirozeně mohli ověřit i po prvcích, ale to je zbytečně pracné.)

- (b) V tomto případě nejde o homomorfismus. Speciálně si můžeme všimnout, že například

$$0 = \varphi(0) = \varphi(1+4) \neq \varphi(1) + \varphi(4) = 2.$$

13. a) Z Lagrangeovy věty platí, že řády prvků jsou buď 1 nebo 7. Očividně jediný prvek řádu 1 je 0 (jednotka v této grupě) a ostatní prvky budou mít řád 7.

b) \mathbb{Z}_7^* je cyklická, jak víme. Bud' můžeme řády spočítat pro každý prvek zvlášt', nebo si pro zjednodušení práce můžeme najít nějaký primitivní prvek modulo 7. S trohou snahy zjistíme, že je jím například 3. Každý prvek jde potom tedy zapsat ve tvaru 3^k a hledáme nejmenší n takové, že $(3^k)^n = 1$ neboli $nk \equiv 0 \pmod{6}$, neboť $3^6 = 1$. Z toho už snadno odvodíme, že $n = \frac{6}{NSD(6,k)}$.

Speciálně tak vidíme, že řád 1 má přesně $3^0 = 1$, řád 2 má přesně $3^3 = 6$, řád 3 mají přesně $3^2 = 2$, $3^4 = 4$ a řád 6 mají $3^1 = 3$, $3^5 = 5$.]

14. Cyklické jsou právě \mathbb{Z}_5^* (generátory 2, 3), \mathbb{Z}_6^* (generátor 5) a \mathbb{Z}_9^* (generátory 2, 5). Grupa \mathbb{Z}_{12}^* naopak cyklická není, neboť v ní všechny prvky mají řád nanejvýš 2.

16. (a) 3 (primitivní prvek 2)

5 (primitivní prvky 2, 3)

7 (primitivní prvky 3, 5)

(b) Hledáme homomorfismus, který bude zároveň bijekce. Protože jsou velikosti grup shodné, tak stačí ukázat, že bude homomorfismus na celou grupu \mathbb{Z}_6 . Toho lze docílit tím, že zobrazíme generátor \mathbb{Z}_7^* (primitivní prvek modulo 7, např. 3) na generátor \mathbb{Z}_6 (např. 1). Chceme tak $\varphi(3) = 1$ a definujme tedy po prvcích bijekci $\varphi(3^k) = k$ pro $k \in \{0, \dots, 5\}$. Zbývá ověřit, že je to homomorfismus.

17. Stačí si uvědomit, že to jsou přesně prvky \mathbb{Z}_7^* s řádek 6, což jsme už v úloze 13. určili, že jsou 3 a 5.

Obecně, pokud už zvládneme najít jeden primitivní prvek (v tomto případě například 3), tak z postupu z příkladu 13. vyplývá, že ostatní získáme přesně tak, že tento prvek umocníme na čísla nesoudělná s řádem grupy. Speciálně v našem případě chceme umocnit 3 na čísla nesoudělná s 6, což jsou přesně $3^1 = 3$ a $3^5 = 5$.

7.6 Fareyho zlomky

1. Víme, že $NSD(a, b) = 1$. Díky tomu z Bézoutovy rovnosti existují $x, y \in \mathbb{Z}$, že $bx - ay = 1$. Pro každé řešení (x, y) rovnice $bx - ay = 1$ jsou řešením i dvojice $(x_1, y_1) = (x + ra, y + rb)$ pro libovolné $r \in \mathbb{Z}$. Můžeme tedy najít r takové, že $0 \leq n - b < y_1 \leq n$.

Jistě $NSD(x_1, y_1) = 1$ (jako řešení té rovnice výše). Dále dostaneme $\frac{x_1}{y_1} - \frac{a}{b} = \frac{x_1b - y_1a}{y_1b} = \frac{1}{y_1b} > 0$. Tedy bud' $\frac{x_1}{y_1} \in F_n$ nebo $\frac{x_1}{y_1} > 1$. Tak jako tak $\frac{x_1}{y_1} \geq \frac{c}{d}$, neboť je $\frac{c}{d}$ další prvek v F_n .

Pokud by pro spor $\frac{x_1}{y_1} > \frac{c}{d}$. Tedy $x_1d - cy_1 \geq 1$, neboť je to celé číslo. Podobně $bc - ad \geq 1$. Dohromady dostaneme

$$\frac{1}{y_1 b} = \frac{x_1}{y_1} - \frac{a}{b} = \frac{x_1}{y_1} - \frac{c}{d} + \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{x_1 d - c y_1}{dy_1} + \frac{bc - ad}{bd} \geq \frac{1}{dy_1} + \frac{1}{bd} = \frac{b + y_1}{bd y_1} > \frac{n}{bd y_1}.$$

Tedy $d > n$. To je ale spor s tím, že $\frac{c}{d} \in F_n$. Předpoklad tak byl mylný a musí nastat $\frac{x_1}{y_1} = \frac{c}{d}$. Z toho, že je ale (x_1, y_1) řešením rovnice $bx - ay = 1$ už dostáváme chtěný vztah $bc - ad = 1$.

2. $\left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{1}{1} \right\}$ Jedná se o palindrom.
4. $1 + \sum_{i=1}^n \varphi(n)$, kde $\varphi(n)$ je Eulerova funkce

7.7 Řetězové zlomky

1. $\frac{131}{41}, \frac{43}{30}, \frac{102}{47}$
2. (a) $[1, 3]$,
 (b) $[3, 1, 1, 3]$,
 (c) $[4, 2, 6, 7]$.
4. $\frac{F_{n-1}}{F_n}$, kde F_n je Fibonacciho posloupnost začínající $F_0 = F_1 = 1$.
6. (d) $\frac{-7+\sqrt{87}}{2}$
 (e) $\frac{\sqrt{10}}{2}$
7. $n = 2$: $[1, \overline{2}]$, sblížené zlomky $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}$
 $n = 3$: $[1, \overline{1, 2}]$, $1, 2, \frac{5}{3}$
 $n = 11$: $[3, \overline{3, 6}]$, $3, \frac{10}{3}, \frac{63}{19}$
 $n = 13$: $[3, \overline{1, 1, 1, 1, 6}]$, $3, 4, \frac{7}{2}$
8. $[\overline{1}]$
9. (b) $\frac{k+\sqrt{k^2+4}}{2}$
 (c) $\frac{2-k+\sqrt{k^2+2k}}{2}$
10. $\frac{F_{n+1}}{F_n}$, kde F_n je Fibonacciho posloupnost začínající $F_0 = F_1 = 1$. (obecně jmenovatel i čitatel splňuje rekurentní vzorec $a_{n+2} = ka_{n+1} + a_n$, odkud lze najít explicitní vzorec)
11. $[k, \overline{2k}]$, $[k-1, \overline{1, 2k-2}]$
13. Pokud označíme $\frac{p}{q} = [0, a_1, \dots, a_n, 1]$ daný řetězový zlomek končící 1, tak vedlejší zlomky budou právě $[0, a_1, \dots, a_n]$ a $[0, a_1, \dots, a_{n-1}]$.

7.8 Pellova rovnice

1. Minimální řešení $(3, 2)$, množina všech řešení: $\{(a, b) \mid a + b\sqrt{2} = \pm(3 + 2\sqrt{2})^n, n \in \mathbb{Z}\}$. Další explicitní řešení například $(3 + 2\sqrt{2})^2 = 17 + 12\sqrt{2}$, tj. $(17, 12)$.
2. Uvažte rovnice modulo 3, resp. modulo 7.

3. (a) minimální řešení $(2, 1)$, množina všech řešení: $\{(a, b) \mid a + b\sqrt{3} = \pm(2 + \sqrt{3})^n, n \in \mathbb{Z}\}$
 (b) minimální řešení $(9, 4)$, množina všech řešení: $\{(a, b) \mid a + b\sqrt{5} = \pm(9 + 4\sqrt{5})^n, n \in \mathbb{Z}\}$
 (c) minimální řešení $(8, 3)$, množina všech řešení: $\{(a, b) \mid a + b\sqrt{7} = \pm(8 + 3\sqrt{7})^n, n \in \mathbb{Z}\}$
5. (hlavní myšlenka) Implikace zprava doleva je jasná ($x \geq 1, y \geq 1$). K opačné implikaci uvážíme vztah $(x+y\sqrt{m})(x-y\sqrt{m}) = 1$, ze kterého vzhledem k předpokladům plyne, že $0 < x - y\sqrt{m} < 1$. Z těchto nerovností lze při uvážení $x < 0$ nebo $y < 0$ dostat spor.
- 6.,7. Uvažme (x_1, y_1) a (x_2, y_2) , která jsou řešeními (zobecněných) Pellových rovnic $x_1^2 - my_1^2 = A$ a $x_2^2 - my_2^2 = B$. Jak bylo ukázáno na cvičení, pokud označíme $x_3 + y_3\sqrt{m} = (x_1 + y_1\sqrt{m})(x_2 + y_2\sqrt{m})$, tak $x_3 - y_3\sqrt{m} = (x_1 - y_1\sqrt{m})(x_2 - y_2\sqrt{m})$ (lze ověřit roznásobením). Po vynásobení těchto dvou rovností dostaneme, že $x_3^2 - my_3^2 = AB$. Pokud tedy máme dvě netriviální řešení $x_1 + y_1\sqrt{m}, x_2 + y_2\sqrt{m}$ (klidně stejná) rovnice $x^2 - my^2 = -1$, tak jejich součin je řešením rovnice $x^2 - my^2 = 1$ (rozmyslete si, že netriviální). Podobně z jednoho řešení rovnice $x^2 - my^2 = B$ umíme vygenerovat nekonečně mnoho přenásobením řešeními klasické Pellovy rovnice $x^2 - my^2 = 1$ (rozmyslete si, že takto dostaneme nekonečně různých řešení).
10. (b) $\sqrt{41} = [6, \overline{2, 2, 12}]$, minimální řešení $(2049, 320)$ a $(32, 5)$
 (e) $\sqrt{23} = [4, \overline{1, 3, 1, 8}]$, minimální řešení $(24, 5)$ a neexistuje
 (f) $\sqrt{13} = [3, \overline{1, 1, 1, 1, 6}]$, minimální řešení $(649, 180)$ a $(18, 5)$
 (g) $\sqrt{29} = [5, \overline{2, 1, 1, 2, 10}]$, minimální řešení $(9801, 1820)$ a $(70, 13)$
 (h) $\sqrt{61} = [7, \overline{1, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 14}]$, minimální řešení $(1766319049, 226153980)$ a $(29718, 3805)$
12. $\pm 1, \pm 4, \pm 5$
16. Z příkladu 1. víme, že všechna řešení jsou tvaru $\{(a, b) \mid a + b\sqrt{2} = \pm(3 + 2\sqrt{2})^n, n \in \mathbb{Z}\}$. Když uvážíme binomickou větu, tak dostaneme

$$a = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} 3^{n-2i} \cdot (2\sqrt{2})^{2i},$$

$$b\sqrt{2} = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} 3^{n-2i-1} \cdot (2\sqrt{2})^{2i+1}.$$

Odtud vidíme, že b je vždy dělitelné 2 a pokud je n liché, tak je a dělitelné 3, a naopak pokud je n sudé, tak je b dělitelné 3.

7.9 Dobre approximace

1. (a) $\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}\}$,
 (b) $\{2, \frac{5}{3}\}$,
 (c) $\{0, \frac{1}{3}, \frac{3}{10}\}$,
 (d) $\{1, \frac{7}{8}\}$.
4. $\alpha, \lfloor \alpha \rfloor, \lceil \alpha \rceil$

7.10 Gaussovská celá čísla

1. a) $\frac{17-7i}{13}$, b) 25, c) $7 + 8i$
2. a) Z tvrzení z přednášky (nebo faktu, že v $\mathbb{Z}[i]$ neexistuje prvek normy 7) je 7 prvočinitel v $\mathbb{Z}[i]$.
b) $N(5+i) = 26$, hledáme tedy rozklad $5+i$ na prvočinitele normy 2 a 13 (platí, že $a \mid b$ implikuje $N(a) \mid N(b)$ a z charakterizace prvočinitelů na přednášce pak i tito prvočinitelé musí existovat). Prvočinitel normy 2 je až na asociovanost právě jeden (např. $i+1$) a po vydělení zjistíme, že $5+i = (1+i)(3-2i)$. Oba tyto prvky už jsou prvočinitelé, neboť mají prvočíselnou normu (příklad 5).
3. Čistě z definice roznásobte oba výrazy.
4. Pokud je $N(\alpha) = 1$, tak $\alpha\bar{\alpha} = 1$ a $\bar{\alpha}$ je tak inverz. Naopak pokud $\alpha \parallel 1$, tak $N(\alpha) \mid N(1) = 1$, což v $\mathbb{Z}[i]$ implikuje $N(\alpha) = 1$.
5. Použijte, že prvočinitelé jsou v gaussovských oborech shodní s ireducibilními prvky. Jaké normy můžou mít dělitelé α ?
6. Ano, ne, ano.
7. Prvky součinů jsou navzájem asociované, takže to není spor (v gaussovských obozech je rozklad jednoznačný až na asociovanost).
9. Implikace zleva doprava je zřejmá. Pro tu druhou to jde bud' napřímo rozepsat, nebo použít, že z norem dostaneme $a^2 = N(a) \mid N(b) = b^2$, což už nad \mathbb{Z} implikuje $a \mid b$.
11. $15 = 3 \cdot 5 = 3 \cdot (2+i)(2-i)$
 $12 + 21i = 3(4+7i) = 3(2+i)(3+2i)$
 $3 + 21i = 3(1+7i) = 3(1+i)(1+2i)(2-i)$
12. Z předchozího příkladu vidíme, že NSD je 3. Euklidovým algoritmem dostaneme $3 = (3+2i)(12+21i) + (-4-1)(3+21i)$.
13. $1+i \mid x+yi$ právě tehdy, když $2 \mid y-x$.

7.11 Diofantické rovnice

1. $(0, 1)$.

Předpokládejme, že dvojice (x, y) řeší zadanou rovnici a uvažme rozklad $(x+i)(x-i) = y^5$ v gaussovském oboru $\mathbb{Z}[i]$. Nejprve ukážeme, že $x+i$ a $x-i$ jsou v $\mathbb{Z}[i]$ nesoudělná. Pokud by je pro spor nějaký prvočinitel π dělil, tak musí dělit i jejich rozdíl, tj. $\pi \mid 2i \parallel 2 \parallel (1+i)^2$ (neboť i je jednotka a víme, jak v $\mathbb{Z}[i]$ vypadá rozklad 2). Protože jsme v gaussovském oboru, tak už nutně $\pi \parallel (1+i)$ a BÚNO můžeme předpokládat $\pi = 1+i$ (v dalším postupu a při uvažování dělitelností nebude přenásobení jednotkou podstatné). Speciálně tak dostaneme v $\mathbb{Z}[i]$ dělitelnost

$$2 \parallel (1+i)^2 = \pi^2 \mid (x+i)(x-i) = y^5.$$

Tedy 2 dělí y^5 v $\mathbb{Z}[i]$. To nicméně podle příkladu 6. z minulého cvičení implikuje, že 2 dělí y^5 i v \mathbb{Z} , a nutně pak $2 \mid y$ (neboť je 2 v \mathbb{Z} prvočinitel). Když se nyní podíváme na rovnici modulo 4, tak dostaneme $x^2 \equiv 3 \pmod{4}$. To se nicméně nemůže stát pro žádné $x \in \mathbb{Z}$ a tak máme spor. Prvky $x+i$ a $x-i$ jsou tak skutečně nesoudělné.

Nyní uvažme rozklady na prvočinitele výrazu $(x+i)(x-i) = y^5$. Pro všechny prvočinitele p jsou p -valuace čísla y^5 násobky pěti, to stejně tak musí platit i pro $(x+i)$ a $(x-i)$, neboť pokud by se mocniny nějakého prvočinitele netriviálně rozdistribuovali mezi oba prvky, tak by to byl spor s nesoudělností. Můžeme tak psát $x+i \parallel (a+bi)^5$ pro nějaké $a, b \in \mathbb{Z}$. Speciálně tedy $x+i = \varepsilon(a+bi)^5$ pro některé $\varepsilon \in \{\pm 1, \pm i\}$, což jsou všechny jednotky v $\mathbb{Z}[i]$. Abychom si nyní ulehčili práci s rozborem, tak si můžeme všimnout, že $\varepsilon^5 = \epsilon$ a tedy pokud označíme $\varepsilon(a+bi) = c+di$ pro vhodná $c, d \in \mathbb{Z}$, tak dostaneme

$$\begin{aligned} x+i &= \varepsilon(a+bi)^5 = \varepsilon^5(a+bi)^5 = (\varepsilon(a+bi))^5 = \\ &= (c+di)^5 = c^5 + 5c^4di - 10c^3d^2 - 10c^2d^3i + 5cd^4 + d^5i. \end{aligned}$$

Porovnáním reálných a imaginárních částí dostaneme $x = c^5 - 10c^3d^2 + 5cd^4$ a $1 = 5c^4d - 10c^2d^3 + d^5 = d(5c^4 - 10c^2d^2 + d^4)$. Nutně tedy musí platit $d \mid 1$, což povoluje pouze $d = \pm 1$.

V případě $d = 1$ z druhé rovnice dostaneme $1 = 5c^4 - 10c^2 + 1$, což implikuje $c = 0$ a z první rovnosti tak máme $x = 0$. Dosazením do zadání zjistíme, že jediný možný výsledek je v tomto případě $(0, 1)$.

V případě $d = -1$ se snadno přesvědčíme, že rovnice $1 = 5c^4d - 10c^2d^3 + d^5$ nemá nad \mathbb{Z} řešení.

Jediné řešení je tak $(x, y) = (0, 1)$ (které zároveň splňuje zkoušku).

3. Až na záměnu x, y jsou všechna kladná různá řešení tvaru $x = (a^2 - b^2)c$, $y = 2abc$, $z = (a^2 + b^2)c$ pro libovolné celé $c > 0$ a libovolná celá $a > b > 0$, která jsou nesoudělná a opačné parity. Libovolné řešení, kdy je nějaká z proměnných záporná dostaneme změnou znamének z těchto. Pokud je alespoň jedna z proměnných 0, tak lze množinu řešení popsat jednoduše.

Na začátku si uvědomme, že můžeme předpokládat, že x, y, z jsou po dvou nesoudělná čísla. Pokud by totiž nějaké prvočíslo p dělilo dvě z nich, tak ze zadane rovnosti musí dělit i to třetí. A můžeme si všimnout, že vedle trojice (x, y, z) je pak řešením i trojice $\left(\frac{x}{p}, \frac{y}{p}, \frac{z}{p}\right)$. Tedy z nesoudělných řešení můžeme nazávěr vygenerovat i všechna soudělná tak, že je jednoduše přenásobíme vhodným kladným celým číslem. Zároveň předpokládejme, že jsou x, y, z nezáporná, neboť jsou proměnné v rovnici v druhé mocnině a libovolné záporné hodnoty by byly řešením taky. Pokud je jedna z proměnných nula, tak si snadno rozmyslíme, že dostáváme řešení tvaru $(0, 0, 0)$, $(a, 0, a)$ a $(0, a, a)$ pro $a > 0, a \in \mathbb{Z}$. Od této se tedy omezme pouze na kladná nesoudělná řešení.

Nyní uvažme v $\mathbb{Z}[i]$ rozklad $(x+iy)(x-iy) = z^2$. Na začátek opět ukážeme, že jsou členy $x+iy$ a $x-iy$ nesoudělné. Pokus by je pro spor dělil nějaký prvočinitel π , tak dělí i jejich součet a rozdíl, tedy $\pi \mid 2x$ a $\pi \mid 2iy \parallel 2y$. Rozeberme dva případy:

- (a) $\pi \mid 2$. Podobně jako v případě -2 můžeme BÚNO předpokládat, že $\pi = 1+i$ a dostaneme, že $2 \mid x^2 + y^2 = z^2$ a tedy $2 \mid z^2$, jak v $\mathbb{Z}[i]$, tak v \mathbb{Z} . Tedy $2 \mid z$ a při pohledu na původní rovnici modulo 4 dostaneme $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Ovšem vzhledem k tomu, že druhé mocniny můžou modulo 4 dávat zbytek pouze 0 nebo 1, tak to implikuje, že $x^2 \equiv y^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Tedy jsou x i y sudé a dostáváme spor s jejich nesoudělností.

- (b) $\pi \nmid 2$ Pak z výše uvedeného $\pi \mid x$ a $\pi \mid y$. Jde si ale rozmyslet (například přes Bézoutovu rovnost nebo prvočinitele), že dvě celá čísla jsou v $\mathbb{Z}[i]$ nesoudělná právě tehdy, když jsou nesoudělná v \mathbb{Z} . Tedy opět dostáváme spor s předpokládanou nesoudělností.

Vidíme tedy, že $x + iy$ a $x - iy$ jsou nesoudělné a analogicky platí $x + iy = \varepsilon(a + bi)^2$ pro nějaká $a, b \in \mathbb{Z}$ a jednotku ε . Speciálně si můžeme všimnout, že $-\varepsilon(a + bi)^2 = \varepsilon(i(a + bi))^2$. Stačí tedy uvažovat $\varepsilon \in \{1, i\}$. Tyto případy rozeberme:

- (a) $\varepsilon = 1$. Pak porovnáním dostaneme $x = a^2 - b^2$ a $y = 2ab$, což po dosazení zpátky do zadání dá $z = a^2 + b^2$.
- (b) $\varepsilon = i$. Pak $x = -2ab$ a $y = a^2 - b^2$, což opět po dosazení dá $z = a^2 + b^2$.

Vidíme, že oba případy se liší pouze prohozením proměnných x a y a záměnou znamének. Předpokládejme tedy BÚNO $x = a^2 - b^2$, $y = 2ab$ a $z = a^2 + b^2$. Zbývá rozebrat, za jakých podmínek jsou x a y kladné a nesoudělné. Ne příliš složitým rozborém vyjde, že se to stane právě tehdy když $a > b > 0$, a a b jsou nesoudělná a mají různou paritu. Zároveň jde ověřit, že pro fixní x a y už jsou a, b za těchto podmínek určena jednoznačně, a tak jsou všechna tato nalezená řešení vzájemně disjunktní. Abychom dostali i soudělná řešení, tak jednoduše můžeme pronásobit všechny proměnné nějakou konstantou $c > 0$, která bude udávat jejich výsledného největšího společného dělitele.

Dohromady tak dostáváme, že všechny disjunktní kladné řešení jsou právě tvaru $x = (a^2 - b^2)c$, $y = 2abc$ a $z = (a^2 + b^2)c$ pro libovolné $c > 0$, $a > b > 0$, kde a, b jsou nesoudělné a různé parity.

4. Jediným řešením je $(0, 1)$.
7. (a) ± 1
- (b) Jednotky jsou přesně všechna řešení Pellových rovnic $x^2 - 2y^2 = \pm 1$. Jdou tak souhrně zapsat jako $\pm(1 + \sqrt{2})^n$, $n \in \mathbb{Z}$, neboť $1 + \sqrt{2}$ je minimálním řešením rce $x^2 - 2y^2 = -1$.
9. $x = a(a^2 - 3b^2)$, $y = b(3a^2 - b^2)$, $z = a^2 + b^2$, pro $a, b \in \mathbb{Z}$ nesoudělná a opačné parity.
10. (a) $(\pm 11, 5)$
- (b) $(\pm 2, 2)$. Pokud jsou x a y obě sudé, tak jsou činitelé nalevo v $(x+2i)(x-2i) = y^3$ soudělní. V takovém případě se rovnice po substituci $x = 2x_1$, $y = 2y_1$ převede do tvaru $(x_1 + i)(x_1 - i) = x_1^2 + 1 = 2y_1^3$ pro lichá x_1, y_1 . Jde ukázat, že největší společný dělitel závorek nalevo je právě $1 + i$ s pomocí čehož už jde úloha vyřešit ($\frac{x_1+i}{1+i}$ musí být v důsledku třetí mocninou nějakého prvku $\mathbb{Z}[i]$).
10. Nemá řešení.
13. $(\pm 1, 1)$. Řešte v oboru $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Ten sice obsahuje nekonečně jednotek, ale pro $\varepsilon = \pm(1 + \sqrt{2})^n$, $n \in \mathbb{Z}$ stačí u výrazu $\varepsilon(a + b\sqrt{2})^3$ uvažovat pouze $\varepsilon = (1 + \sqrt{2})^k$, $k \in \{0, 1, 2\}$, zbytek se schová do třetí mocniny.
14. $(0, -1)$, $(\pm 1, 0)$, $(\pm 3, 2)$. Rovnice jde s trohou snahy a trpělivosti vyřešit přímo nad celými čísly.

7.12 Kvadratické zbytky a Legendreovy symboly

1. Modulo 4: $\{0, 1\}$, modulo 7: $\{0, 1, 2, 4\}$, modulo 8: $\{0, 1, 4\}$, modulo 9: $\{0, 1, 4, 7\}$, modulo 17: $\{0, 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16\}$.

Postup: Uvědomme si, že $(an + b)^2 = a^2n^2 + 2abn + b^2 \equiv b^2 \pmod{n}$. Když tedy chceme spočítat všechny kvadratické zbytky modulo n , tak se stačí ve skutečnosti omezit jenom na druhé mocniny prvků v okruhu \mathbb{Z}_n . Stejně tak si jde uvědomit, že $x^2 \equiv (-x)^2 \pmod{n}$, tedy stačí mocnit jenom polovinu prvků.

Například pro $n = 4$ tak dostaneme právě zbytky $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$ a $2^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Podobně pro $n = 7$ dostaneme zbytky $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 4$ a $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$.

3. (a) -1 ,

(b) -1 ,

(c) 1 ,

(d) -1 ,

(e) -1 ,

(f) -1 ,

(g) -1 .

- 4.

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } p = 3, \\ 1 & \text{pokud } p = 2 \text{ nebo } p \equiv \pm 1 \pmod{12}, \\ -1 & \text{jinak (pokud } p \equiv 5, 7 \pmod{12}). \end{cases}$$

$$\left(\frac{7}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } p = 7, \\ 1 & \text{pokud } p = 2 \text{ nebo } p \equiv 1, 3, 9, 19, 25, 27 \pmod{28}, \\ -1 & \text{jinak (pokud } p \equiv 5, 11, 13, 15, 17, 23 \pmod{28}). \end{cases}$$

$$\left(\frac{13}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } p = 13, \\ 1 & \text{pokud } p = 2 \text{ nebo } p \equiv 1, 3, 4, 9, 10, 12 \pmod{13}, \\ -1 & \text{jinak (pokud } p \equiv 2, 5, 6, 7, 8, 11 \pmod{13}). \end{cases}$$

Postup pro $p = 3$:

Rádi bychom použili kvadratickou reciprocity a převedli úlohu na problém s určením $\left(\frac{p}{3}\right)$, což je daleko přístupnější. K jejímu použití ale potřebujeme, aby p bylo liché prvočíslo různé od 3. Na začátek tedy zvlášť vyřešíme případy $p = 2$ a $p = 3$. Snadno vidíme $\left(\frac{3}{3}\right) = 0$ a $\left(\frac{3}{2}\right) = 1$.

Nyní můžeme předpokládat $p \neq 2, 3$. Použitím kvadratické reciprocity dostaváme

$$\left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right).$$

Jak je známo (a jde jednoduše ověřit), tak $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$ je rovno 1 pro $p \equiv 1 \pmod{4}$ a -1 pro $p \equiv -1 \pmod{4}$. Podobně (z toho, jak vypadají kvadratické zbytky modulo 3) dostaváme, že $\left(\frac{p}{3}\right) = 1$ pro $p \equiv 1 \pmod{3}$ a $\left(\frac{p}{3}\right) = -1$ pro $p \equiv 2 \pmod{3}$. Z Čínské zbytkové věty tak máme, že hodnota výrazu napravo je tak jednoznačně určená tím, jaký zbytek dává p modulo $12 = 3 \cdot 4$.

Pokud tedy například chceme určit všechny případy, kdy $\left(\frac{3}{p}\right) = 1$, tak dostáváme možnosti:

- (a) $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{p}{3}\right) = 1$, tedy $p \equiv 1 \pmod{4}$ a $p \equiv 1 \pmod{3}$. Snadno nahlédneme, že to splňuje právě všechna prvočísla $p \equiv 1 \pmod{12}$.
- (b) $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{p}{3}\right) = -1$, tedy $p \equiv 3 \pmod{4}$ a $p \equiv 2 \pmod{3}$. Výpočtem získáme, že tohle splňuje právě zbytek $p \equiv 11 \pmod{12}$.

Podobně bychom mohli ověřit, že zbylé dvě možnosti $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -\left(\frac{p}{3}\right)$, pro které vyjde $\left(\frac{3}{p}\right) = -1$, přísluší právě prvočíslům, která dávají zbytek $p \equiv 5, 7 \pmod{12}$. Dohromady tak dostáváme

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } p = 3, \\ 1 & \text{pokud } p = 2 \text{ nebo } p \equiv \pm 1 \pmod{12}, \\ -1 & \text{jinak (pokud } p \equiv 5, 7 \pmod{12}). \end{cases}$$

5. $\left(\frac{17}{5}\right) = \left(\frac{5}{17}\right) = -1$
7. Stačí si uvědomit, že zadání se vlastně ptá, kdy $\left(\frac{-7}{p}\right) = 1$. Podobným postupem jako v úloze 4. pro lichá prvočísla odhalíme, že je to právě tehdy, když $\left(\frac{p}{7}\right) = 1$. Řešením je tedy $p = 2$ a všechna prvočísla tvaru $p \equiv 1, 2, 4 \pmod{7}$.
8. Uvažte, jaké zbytky můžou dát a^2 a b^2 modulo 3. V jakých případech může být jejich součet dělitelný 3?
11. Uvažte modulo 8.
12. Platí to právě pro $p = 2$ a $p \equiv 1 \pmod{4}$. Přepište si zadání do řeči Legendreových symbolů a uvažte jejich multiplikativitu. Kdy je -1 kvadratický zbytek modulo p ?
13. Zkuste si uvědomit, co se stane s množinou všech kvadratických zbytků, když je vynásobíme nějakým fixním kvadratickým zbytkem. Pomocí tohoto pozorování vyjádřete chtěný součet dvěma různými způsoby a ty porovnejte.
14. Nejprve si uvědomíme, že $ka + b$ ve skutečnosti neiteruje přes nic jiného než přes všechny prvky \mathbb{Z}_p . Pak už se jenom stačí zamyslet nad počtem zbytků a nezbytků.
15. Nejedná se vlastně o nic jiného než o řešení kongruence $x^2 \equiv y^2 + 1 \pmod{p}$. Ta je splněná právě tehdy, když $x - y$ a $x + y$ jsou navzájem inverzní prvky. Zamyslete se, jak obecně vypadají všechny dvojice navzájem inverzních prvků v \mathbb{Z}_p^* a z toho úlohu dořeštěte.

7.13 Charakterы a Gaussovy součty

1. Níže jsou popsané charakterы, jejich řády jsou rozebrány pouze pro $n = 7$.
 - (a) Existují právě 2 charakterы modulo 3. Triviální $\varepsilon(1) = \varepsilon(2) = 1$ a netriviální definovaný po prvcích jako $\chi(1) = 1$, $\chi(2) = -1$.
 - (b) Existují právě 4 charakterы modulo 5. Pokud si je označíme χ_1, \dots, χ_4 , tak je můžeme definovat po prvcích například jako $\chi_m(2^k) = \zeta_4^{km}$ pro $0 \leq k \leq 3$.

- (c) Existuje právě 6 charakterů modulo 7. Pokud si je označíme χ_1, \dots, χ_6 , tak je můžeme definovat po prvcích například jako $\chi_m(3^k) = \zeta_6^{km}$ pro $0 \leq m \leq 5$ (je to plná definice, protože 3 je primitivní prvek modulo 7 a tak 3^k postupně prochází všemi prvky v \mathbb{Z}_7^*). Postup viz v řešení níže. Řád charakteru χ_m je roven přesně $\frac{6}{NSD(6,m)}$.
- (d) Existují právě 2 charaktery modulo 4. Triviální $\varepsilon(1) = \varepsilon(3) = 1$ a netriviální definovaný po prvcích jako $\chi(1) = 1, \chi(3) = -1$.
- (e) Existují právě 4 charaktery modulo 8. Můžeme je zadat například po prvcích tabulkou:

	1	3	5	7
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	-1
χ_4	1	-1	-1	1

- (f) Existují právě 4 charaktery modulo 12. Můžeme je zadat například po prvcích tabulkou (pro postup viz řešení níže):

	1	5	7	11
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	-1
χ_4	1	-1	-1	1

- (g) Existuje právě 16 charakterů modulo 17. Pokud si je označíme χ_1, \dots, χ_{16} , tak je můžeme definovat po prvcích například jako $\chi_m(3^k) = \zeta_6^{km}$ pro $0 \leq k \leq 15$.

Postup pro $n = 7, n = 12$:

Na začátek si obecně uvědomíme klíčové pozorování o řádech prvků. Pokud pro nějaký prvek $a \in \mathbb{Z}_n^*$ platí $a^k = 1$, tak

$$1 = \chi(1) = \chi(a^k) = (\chi(a))^k,$$

neboť χ je homomorfismus. Speciálně tak dostáváme, že $\chi(a)$ je nějaká k -tá odmocnina z 1. Protože z Eulerovy věty máme v \mathbb{Z}_n^* pro libovolný prvek rovnost $a^{\varphi(n)} = 1$, tak je speciálně $\chi(a)$ nějaká $\varphi(n)$ -tá odmocnina z 1 pro každý charakter modulo n a každé $a \in \mathbb{Z}_n^*$.

- b) $n = 7$. Všimneme si, že 3 je primitivní prvek modulo 7, neboť všechny mocniny $3, 3^2, \dots, 3^5$ jsou různé od 1. Z toho dostáváme, že každý prvek $a \in \mathbb{Z}_7^*$ lze zapsat ve tvaru 3^k a platí $\chi(a) = \chi(3^k) = \chi(3)^k$. Volba $\chi(3)$ nám tedy již jednoznačně definuje celý charakter. Pro $\chi(3)$ máme podle výše uvedeného pozorování nanejvýš 6 možných voleb a jsou jimi právě 6-té odmocniny z 1 ($\zeta_6^m, 0 \leq m \leq 5$). Pro tyto volby pak můžeme dodefinovat zobrazení jediným přípustným způsobem jako $\chi_m(3^k) = \zeta_6^{km}$. Jak dokazuje Lemma 4.5. ze skript, tak toto již skutečně jsou dobře definované charaktery modulo 7.

Je tedy přesně 6 výše popsaných charakterů modulo 7.

Pokud chceme určit rády těchto charakterů, tak myšlenka řešení je taková, že z definice rádu v grupě hledáme nejmenší přirození číslo r takové, že $\chi_m^r = \varepsilon$ v grupě

charakterů. To v překladu znamená, že chceme $1 = (\chi_m(3^k))^r = \zeta_6^{kmr}$ pro všechna $0 \leq k \leq 5$. To se zřejmě stane právě tehdy, když $6 \mid kmr$, z čehož už plyne požadovaný výsledek $\frac{6}{NSD(6,m)}$.

c) Pro $n = 12$ máme $\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$. Neexistuje zde primitivní prvek, nicméně si můžeme všimnout, že $5^2 = 7^2 = 11^2 = 1$. Všechny $\chi(5), \chi(7), \chi(11)$ jsou tedy buď 1 nebo -1. Jistě také $\chi(1) = 1$ (to platí pro každý charakter). Navíc si můžeme všimnout, že $5 \cdot 7 = 11$, tedy $\chi(5)\chi(7) = \chi(11)$. Z toho vidíme, že stačí určit pouze hodnoty $\chi(5)$ a $\chi(7)$ a ty nám už jednoznačně určí zbytek. Máme tak pouze čtyři níže uvedené možnosti, jak je zvolit a snadno se již přesvědčíme, že každá z nich skutečně definuje homomorfismus.

	1	5	7	11
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	-1
χ_4	1	-1	-1	1

2. Pro triviální charakter vyjde $g(\varepsilon) = \zeta_3 + \zeta_3^2 = -1$. Pro jediný netriviální charakter modulo 3 dostaneme $g(\chi) = \zeta_3 - \zeta_3^2 = i\sqrt{3}$. (Triviální charakter jde vypočítat stejně jako ve skriptech za použití $\sum_{a \in \mathbb{Z}_p} \zeta_p^a = 0$ nebo si jde uvědomit, že $\zeta_3 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ a $\zeta_3^2 = \overline{\zeta_3}$.)
3. Jednak je nutné ověřit, že takto po prvcích zadefinovaný součin a inverz charakterů je skutečně opět charakter modulo n (tj. homomorfismus ze \mathbb{Z}_n^* do \mathbb{C}^*). Grupová asociativita pak bude plynout z asociativity násobení komplexních čísel. To, že je ε jednotka je snadné a funkčnost inverzů plyne z toho, že pro prvky \mathbb{C} na jednotkové kružnici platí $\overline{z} = z^{-1}$.
5. Legendreův symbol zřejmě dobře definuje zobrazení ze \mathbb{Z}_p^* do \mathbb{C}^* . To, že je to homomorfismus (a tedy charakter modulo p), plyne z multiplikativity Legendreova symbolu.

Pro druhou část si nejdříve rozmysleme, že ε a $\left(\frac{a}{p}\right)$ jistě zadanou rovnost splňují. Navíc platí, že jsou to jediné takové charaktery. To plyne z toho, že charakter je jednoznačně určen obrazem nějakého primitivního prvku g modulo p . Nicméně $\chi(g)^2 = 1$, takže máme pouze dvě možnosti $\chi(g) = \pm 1$ a existují tak právě dva charakterы splňující $\chi^2 = \varepsilon$. Nutně to tedy jsou právě ε a $\left(\frac{a}{p}\right)$. Můžete si rozmyslet, proč platí $\left(\frac{g}{p}\right) = -1$ pro libovolný primitivní prvek g .

6. Důkaz je ve skriptech na konci sekce 4.2. Zásadní myšlenka je taková, že když přenásobíme sumu nějakou n -tou odmocninou z 1, tak se množina sčítanců nezmění (a tedy ani výsledná suma.)
7. (a) $g(\chi_1) = 1 \cdot e^{\frac{2\pi i}{5}} + ie^{\frac{4\pi i}{5}} + (-i)e^{\frac{6\pi i}{5}} - 1 \cdot e^{\frac{8\pi i}{5}} = i\sqrt[4]{-15 + 20i}$. Dojít k tomuto výsledku je poměrně pracné, jedna možná cesta (možná nejsnazší) je například napřímo spočítat $\sin(x)$ a $\cos(x)$ pro $x = \frac{2\pi}{5}$ za použití $(\cos(x) + i \sin(x))^5 = \cos(5x) + i \sin(5x)$.
- (b) Můžeme se podívat například na charakter příslušící Legendreovu symbolu $\chi(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$. Dostaneme $g(\chi) = \zeta_7 + \zeta_7^2 - \zeta_7^3 + \zeta_7^4 - \zeta_7^5 - \zeta_7^6$. Můžete si zkusit

spočítat tuto hodnotu napřímo. Z přednášky nicméně víme, že vyjde přesně $i\sqrt{7}$ (konec sekce 4.3).

11. Nejdřív si uvědomte, že $\chi(n)\bar{\chi}(a) = \chi(na^{-1})$. Nedělalo se na přednášce nějaké tvrzení, které by na tuto sumu šlo napasovat?

7.14 Jacobiho symboly

1. (a) Budeme postupně používat vlastnosti Jacobiho symbolů, viz věta 4.14 ze skript.

$$\begin{aligned} \left(\frac{477}{247}\right) &= \left(\frac{230}{247}\right) = \left(\frac{2}{247}\right) \left(\frac{115}{247}\right) = (-1)^{\frac{247^2-1}{8}} (-1)^{\frac{247-1}{2} \frac{115-1}{2}} \left(\frac{247}{115}\right) = \\ &= -\left(\frac{17}{115}\right) = -(-1)^{\frac{115-1}{2} \frac{17-1}{2}} \left(\frac{115}{17}\right) = -\left(\frac{13}{17}\right) = \\ &= -(-1)^{\frac{13-1}{2} \frac{17-1}{2}} \left(\frac{17}{13}\right) = -\left(\frac{4}{13}\right) = -\left(\frac{2}{13}\right) \left(\frac{2}{13}\right) = -1. \end{aligned}$$

Všimněte si, že jsme se při výpočtu úplně vyhnuli rozkladu na prvočísla (kromě dělitelnosti 2).

- (b) -1,
 (c) -1,
 (d) -1,
 (e) -1.
 2. Díky čínské zbytkové větě je zadaný problém ekvivalentní s dvojící podmínek $x^2 \equiv 9 \pmod{11}$ a $x^2 \equiv 4 \pmod{7}$. Snadno ověříme, že obě tyto kongruenze už mají řešení. První z nich konkrétně $x \equiv \pm 3 \pmod{11}$ a druhá z nich $x \equiv \pm 2 \pmod{7}$. Nyní akorát potřebujeme zpětně najít odpovídající zbytky modulo 77.
- (a) $x \equiv 3 \pmod{11}$ a $x \equiv 2 \pmod{7}$. To odpovídá prvkům $x \equiv 58 \pmod{77}$.
 (b) $x \equiv 3 \pmod{11}$ a $x \equiv -2 \pmod{7}$. To odpovídá prvkům $x \equiv 47 \pmod{77}$.
 (c) $x \equiv -3 \pmod{11}$ a $x \equiv 2 \pmod{7}$. To odpovídá prvkům $x \equiv 30 \pmod{77}$.
 (d) $x \equiv -3 \pmod{11}$ a $x \equiv -2 \pmod{7}$. To odpovídá prvkům $x \equiv 19 \pmod{77}$.

Řešením tedy jsou $x \equiv 19, 30, 47, 58 \pmod{77}$.

(Řešení 30 a 19 jsme mohli najít už z předchozích znalostí jako -47 a -58.)

3. (a) Jacobiho symboly v tomto případě splývají s Legendreovými a pomocí nich můžeme zjistit, že první kongruence má řešení, zatímco druhá ne.
 (b) $x \equiv 39, 94, 115, 170 \pmod{209}$
 (c) Ačkoliv Jacobiho symbol vyjde 1, kongruence nemá řešení.

7.15 Prvočísla speciálních tvarů

7.16 Rozklad na součin cyklických grup

1. (a) $\mathbb{Z}_{360}^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$.
- (b) $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$,
- (c) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_5$,
- (d) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{16}$,
- (e) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{27}$.

7.17 Primitivní prvky

1. Postup pro $n = 11$:

Zkusíme ověřit zda je 2 primitivní prvek. $|\mathbb{Z}_{11}^*| = 10$, z Lagrangeovy věty mají prvky řád této grupě řád, jež dělí 10, tedy 1, 2, 5 nebo 10. Vidíme, že $2^1 \neq 1$, $2^2 = 4 \neq 1$ a $2^5 = -1 \neq 1$. Z toho už plyne, že řád 2 je 10 neboli že 2 primitivní prvek. Podobně bychom mohli vyzkoušet pro všechna ostatní čísla, zda jsou to primitivní prvky. Ukažme si ale chytřejší způsob využívající toho, že jeden generátor jsme již našli.

Z toho, že 2 je primitivní prvek, tak můžeme explicitně popsat izomorfismus $\mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_{11}^*$ tak, že prvku $a \in \mathbb{Z}_{10}$ přiřazuje $2^a \in \mathbb{Z}_{11}^*$. Víme, že generátory \mathbb{Z}_{10} jsou právě čísla nesoudělná s 10, tedy 1, 3, 7, 9, a zároveň izomorfismus musí zobrazovat generátory na generátory. Z toho dostáváme, že primitivní prvky modulo 11 jsou právě $2^1 = 2, 2^3 = 8, 2^7 = 7$ a $2^9 = 6$.

2. (a) Výpočet bude přímo kopírovat důkaz věty 5.5.a) a explicitně popíšeme izomorfismus $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{5^2} \cong \mathbb{Z}_{125}^*$. Proto tento postup v principu funguje **pouze** pro mocniny lichých prvočísel. Z důkazu věty plyne, že uvedený izomorfismus číslu (a, b) přiřadí $x^a \cdot 6^b$, kde x je libovolný pevný prvek řádu 4 a 6 je zvoleno jako $5 + 1$ ($125 = 5^3$). Zbývá nám tedy určit nějaký prvek řádu 4.

Z důkazu plyne, že se stačí podívat na nějaký primitivní prvek modulo 5, ten bude mít v \mathbb{Z}_{125}^* řád dělitelný 4, a tudíž po jeho vhodném umocnění už nějaký prvek řádu 4 najdeme. Primitivní prvek modulo 5 je například 2. $|\mathbb{Z}_{125}^*| = 100 = 2^2 \cdot 5^2$, tedy řád 2 musí dělit 100. Po vyzkoušení všech dělitelů zjistíme, že řád je 100 (pro potvrzení stačí ověřit $2^{50} \neq 1, 2^{20} \neq 1$, ostatní menší dělitelé některého z těchto dělí). Mohli bychom tady skončit a prohlásit, že 2 je primitivní prvek modulo 125. Dokončeme ale konstrukci uvedeného izomorfismu. Protože má 2 řád 100, tak $2^{25} = 57$ má řád 4.

Výše uvedený izomorfismus, tak může být tvaru $(a, b) \rightarrow 57^a 6^b$. V $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{5^2}$ umíme generátory zase jednoduše popsat (v obou souřadnicích musí být číslo nesoudělné se základem), jedním z nich je například $(1, 1)$, jako další primitivní prvek modulo 125 tak dostaneme $57 \cdot 6 = 92$.

- (b) $\mathbb{Z}_{250}^* \cong \mathbb{Z}_{125}^* \times \mathbb{Z}_2^*$, kde tento izomorfismus je dán z Čínské věty o zbytcích tak, že číslo modulo 250 přiřadí jeho zbytky po dělení 125 a 2. Prvky $\mathbb{Z}_{125}^* \times \mathbb{Z}_2^*$ jsou všechny tvaru $(a, 1)$ a protože 2 je primitivní prvek modulo 125, tak $(2, 1)$ bude generátor. Zbývá tedy určit, jaký prvek \mathbb{Z}_{250}^* přísluší této dvojici neboli

jaké číslo dává zbytek 2 po dělení 125 a 1 po dělení 2. Snadno nahlédneme, že je 127 a dostali jsme tak primitivní prvek modulo 250.

- (h) neexistuje
3. Které z následujících grup jsou cyklické?
 - (a) Ano.
 - (b) Ano.
 - (c) Ne.
 - (d) Ne.
 5. $\varphi(\varphi(p)) = \varphi(p - 1)$

7.18 Řešení kongruencí pomocí primitivních prvků

1. (a) Pokud x splňuje rovnici, tak jistě $x \neq 0 \pmod{13}$, tj. $(x \pmod{13}) \in \mathbb{Z}_{13}^*$. Jak víme z předchozích cvičení, primitivní prvek modulo 13 je například 2. Prvek 2 tak má řád 12 a všechny prvky \mathbb{Z}_{13}^* lze zapsat ve tvaru 2^a , $0 \leq a \leq 11$. Řešíme tedy kongruenci $(2^a)^3 = 2^{3a} \equiv 1 \pmod{13}$, což je splněno právě tehdy když $12 \mid 3a$ neboli $4 \mid a$. Dostáváme tak řešení $x \equiv 2^0, 2^4, 2^8 \pmod{13}$ čili $x \equiv 1, 3, 9 \pmod{13}$.

Poznámka: Pokud by se na pravé straně zadané kongruence nevyskytovala 1, ale jiný prvek \mathbb{Z}_{13}^* , mohli bychom si ho vyjádřit pomocí primitivního prvku ve tvaru 2^k pro vhodné k a situace by se řešila obdobně.

- (b) $x \equiv 1 \pmod{13}$
- (c) $x \equiv \pm 1 \pmod{13}$
- (d) $x \equiv 2, 3, 10, 11 \pmod{13}$
- (f) Tato kongruence nemá řešení.
- (g) $x \equiv 5, 6 \pmod{11}$

7.19 Carmichaelova čísla

7.20 Involuce

2. Hledáme tedy prvky $x \in \mathbb{Z}_{15}^*$ takové, že $x^2 = 1$ a $x \neq 1$. Máme tak $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$, což lze přepsat na součin

$$(x - 1)(x + 1) \equiv 0 \pmod{15}.$$

To je splněno právě tehdy, když $x \equiv \pm 1 \pmod{3}$ a $x \equiv \pm 1 \pmod{5}$ (3 a 5 jsou prvočísla, a tedy už musí některou z uvedených závorek dělit). To můžeme rozdělit na 4 případy, které vyřešíme pomocí čínské zbytkové věty:

- (a) $x \equiv 1 \pmod{3}$ a $x \equiv 1 \pmod{5}$. To odpovídá prvku $1 \in \mathbb{Z}_{15}^*$, o kterém ale víme, že není involucí.

- (b) $x \equiv 1 \pmod{3}$ a $x \equiv -1 \pmod{5}$. To odpovídá prvku $4 \in \mathbb{Z}_{15}^*$ (skutečně $4^2 = 16 \equiv 1 \pmod{15}$).
- (c) $x \equiv -1 \pmod{3}$ a $x \equiv 1 \pmod{5}$. To odpovídá prvku $11 \in \mathbb{Z}_{15}^*$.
- (d) $x \equiv -1 \pmod{3}$ a $x \equiv -1 \pmod{5}$. To odpovídá prvku $14 = -1 \in \mathbb{Z}_{15}^*$.

Všechny involuce v \mathbb{Z}_{15}^* jsou tedy $4, 11, 14$.

Jak víme, tak v cyklických grupách (tj. $\mathbb{Z}_n(+)$ pro nějaké n) existuje nanejvýš jedna involuce (plyne z řešitelnosti rovnice $2x \equiv 0 \pmod{n}$), grupa \mathbb{Z}_{15}^* tak nemůže být cyklická.

3. (a) 11, 19, 29,
- (c) 16, 35, 50.
5. $n = 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$

7.21 Míjení prvků

1. (a) Na \mathbb{Z}_{45} se díváme jako na sčítací grupu, hledáme tedy všechny prvky $a \in \mathbb{Z}_{45}$, že neplatí ani jedna z rovností $a = 5n$ a $5 = an$ pro žádné n . Z první podmínky vidíme, že pokud $5 \mid a$, tak 5 nemíjí a . Podobně si můžeme rozmyslet, že pokud $NSD(a, 45) = 1$ (tj. a má inverz modulo 45), tak existuje n takové, že $an \equiv 5 \pmod{45}$ – jednoduše stačí zvolit $n = 5a^{-1}$. Tyto prvky tedy taky nemíjí 5. Zbývá nám případ $5 \nmid a$ a $3 \mid a$. Ukážeme, že všechny tyto prvky skutečně už a míjí. Jistě $a \neq 5n$, neboť $5 \nmid a$. Podobně ale všechny prvky tvaru an jsou dělitelné 3 (což se v \mathbb{Z}_{45} zachová neboť $3 \mid 45$), což 5 nesplňuje. Tedy právě všechny prvky množiny $3\mathbb{Z}_{45} \setminus 5\mathbb{Z}_{45} = \{3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42\}$ míjí 5.
- (b) Neboť je 2 nesoudělná s 45, tak je v \mathbb{Z}_{45} invertibilní a generuje celou $\mathbb{Z}_{45} = \langle 2 \rangle$. Nemíjí tedy žádný prvek.
- (c) Situace je očividně velmi symetrická části a) a analogickými argumenty platí, že prvky a , které míjí 3 jsou právě takové, že $3 \nmid a$ a $5 \mid a$ neboli $NSD(a, 45) = 5$. Takové prvky jsou právě $\{5, 10, 20, 25, 35, 40\}$.
2. (a) Nemíjí žádný prvek.
- (b) $(3\mathbb{Z}_{60} \cup 5\mathbb{Z}_{60}) \setminus 2\mathbb{Z}_{60}$
- (c) $(3\mathbb{Z}_{60} \cup 5\mathbb{Z}_{60}) \setminus 4\mathbb{Z}_{60}$
- (d) $(4\mathbb{Z}_{60} \cup 5\mathbb{Z}_{60}) \setminus 6\mathbb{Z}_{60}$

7.22 Rabin-Millerovi svědci a lháři

1. ! Najděte nějakého lháře různého od 1 a nesoudělného svědka pro
 - (a) $N = 51 = 3 \cdot 17$, $N - 1 = 2 \cdot 25$. Lháři tedy budou právě $0 < a < 51$ splňující $a^{25} \equiv \pm 1 \pmod{51}$. Mohli bychom začít náhodně zkoušet čísla, trefili bychom se buď do lháře nebo svědka a postupně bychom našli příklad od obojího. Zkusme ale ukázat sofistikovanější postup, jak lháře najít. Rozebereme postupně dva možné případy:

i. $a^{25} \equiv 1 \pmod{51}$

Vidíme, že je to z čínské zbytkové věty ekvivalentní dvojici podmínek $a^{25} \equiv 1 \pmod{3}$ a $a^{25} \equiv 1 \pmod{17}$. To za pomocí Malé Fermatovy věty můžeme ekvivalentně upravit na $a \equiv 1 \pmod{3}$ a $a^9 \equiv 1 \pmod{17}$. Podmínka $a^9 \equiv 1$ je ovšem ekvivalentní $a \equiv 1 \pmod{17}$ neboť 9 nedělí řadu grupy \mathbb{Z}_{17}^* (viz minulé cvičení 12). Tedy tato větev postupu dává pouze lháře $a \equiv 1 \pmod{51}$, kterého jsme nechtěli.

ii. $a^{25} \equiv -1 \pmod{51}$

Stejně jako v předchozím případě získáme dvojici kongruencí $a \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}$ a $a^9 \equiv -1 \pmod{17}$. Můžeme si všimnout, že druhou z podmínek splňuje například (a pouze) $a \equiv -1 \pmod{17}$. Dohromady tak dostaneme lháře $a = 50 \equiv -1 \pmod{51}$.

Pokud bychom naopak chtěli svědka, tak musíme nesplnit alespoň jednu z podmínek $a \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}$ a $a^9 \equiv -1 \pmod{17}$. Můžeme tedy zvolit například $a \equiv 1 \pmod{3}$, tj. například $a = 4$ a dostaneme svědka složenosti 51.

(b) $221 = 13 \cdot 17$, $N - 1 = 220 = 2^2 \cdot 55$

Lháři tedy v tomto případě musí splňovat některou ze tří podmínek $a^{55} \equiv 1 \pmod{221}$, $a^{55} \equiv -1 \pmod{221}$, $a^{110} \equiv -1 \pmod{221}$.

Analogicky jako v předchozím případě (převedením na kongruence modulo prvočísla za použití ČZV, aplikací MFV a uvažování nesoudělnosti exponentu a řádu grupy) dostaneme, že první dva případy odpovídají přesně lhářům $a \equiv \pm 1 \pmod{221}$. Třetí podmínsku můžeme obdobně analogicky upravit na $a^2 \equiv -1 \pmod{13}$ a $a^{14} \equiv -1 \pmod{17}$.

K nalezení svědka si můžeme například všimnout, že volba $a \equiv 1 \pmod{13}$ a $a \equiv -1 \pmod{17}$ nesplňuje ani jednu z těchto tří podmínek a dostáváme tak svědka $a = 118$.

K nalezení lháře bychom opět mohli použít $221 - 1 = 220$ z druhé podmínky, nebo se můžeme pokusit splnit podmínsku třetí podmínsku. To už je ovšem pouze jednoduché řešení kongruencí (viz minulé cvičení) a funguje mimo jiné například volba $a \equiv 8 \pmod{13}$ a $a \equiv 13 \pmod{17}$, což nám dá lháře $a = 47$.

(c) Jediní lháři jsou 1, 38. Svědka lze zvolit jakkoliv jinak.

(d) Například 2 je svědek a 81 je lhář. Řešení je více.

2. $a = 1, 8$

7.23 RSA

7.24 Cyklotomické polynomy

2. (a) $x^7 - 1 = (x - 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$,
 - (b) $x^{12} - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)(x^2 - x + 1)(x^4 - x^2 + 1)$,
 - (c) $x^{15} - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^8 - x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - x + 1)$
3. Vyjde $x^4 + 1$. Jde si všimnout, že nemá racionální kořen a například výpočtem ověřit, že neexistuje rozklad na dva polynomy stupně 2.

7.25 Dirichletova věta o prvočíslech**7.26 Jiné**