



## 1. cvičení – Taylorův polynom

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

### Teorie

**Definice 1.** Necht  $f$  je funkce,  $a \in \mathbb{R}$  a existuje  $f^{(n)}(a) \in \mathbb{R}$ . Pak polynom

$$T_n^{f,a}(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n, \quad x \in \mathbb{R},$$

nazveme *Taylorovým polynomem řádu  $n$  funkce  $f$  v bodě  $a$* .

**Věta 2** (Lagrangeův tvar zbytku). Necht  $f$  je reálná funkce,  $a < x$ . Necht  $f$  má v každém bodě intervalu  $[a, x]$  vlastní  $(n+1)$ -derivaci. Pak existuje  $c \in (a, x)$  tak, že

$$f(x) - T_n^{f,a}(x) = \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}.$$

**Definice 3.** Necht  $f, g$  jsou reálné funkce a  $a \in \mathbb{R}^*$ . Řekneme, že funkce  $f$  je v bodě  $a$  malé o od  $g$  (značíme  $f(x) = o(g(x))$ ,  $x \rightarrow a$ ), pokud  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ .

Speciálně, zápis

$$f(x) = o(x^n)$$

značí, pokud  $f \neq 0$  na nějakém prstencovém okolí nuly, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0.$$

**Věta 4** (Vlastnosti  $o$ ). Necht  $a \in \mathbb{R}^*$ .

1. Jestliže  $f_1(x) = o(g(x))$ ,  $x \rightarrow a$ , a  $f_2(x) = o(g(x))$ ,  $x \rightarrow a$ , pak

$$(f_1 \pm f_2)(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow a.$$

2. Jestliže  $f_1(x) = o(g_1(x))$ ,  $x \rightarrow a$ , a  $f_2(x) = o(g_2(x))$ ,  $x \rightarrow a$ , pak

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = o((g_1 \cdot g_2)(x)), \quad x \rightarrow a.$$

3. Jestliže  $f(x) = o(g_1(x))$ ,  $x \rightarrow a$ , a  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \in \mathbb{R}$ , pak

$$f(x) = o(g_2(x)), \quad x \rightarrow a.$$

4. Jestliže  $f(x) = o(g(x))$ ,  $x \rightarrow a$  a  $h$  je nenulová na jistém prstencovém okolí bodu  $a$ , pak

$$(h \cdot f)(x) = o(g(x)h(x)), \quad x \rightarrow a.$$

5. Jestliže  $f(x) = o(g(x))$ ,  $x \rightarrow a$  a  $h$  je omezená na jistém prstencovém okolí bodu  $a$ , pak

$$(h \cdot f)(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow a.$$

6. Je-li  $m, n \in \mathbb{N}_0$ ,  $m \leq n$ , a  $f(x) = o((x-a)^n)$ ,  $x \rightarrow a$ , potom

$$f(x) = o((x-a)^m), \quad x \rightarrow a.$$

**Věta 5.** Necht'  $a, b \in \mathbb{R}^*$ , necht'  $\varphi$  je funkce definovaná na nějakém prstencovém okolí bodu  $a$  a necht'  $f$  a  $g$  jsou funkce definované na nějakém prstencovém okolí bodu  $b$ . Necht'  $f(y) = o(g(y))$ ,  $y \rightarrow b$  a  $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$ . Necht' dále existuje  $\delta > 0$  takové, že

$$\forall x \in P(a, \delta) : \varphi(x) \neq b.$$

Pak

$$f(\varphi(x)) = o(g(\varphi(x))), \quad x \rightarrow a.$$

**Věta 6** (Jednoznačnost Taylorova polynomu). Necht'  $f$  je funkce,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , existuje vlastní  $f^{(n)}(a)$  a  $P$  je polynom splňující  $\text{st } P \leq n$  a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P(x)}{(x - a)^n} = 0.$$

Pak  $P = T_n^{f,a}$ .

**Poznámka 7.** 1. Výraz  $R_n^{f,a}(x) := f(x) - T_n^{f,a}(x)$  nazýváme *zbytkem po Taylorově polynomu řádu  $n$* .  
2. Peanova věta tedy říká, že  $f(x) - T_n^{f,a}(x) = o((x - a)^n)$ ,  $x \rightarrow a$ .

## Hinty

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^n = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + b^n$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2$$

$$(a + b + c)^3 = a^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3ab^2 + 6abc + 3ac^2 + b^3 + 3b^2c + 3bc^2 + c^3$$

## Algoritmus - Rozvoj z definice

1. Zderivujeme funkci až do  $n$ -tého stupně.
2. Dosadíme bod  $a$  - získáme koeficienty.
3. Sestavíme Taylorův polynom.

## Příklady

### Z definice

1. Rozviňte funkci  $f(x) = -2x^2 - 6x + 2$  v bodě  $a = 4$ .  
Jak vypadá Taylorův polynom polynomu?
2. Najděte Taylorův polynom 3. stupně v 0 (není-li řečeno jinak)

$$(a) e^{-x} \quad (b) \sqrt{1+x} \quad (c) \ln x, a = 1 \quad (d) \arctan x \quad (e) \frac{1}{1+x}$$

3. Odvoďte rozvoje pro následující funkce do  $n$ -tého řádu v  $a = 0$ .

- (a)  $e^x$                       (b)  $\sin x$                       (c)  $\cos x$                       (d)  $\ln(1+x)$

4. Najděte Taylorovy polynomy:

- (a)  $\sqrt{x}$  v 1 do 5. stupně                      (d)  $x \ln x$  v 1 do 4. stupně  
(b)  $\cos \frac{x\pi}{2}$  v 1 do 9. stupně                      (e)  $\frac{1}{x}$  v 3 do 5. stupně  
(c)  $\frac{1-x}{1+x}$  v 0 do 7. stupně

5. Vyjádřete funkci  $\sin \frac{x\pi}{4}$  pomocí mocnin  $x - 2$ .

### Použitím vět

6. Odvoďte Taylorův rozvoj funkce v  $a = 0$  do  $m$ -tého řádu

- (a)  $f(x) = e^{2x-x^2}$ ,  $m = 5$ .  
(b)  $f(x) = \sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}$ ,  $m = 3$ .  
(c)  $\clubsuit \frac{1}{3-2x}$ ,  $m = \infty$   
(d)  $\heartsuit f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ ,  $m = 4$ .  
(e)  $\spadesuit f(x) = \frac{(1+x)^{100}}{(1-2x)^{40}(1+2x)^{60}}$ ,  $m = 2$ .  
(f)  $\clubsuit f(x) = \ln(\cos x)$ ,  $m = 6$ .  
(g)  $f(x) = \sin(\sin x)$ ,  $m = 3$ .  
(h)  $f(x) = \sqrt[3]{\sin x^3}$ ,  $m = 13$ .  
(i)  $\diamondsuit f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ ,  $m = 4$ .  
(j)  $f(x) = \begin{cases} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right), & x \neq 0, |x| < \pi \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ ,  $m = 6$ . Existenci  $f^{(6)}(0)$  berte jako fakt.  
(k)  $\heartsuit f(x) = \operatorname{tg} x$ ,  $m = 5$ .  
(l)  $f(x) = e^{-x^2} \arcsin x$ ,  $m = 5$

### Bonus

7. Víte-li, že Taylorův polynom funkce  $f$  je  $T_3^{f,0} = 2 - x - x^2/3 + 2x^3$ , určete hodnoty

- (a)  $f(0)$                       (b)  $f'(0)$                       (c)  $f''(0)$                       (d)  $f'''(0)$

8. Víte-li, že Taylorova řada  $\cos x$  v 0 je  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ , jak je na tom  $\frac{1}{2} \cos(2x)$ ?

- A  $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$               B  $\frac{1}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48}$               C  $\frac{1}{2} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$               D  $\frac{1}{2} - x^2 + \frac{x^4}{3}$

9. Je pravda, že jestliže  $T_2^{f,0} = T_2^{g,0}$ , pak  $f = g$ ?

10. Je pravda, že jestliže  $T_2^{f,0} = 1 + x - x^2$ , pak je  $f$  konkávní na okolí 0?

11. Který Taylorův polynom bude vhodný k aproximaci hodnoty  $\sin 3$ , nemáte-li kalkulačku?

- A  $x - \frac{1}{3}x^3$     C  $-(x - \pi) + \frac{1}{3!}(x - \pi)^3$   
 B  $1 - \frac{1}{2!}(x - \frac{\pi}{2})^2$                                       D  $\sin(3) - \frac{1}{3!}\sin(3)(x - 3)^3$




Figure 1: <https://www.gocomics.com/foxtrotclassics/2018/05/23>

(6c) Užití geometrickou řadu  $\frac{3(1-\frac{3}{2^n})}{1}$ .  
 (6d) Užití geometrickou řadu  $\frac{1-x+x^2}{1} = \frac{1-(x-x^2)}{1}$  a násobením  $\frac{1}{1-2x}$  a výrazů  $\frac{1-2x}{1}$  a  $\frac{1+2x}{1}$ , umocnění, vynásobení.  
 (6f) Rozviňte zevnitř.  
 (6i) Užití geometrickou řadu.  
 (6k) Rozviňte a použijte geometrickou řadu.