



25. cvičení – Lokální extrémy

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

Příklady

1. Najděte lokální extrémy funkcí

(a) $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$

Řešení:


Podotkněme, že je evidentní, že funkce f je nezáporná a nuly nabývá pouze v bodě $(0, 1)$, kde tedy nabývá globálního minima. Pojďme nicméně vyšetřit existenci extrémů standardním postupem. Funkce f je definována na \mathbb{R}^2 . Parciální derivace

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2(y - 1)$$

jsou spojité, tudíž f má v každém bodě totální diferenciál. Jediné body podezřelé z lokálních extrémů jsou tedy stacionární body, tj. body, kde jsou obě parciální derivace nulové. V jiných bodech funkce f nemůže mít extrém. Řešením rovnic

$$2x = 0, \quad 2(y - 1) = 0$$

vidíme, že jediným stacionárním bodem je bod $(0, 1)$, kde, jak už jsme zmínili funkce zřejmě nabývá globálního minima. Nemusíme tedy vyšetřovat definitnost matice druhého diferenciálu (navíc bychom tak dostali pouze informaci, že jde o lokální minimum).



(b) $f(x, y) = x^2 - (y - 1)^2$

Řešení:

Funkce f je definována na \mathbb{R}^2 . Parciální derivace

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2(y - 1)$$

jsou spojité, tudíž f má v každém bodě totální diferenciál. Jediné body podezřelé z lokálních extrémů jsou tedy stacionární body, tj. body, kde jsou obě parciální derivace nulové. V jiných bodech funkce f nemůže mít extrém. Řešením rovnic

$$2x = 0, \quad -2(y - 1) = 0$$

vidíme, že jediným stacionárním bodem je bod $(0, 1)$. Oproti předchozí úloze není automaticky vidět, zda se v tomto bodě nabývá extrému. Vyšetříme tedy definitnost matice druhého diferenciálu, tj. matici

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$


Určeme tedy nejprve druhé parciální derivace. Máme

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0.$$

Matice druhého diferenciálu (v bodě $(0, 1)$) má tedy tvar

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

a její hlavní determinanty jsou $D_1 = 2 > 0$, $D_2 = -4 < 0$. Protože druhý hlavní determinant (tedy determinant celé matice) je záporný, je matice druhého diferenciálu indefinitní, extrém se tedy v bodě $(0, 1)$ nenabývá. Funkce f tedy v žádném bodě nemá lokální extrém.



(c) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

Řešení:

Funkce f je definována na \mathbb{R}^2 . Spočtíme její parciální derivace. Máme

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x.$$

Stacionární body jsou ty, ve kterých jsou obě parciální derivace nulové. Najdeme je řešením soustavy

$$\begin{aligned} 3x^2 - 3y &= 0 \\ 3y^2 - 3x &= 0. \end{aligned}$$

Krácením trojek, vyjádřením $y = x^2$ z první rovnice a dosazením do druhé dostaneme rovnici

$$x^4 - x = 0,$$

kteřá má vzhledem k rozkladu $x^4 - x = x(x^3 - 1) = x(x - 1)(x^2 + x + 1)$ dvě řešení, $x_1 = 0$ a $x_2 = 1$. Těmto dvěma řešením přísluší řešení $y_1 = 0$ a $y_2 = 1$.

Druhé parciální derivace jsou

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -3.$$

Matice druhého diferenciálu v prvním stacionárním bodě $(1, 1)$ je tedy

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

hlavní subdeterminanty jsou $D_1 = 6 > 0$, $D_2 = 36 - 9 = 27 > 0$, matice je tedy pozitivně definitní a v bodě $(1, 1)$ má tedy funkce f lokální minimum $f(1, 1) = -1$. Matice druhého diferenciálu ve druhém stacionárním bodě $(0, 0)$ je

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

je indefinitní, funkce f v bodě $(0, 0)$ tedy nenabývá extrému. Indefinitnost určíme např. přes vlastní čísla:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -3 \\ -3 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9$$


Tedy $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -3$. Vlastní čísla mají tedy různá znaménka a matice je indefinitní.

(d) $f(x, y) = 2y^2 - 4xy + x^4 + 3$

Řešení: První derivace:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= -4y + 4x^3 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 4y - 4x \end{aligned}$$

Rovnice položíme rovny 0 a najdeme podezřelé body. Vyjde $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$.



Druhé derivace

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 12x^2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 4\end{aligned}$$

Dosadíme body do Hessovy matice $V(0, 0)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

je matice indefinitní, tedy tam není extrém.

Zdůvodnění indefinitnosti, např. přes vlastní čísla

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -4 \\ -4 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 16,$$

tedy $\lambda = 2 \pm 2\sqrt{5}$. Vlastní čísla mají různá znaménka, tedy je matice indefinitní. Jiný způsob. Uvažujme matici (prohozené role x a y)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \end{pmatrix}.$$

V bodě $(0, 0)$ máme

$$\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

a můžeme použít Sylvesterovo kritérium.

$V(1, 1)$:


$$\begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

lok. minimum.

$V(-1, -1)$:

$$\begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

lok. minimum.



(e) $f(x, y) = y^3 + y^2x - x^2 - 4x$

Řešení: První derivace:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 - 2x - 4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 + 2yx$$

Rovnice položíme rovny 0 a najdeme podezřelé body. Vyjde $(-2, 0)$, $(6, -4)$, $(-\frac{3}{2}, 1)$.

Druhé derivace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y + 2x$$

Dosadíme body do Hessiany matice.

V bodě $(-2, 0)$ máme

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

lok. maximum.

V bodě $(6, -4)$ máme

$$\begin{pmatrix} -2 & -8 \\ -8 & -12 \end{pmatrix}$$

není extrém.

V bodě $(-\frac{3}{2}, 1)$ máme

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

není extrém.

(f) $f(x, y) = 2x^3 + 9xy^2 + 15x^2 + 27y^2$

Řešení: První derivace:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + 9y^2 + 30x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 18xy + 54y$$


Rovnice položíme rovny 0 a najdeme podezřelé body. Vyjde $(0, 0)$, $(-5, 0)$, $(-3, 2)$, $(-3, -2)$.

Druhé derivace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x + 30$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 18y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 15x + 54$$



Dosadíme body do Hessiany matice.

V bodě $(0, 0)$ máme

$$\begin{pmatrix} 30 & 0 \\ 0 & 54 \end{pmatrix}$$

lok. minimum.

V bodě $(-5, 0)$ máme

$$\begin{pmatrix} -30 & 0 \\ 0 & -36 \end{pmatrix}$$

lok. maximum.

V bodě $(-3, 2)$ máme


$$\begin{pmatrix} -6 & 36 \\ 36 & 0 \end{pmatrix}$$

není extrém.

V bodě $(-3, -2)$ máme

$$\begin{pmatrix} -6 & -36 \\ -36 & 0 \end{pmatrix}$$

není extrém.



(g) $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$

Řešení: Příklad máme z http://www.math.muni.cz/~zemanekp/files/SRPzMA_II_FRMU.pdf

První derivace:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 12y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 12x$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2z + 2$$

Rovnice položíme rovny 0 a najdeme podezřelé body. Vyjde $(0, 0, -1)$, $(24, -144, -1)$.

Druhé derivace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 12$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = 0$$

Dosadíme body do Hessovy matice. V bodě $(0, 0, -1)$ máme

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Matice je indefinitní a tedy tam není extrém. Indefinitnost: Uvažujme matici (prohozené role x , y a z):

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \end{pmatrix}.$$

V bodě $(0, 0, -1)$ máme

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 12 \\ 0 & 12 & 0 \end{pmatrix}$$

a můžeme použít Sylvesterovo kritérium.

V bodě $(24, 144, -1)$ máme

$$\begin{pmatrix} 144 & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

lok. minimum.

(h) $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3(xy + xz)$

Řešení:

Příklad je z <http://projects.math.slu.cz/AM/activ/soubory/opory/VybrParrtCv.pdf>

Najdeme první parciální derivace

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y - 3z$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 3z^2 - 3x$$

Položíme je rovny 0 a najdeme podezřelé body. Výsledek: $(0, 0, 0)$ a $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$. Spočteme 2. parciální derivace a sestavíme Hessovu matici

$$\begin{pmatrix} 6x & -3 & -3 \\ -3 & 6y & 0 \\ -3 & 0 & 6z \end{pmatrix}$$

V bodě $(0, 0, 0)$ máme

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Upravíme symetrickými úpravami a zjistíme, že matice je indefinitní - tedy zde není extrém. Podrobněji. Od 2. řádku odečteme 3. řádek (a totéž na sloupci).

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Definitnost této matice je stejná, jako definitnost původní matice. Spočteme vlastní čísla:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & -3 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ -3 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 9\lambda = \lambda(-\lambda^2 + 9).$$

Vlastní čísla jsou tedy $0, \pm 3$. Tedy matice je indefinitní. V bodě $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$ máme

$$\begin{pmatrix} 6\sqrt[3]{4} & -3 & -3 \\ -3 & 6\sqrt[3]{2} & 0 \\ -3 & 0 & 6\sqrt[3]{2} \end{pmatrix}$$

Ze Sylvesterova kritéria plyne, že matice je pozitivně definitní a tedy zde je lok. minimum.

(i) $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + \frac{z^2}{2} - 3xz - 2y + 2z$

Řešení: Příklad máme z https://is.muni.cz/el/1433/podzim2011/MB103/um/Kapitola8_priklady.pdf

První derivace:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 3x^2 - 3z \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y - 2 \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= z - 3x + 2 \end{aligned}$$

Rovnice položíme rovny 0 a najdeme podezřelé body. Vyjde $(1, 1, 1), (2, 1, 4)$.

Druhé derivace

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 6x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= 1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = -3 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = 0 \end{aligned}$$

Dosadíme body do Hessovy matice. V bodě $(1, 1, 1)$ je

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

není extrém.

V bodě $(2, 1, 4)$ je

$$\begin{pmatrix} 12 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

lok. minimum.

(j) $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(2y^2 + x^2)$

Řešení: Příklad máme odsud: <http://homel.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html>

Funkce je $C^\infty(\mathbb{R}^2)$. Spočteme první parciální derivace

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= -2xe^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2 - 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -2ye^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2 - 2) \end{aligned}$$

a položíme je rovny 0. Řešíme tedy tuto soustavu:

$$\begin{aligned} -2xe^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2 - 1) &= 0 \\ -2ye^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2 - 2) &= 0 \end{aligned}$$

Protože $e^{-(x^2+y^2)} > 0$, dostáváme

$$\begin{aligned} -2x(x^2 + 2y^2 - 1) &= 0 \\ -2y(x^2 + 2y^2 - 2) &= 0 \end{aligned}$$

Z 1. rovnice plyne, že buď $x = 0$ nebo $x^2 + 2y^2 - 1 = 0$.

- $x = 0$ Dosadíme do druhé rovnice:

$$-2y2(y^2 - 1) = 0$$

tedy máme podezřelé body $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$.

- $x^2 + 2y^2 - 1 = 0$ Dosadíme do druhé rovnice:

$$-2y(-1) = 0$$

tedy $y = 0$. Dosadíme zpět do podmínky:

$$x^2 - 1 = 0.$$

Tedy máme podezřelé body $(1, 0)$, $(-1, 0)$.

Celkem máme 5 podezřelých bodů: $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$.
Pro určení extrémů spočteme 2. derivace

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= e^{-x^2-y^2}(4x^4 + 2x^2(4y^2 - 5) - 4y^2 + 2) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4xye^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2 - 3) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= e^{-x^2-y^2}(x^2(4y^2 - 2) + 8y^4 - 20y^2 + 4)\end{aligned}$$

Sestavíme Hessovu matici a dosadíme do ní podezřelé body. Dle Sylvesterova kritéria určíme definitnost matice a případné lok. extrémy.

- $(0, 0)$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Lok. minimum.

- $(0, 1)$

$$\begin{pmatrix} -2/e & 0 \\ 0 & -8/e \end{pmatrix}$$

Lok. maximum.

- $(0, -1)$

$$\begin{pmatrix} -2/e & 0 \\ 0 & -8/e \end{pmatrix}$$

Lok. maximum.

- $(1, 0)$

$$\begin{pmatrix} -4/e & 0 \\ 0 & 2/e \end{pmatrix}$$

Není extrém.

- $(-1, 0)$

$$\begin{pmatrix} -4/e & 0 \\ 0 & 2/e \end{pmatrix}$$


Není extrém.

(k) $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}$, $x, y > 0$

Řešení:

Funkce f je dle zadání definována na prvním kvadrantu. Spočteme její parciální derivace. Máme

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y - \frac{50}{x^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x - \frac{20}{y^2}.$$



Stacionární body jsou ty, ve kterých jsou obě parciální derivace nulové. Najdeme je řešením soustavy

$$\begin{aligned} y - \frac{50}{x^2} &= 0 \\ x - \frac{20}{y^2} &= 0. \end{aligned}$$

Z první rovnice máme, že $y = \frac{50}{x^2}$, dosazením do druhé a přenásobením jmenovatelem získáme rovnici

$$x - \frac{20}{50^2} x^4 = 0.$$

Její řešení jsou $x_1 = 0$ a $x_2 = \sqrt[3]{\frac{50^2}{20}} = \sqrt[3]{125} = 5$. První řešení ovšem nemůže být částí řešení celé soustavy. Odpovídající hodnotou pro druhý kořen je $y_2 = \frac{50}{25} = 2$. Funkce f má tedy (v prvním kvadrantu) jediný stacionární bod $(5, 2)$.

Druhé parciální derivace jsou

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{100}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{40}{y^3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1.$$

Matice druhého diferenciálu v bodě $(5, 2)$ je tedy

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$


hlavní subdeterminanty jsou $D_1 = \frac{4}{5} > 0$ a $D_2 = 4 - 1 = 3 > 0$, matice je tedy pozitivně definitní a funkce f má tudíž v bodě $(5, 2)$ (ostré) lokální minimum $f(5, 2) = 30$.

(1) $f(x, y) = (x - y + 1)^2$


Řešení:

Je vidět, že funkce f je nezáporná. Ve všech bodech přímky $x - y + 1 = 0$ tedy nabývá globálního minima. Přesvědčíme se, že jiné extrémy funkce f nemá. Parciální derivace jsou

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(x - y + 1), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2(x - y + 1).$$



Je zjevné, že obě parciální derivace jsou nulové právě v bodech zmíněné přímky. V jiných bodech se tedy extrému nenabývá.



Bonus

2. Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 6xy + 2z$

Hint: V $[0, 0, -1]$ zkoumáme přímkou $[x, 0, -1]$.

Řešení: První derivace:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 6y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 6x$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2z + 2$$

Rovnice položíme rovny 0 a najdeme podezřelé body. Vyjde $(0, 0, -1)$, $(6, -18, -1)$.

Druhé derivace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = 0$$

Dosadíme body do Hessovy matice. V bodě $(6, -18, -1)$ je

$$\begin{pmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

lokální minimum.

V bodě $(0, 0, -1)$ je

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nyní buď ukážeme, že matice je indefinitní (technikami z lineární algebry), nebo zkusíme vyšetřit funkci na nějaké vhodné přímce. Uvažujme tedy přímkou $(x, 0, -1)$. Tato přímka prochází bodem $(0, 0, -1)$. Po dosazení dostaneme

$$f(x, 0, -1) = x^3 + 1 - 2 = x^3 - 1.$$

Jde o funkci jedné proměnné, která v bodě $x = 0$ nemá ani maximum, ani minimum. Tedy ani původní funkce (3 proměnných) nemůže mít v bodě $(0, 0, -1)$ maximum ani minimum.

3. Ukažte, že funkce $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$ má v $[0, 0]$ lok. minimum vzhledem ke všem přímkám, ale nemá tam minimum.

Hint: Zkoumejte hodnoty na křivce $[\frac{3}{4}y^2, y]$.

Řešení: Hodnoty na přímkách: zkoumáme funkci tvaru

$$g(x) = f(x, kx) = (x - k^2x^2)(2x - k^2x^2) = 2x^2 + k^4x^4 - 3xk^2x^3.$$

Jde vlastně o funkci jedné proměnné, tedy

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4x + 4k^4x^3 - 9k^2x^2, & g'(0) &= 0 \\ g''(x) &= 4 + 12k^4x^2 - 18k^2x, & g''(0) &= 4 \end{aligned}$$

Tedy jde o lok. minimum.

Speciální případ: přímka $x = 0$, pak $f(0, y) = y^4$, zjevně jde o lok. minimum.

Ale na křivce $(\frac{3}{4}y^2, y)$ dostaneme

$$f\left(\frac{3}{4}y^2, y\right) = -\frac{1}{8}y^4,$$

tedy zřejmě jde o lok. maximum.

4. Najděte Hessovu matici v následujících funkcích $[0, 0]$ a diskutujte existenci maxima/minima/sedla vzhledem k semidefinitnosti matice.

(a) $x^4 + y^4$


Řešení: Hessova matice je tvaru

$$\begin{pmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

tedy v $(0, 0)$ je

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

V bodě je lok. minimum (tvar „mistička“).




(b) $-x^4 - y^4$ **Řešení:** Hessova matice je tvaru

$$\begin{pmatrix} -12x^2 & 0 \\ 0 & -12y^2 \end{pmatrix}$$

tedy v $(0,0)$ je

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

V bodě je lok. maximum (tvar „kopeček“).




(c) $x^4 - y^4$ **Řešení:** Hessova matice je tvaru

$$\begin{pmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & -12y^2 \end{pmatrix}$$

tedy v $(0, 0)$ je

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

V bodě není extrém (tvar „sedlo“).



Závěr: Ve všech případech vyšla semidefinitní matice, přitom se tam našlo lok. minimum, maximum i sedlo. Ze semidefinitní matice tedy nelze o existenci extrémů nic říct.