

Důležité substituce: převod na racionální funkce

Jsou-li P, Q polynomy $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, pak $R := \frac{P}{Q}$ nazveme racionální funkce jedné reálné proměnné, platí $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Obecněji, jsou-li P, Q polynomy dvou reálných proměnných, tj. $P, Q : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, kde $P(x, y) = \sum_{0 \leq i+j \leq n} a_{ij}x^i y^j$ a $Q(x, y) = \sum_{0 \leq i+j \leq m} b_{ij}x^i y^j$, pak $R := \frac{P}{Q}$ nazveme racionální funkce dvou reálných proměnných, platí $R(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$.

$$(I) \quad \int \mathbf{R}(e^{\alpha x}) dx$$

Substituce: $y = e^{\alpha x}, \quad x \in \mathbb{R}$

Tvar derivace: $dx = \frac{1}{\alpha y} dy$

Výsledek: $\int R(y) \frac{1}{\alpha y} dy$

$$(II) \quad \int \frac{\mathbf{R}(\ln x)}{x} dx$$

Substituce: $y = \ln x, \quad x > 0$

Tvar derivace: $\frac{dx}{x} = dy$

Výsledek: $\int R(y) dy$

$$(III) \quad \int \mathbf{R}\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{s}}\right) dx$$

Substituce: $t = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{s}}$

Podmínky: $ad - bc \neq 0; \quad s = 2k \implies \frac{ax+b}{cx+d} > 0, \quad s = 2k-1 \implies x \neq -\frac{d}{c}$

Inverze: $x = \frac{-dt^s + b}{ct^s - a}$

Tvar derivace: $dx = (ad - bc)s \frac{t^{s-1}}{(ct^s - a)^2} dt$

Výsledek: $(ad - bc)s \int \frac{\hat{R}(t^s, t)t^{s-1}}{(ct^s - a)^2} dt$

$$(IV) \quad \int \mathbf{R}(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad \text{Eulerovy substituce}$$

Čtyři netriviální případy (někdy i dva najednou).

$$(1) \quad ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), \quad x_1 < x_2, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

Substituce: $t = \left(\frac{x-x_1}{x-x_2}\right)^{\frac{1}{2}}$ vede k (III)

$$(2) \quad a > 0$$

Substituce: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t \implies x = (t^2 - c)/(b - 2\sqrt{at})$

$$(3) \quad c > 0$$

Substituce: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{c} + tx \implies x = (2\sqrt{ct} - b)/(a - t^2)$

$$(4) \quad a \leq 0 \text{ a } ax^2 + bx + c \text{ nemá v } \mathbb{R} \text{ kořen } (\implies c \leq 0): \text{ odmocnina není v } \mathbb{R}$$

pro žádné x definována.

(V)	$\int \mathbf{R}(\cos x, \sin x) dx$	Goniometrické substituce
-----	--------------------------------------	--------------------------

Substituce: $y = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ $x \neq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Inverze: $x = 2 \operatorname{arctg} y$

Tvar derivace: $dx = \frac{2}{1+y^2} dy$

cosinus: $\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - y^2}{1 + y^2}$

sinus: $\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2y}{1 + y^2}$

Zjednodušení:

- (1) $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x) \implies$ Substituce: $y = \sin x$
- (2) $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x) \implies$ Substituce: $y = \cos x$
- (3) $R(-\cos x, -\sin x) = R(\cos x, \sin x) \implies$ Substituce: $y = \operatorname{tg} x, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$\cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$

$$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{y^2}{1 + y^2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{y}{1 + y^2}$$

(VI)	$\int x^m (a + bx^n)^p dx, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}$	Čebyševovy substituce
------	--	-----------------------

Umíme řešit pomocí elementárních funkcí pouze v následujících třech případech:

- (1) $p \in \mathbb{Z}$. Pak položme $m = m'/\ell, n = n'/\ell$, kde m', n' a $\ell \in \mathbb{Z}, \ell > 0$.

Substituce: $t = x^{\frac{1}{\ell}}$

- (2) $(m+1)/n \in \mathbb{Z}, p = k/s, k, s \in \mathbb{Z}$

Substituce: $t = (a + bx^n)^{\frac{1}{s}}$

Inverze: $x = \frac{(t^s - a)^{1/n}}{b^{1/n}}$ Tvar derivace: $dx = \frac{1}{nb^{1/n}}(t^s - a)^{\frac{1}{n}-1} st^{s-1} dt$.

$$\begin{aligned} Výsledek: \int x^m (a + bx^n)^p dx &= \int \frac{1}{b^{\frac{m}{n}}} (t^s - a)^{\frac{m}{n}} t^k \frac{1}{nb^{\frac{1}{n}}} (t^s - a)^{\frac{1}{n}-1} st^{s-1} dt \\ &= \frac{s}{nb^{\frac{m+1}{n}}} \int t^{s+k-1} (t^s - a)^{\frac{m+1}{n}-1} dt \end{aligned}$$

- (3) $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}, p = k/s, k, s \in \mathbb{Z}$

Substituce: $t = (ax^{-n} + b)^{\frac{1}{s}}$

Inverze: $x = \left(\frac{a}{t^s - b}\right)^{\frac{1}{n}}$ Tvar derivace: $dx = -\frac{a^{1/n}}{n}(t^s - b)^{-\frac{1}{n}-1} st^{s-1} dt$

$$\begin{aligned} Výsledek: \int x^m (a + bx^n)^p dx &= \int x^m x^{np} (ax^{-n} + b)^{\frac{k}{s}} dx \\ &= \int \left(\frac{a}{t^s - b}\right)^{\frac{m}{n}} t^k \left(\frac{a}{t^s - b}\right)^p \frac{a^{\frac{1}{n}}}{-n} (t^s - b)^{-\frac{1}{n}-1} st^{s-1} dt \\ &= -\frac{a^{\frac{m+1}{n}+p}s}{n} \int t^{k+s-1} (t^s - b)^{-\left(\frac{m+1}{n}+p-1\right)} dt \end{aligned}$$