

2. ZÁKLADY SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY

2.1. Motivace: řešení jdné ODR

Příklad. Uvažujme počáteční úlohu pro ODR

y'' + y = f(x), na (0, a), a > 0, (1)
y(0) = 1,
y'(0) = 0,

kde f in C([0, a]). Řešení této úlohy pro f = 0 je y = cos x, jak snadno zjistíme například metodou charakteristického polynomu.

Pro nalezení jdného (partikulárního) řešení rovnice s pravou stranou f můžeme použít například metodu variace konstant.

Zkuste y_p = c_1(x) cos x + c_2(x) sin x

dosadíme rovnice pro c_1(x), c_2(x):

c_1'(x) cos x + c_2'(x) sin x = 0
-c_1'(x) sin x + c_2'(x) cos x = f(x) (2)

odkud plyne c_1' = -f . sin x
c_2' = f . cos x

a tedy c_1(x) = - integral_0^x f(t) sin t dt, c_2(x) = integral_0^x f(t) cos t dt jsou jedna z řešení (2). *)

Dodáváme

y_p = sin x integral_0^x f(t) cos t dt - cos x integral_0^x f(t) sin t dt =
= integral_0^x f(t) (sin x cos t - cos x sin t) dt = integral_0^x f(t) sin(x-t) dt,

*) Pozn: Můžeme také samozřejmě zvolit pro c_1 resp. c_2 i jiné primitivní funkce k -f(x) sin x resp. f(x) cos x (lišících se však jen o konst.), tato volba však způsobí, že y_p splňuje počáteční podmínky.

tedy celkem

$$y(x) = c_1 x + \int_0^x f(t) \sin(x-t) dt. \quad (3)$$

Dosažením se lze přesvědčit, že funkce y daná předpisem (3) je řešením úlohy (1) (a n navíc máme, že je řádným).

Lemma: Při dosazení (3) do (1) se může hodit následující lemma o derivování integrálu jím podle parametru, tak podle měří:

Lemma. Buďte $a, b \in C^1(\alpha, \beta)$, $a(\alpha, \beta) \subset (A, B)$, $b(\alpha, \beta) \subset (A, B)$
 $g \in C^1((\alpha, \beta) \times (A, B))$, a necht' funkce a, b, g a $\frac{\partial g}{\partial x}$ jsou omezené na svých definičních obzorech. Pak:

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(x, t) dt = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt + g(b(x)) \cdot b'(x) - g(a(x)) \cdot a'(x), \quad (4)$$

$x \in (\alpha, \beta)$.

Důkaz

Protože g je omezená ve druhé proměnné, existuje $G \in C^1((\alpha, \beta) \times (A, B))$ taková, že

$$\frac{\partial G}{\partial t}(x, t) = g(x, t), \quad (x, t) \in (\alpha, \beta) \times (A, B). \quad (4.a)$$

Podle Newton-Leibnizovy formule tedy je

$$\int_{a(x)}^{b(x)} g(x, t) dt = G(x, b(x)) - G(x, a(x)). \quad \Bigg| \frac{d}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(x, t) dt = \frac{d}{dx} \left(G(x, b(x)) - G(x, a(x)) \right) =$$

$$= \underbrace{\frac{\partial G}{\partial x}(x, b(x)) - \frac{\partial G}{\partial x}(x, a(x))}_{\text{derivace podle 1. proměnné}} + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial t}(x, b(x)) \cdot b'(x) - \frac{\partial G}{\partial t}(x, a(x)) \cdot a'(x)}_{\substack{g(x, b(x)) \\ g(x, a(x)) \\ \text{dle (4.a)}}$$

Díky se dovoluji říci, že se měří, že

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x, c) - \frac{\partial G}{\partial x}(x, d) = \int_d^c \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt$$

Shukněme, je-li $G(x, t)$ primitivní ke $g(x, t)$ v proměnné t ,

je $\frac{\partial G}{\partial x}(x, t)$ primitivní ke $\frac{\partial g}{\partial x}(x, t)$, v proměnné t , na vhodné předpoklady. Proveďte podobně.

□

Uvažujme nyní modifikaci úlohy (1), a sice

$$\begin{aligned} y'' + y &= f(x) y(x) \quad \text{na } (0, a), \quad a > 0, \\ y(0) &= 1, \\ y'(0) &= 0, \end{aligned} \tag{5}$$

na pravé straně rovnice máme tedy se zdvojeným členem žádnou "mětenu vanku".

Protože na základě analogie si můžeme vyslovit následující hypotézu:

Poleť existuje funkce $y \in C([0, a])$, která splňuje rovnici

$$y(x) = \cos x + \int_0^x f(t) \sin(x-t) y(t) dt, \tag{6}$$

Jeď je tato funkce kříd $\mathcal{C}^2(\langle 0, a \rangle)$ a řeší úlohu (5).

Ověřme tuto hypotézu a využijme lemmatu z předchozího.
Především platí, že pokud je $y \in \mathcal{C}(\langle 0, a \rangle)$, je integrand v (6) spojité,
tedy je $y \in \mathcal{C}^1(\langle 0, a \rangle)$, a máme

$$y'(x) = -\sin x + \int_0^x f(t) \cos(x-t) y(t) dt + 0, \quad (7)$$

odtud stejnou úvahou máme $y' \in \mathcal{C}^1(\langle 0, a \rangle)$, tedy $y \in \mathcal{C}^2(\langle 0, a \rangle)$, a

$$y''(x) = -\cos x - \int_0^x f(t) \sin(x-t) y(t) dt + f(x) y(x). \quad (8)$$

Z (6)-(8) dostaneme $y'' + y = f(x) y(x)$, stejně jako $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Ověřiti jme tedy, že

Pokud existuje $y \in \mathcal{C}(\langle 0, a \rangle)$ která, je platí (6), je tato funkce klasickým řešením úlohy (5). (9)

Ukážeme nyní, že úlohu (6) nemůžeme řešit, protože ji přeformulovali-
me tak, že uvolňujeme pohled na tuto přeformulovanou úlohu
a doplníme existence (i jedinečnost) řešení odpovídá.

První

$$y(x) = \underbrace{\cos x}_{u(x)} + \int_0^x \underbrace{\sin(x-t) f(t)}_{K(x,t)} y(t) dt$$

... integrační jádro

$$y(x) = u(x) + \int_0^x K(x,t) y(t) dt \quad (10)$$

Ukážeme přeformulovanou úlohu (6) na obecnější integrační rovnici (10)

Vyšetříme však ještě obecnější formulaci. Označme

$$Ty(x) := \int_0^x K(x,t)y(t)dt = \int_0^x \sin(x-t)f(t)y(t)dt, \quad (11)$$

kde $T: C(\langle 0, a \rangle) \rightarrow C(\langle 0, a \rangle)$ je (evidentně) lineární operátor. Úkol (b) resp. (10) pak lze chápat jako rovnici

$$y = u + Ty \quad (12)$$

na Banachově prostoru $C(\langle 0, a \rangle)$. (12) můžeme psát také

$(Id - T)y = u$, kde Id je identický operátor na $C(\langle 0, a \rangle)$, nebo (můžeme ovšem zcela formálně, protože nemáme, zda něco jako „inverzní operátor k $Id - T$ “ existuje)

$$y = (Id - T)^{-1}u. \quad (13)$$

Formulace (13) má s důvěrou až k těmto otázkám:

- Jde-li jsm vlastně o operátor T z (11)?
- Za jakých podmínek existuje operátor inverzní k $Id - T$, a jaké má vlastnosti?
- Je y , „definované“ pomocí (13) vzhledem k naší úloze?

Nejprve odjvíme na první otázku: T je lineární a omezený, tedy spojité operátor na $C(\langle 0, a \rangle)$, tedy $T \in \mathcal{L}(C(\langle 0, a \rangle))$.

Připomeňme:

$$\|y\|_{C(\langle 0, a \rangle)} = \sup_{x \in \langle 0, a \rangle} |y(x)| \quad (= \|y\|_{\infty}),$$

Důkaz: Linearity je zřejmá, pro omezenost uvažme nejprve

$$\begin{aligned} \|Ty\|_{\infty} &= \sup_{x \in \langle 0, a \rangle} \left| \int_0^x \sin(x-t)f(t)y(t)dt \right| \leq \\ &\leq \sup_{x \in \langle 0, a \rangle} \int_0^x |f(t)||y(t)|dt \leq a \cdot \|f\|_{\infty} \|y\|_{\infty}, \end{aligned}$$

$$\|T\|_{\mathcal{L}(C[a,b])} = \sup_{\|y\|_\infty \leq 1} \|Ty\|_\infty \leq \sup_{\|y\|_\infty \leq 1} a \|f\|_\infty \|y\|_\infty \leq a \|f\|_\infty < \infty,$$

(13b)

je tedy (pro každé $\langle 0, a \rangle$ je otevřený interval) a omezený operátor. □

Pro otáčení na další otázky máme předloženu následující větu. Určimete si, že její velká abstrakce je ponecháme: v poznámce je o jejího malý úlohy a operátory věci.

Věta 1 Buď X Banachův prostor, $T \in \mathcal{L}(X)$. Definujme $T^0 \equiv Id$, $T^{i+1}y = T(T^i y)$ tzv. iterovaný operátor. Dále necht' je splněna alespoň jedna z následujících tří podmínek:

- (a) $\|T\|_{\mathcal{L}(X)} < 1$,
- (b) $\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\|_{\mathcal{L}(X)} < \infty$,
- (c) $\sum_{i=0}^{\infty} \|T^i y\|_X < \infty \quad \forall y \in X$,

Potom

- 1) $\forall u \in X$ existuje jediné $y \in X$ takové, že $(Id - T)y = u$.
- 2) Definujme - li zobrazení " $u \mapsto y$ " z předchozího bodu, a označme - li její $(Id - T)^{-1}$, platí:

$$(Id - T)^{-1}(Id - T) = (Id - T)(Id - T)^{-1} = Id,$$

a navíc

$$(Id - T)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} T^j \quad (:= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^m T^i) \quad (14)$$

ve smyslu konvergence v $\mathcal{L}(X)$.

Dom:

① Dode se (14) se kládá von Neumannova řada operátorem T ,

② U následujícím ukážeme, že $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$, že jde tedy o různé podmínky.

Platí

$$\|T^2 y\|_X = \|T(Ty)\|_X \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)} \|Ty\|_X \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)}^2 \|y\|_X.$$

Odtud $\|T^2\| = \sup_{\|y\|_X \leq 1} \|T^2 y\|_X \leq \|T\|^2$ a indukci

známo

$$\|T^j\|_{\mathcal{L}(X)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)}^j. \quad (15)$$

Odtud tedy platí (a), že $\sum_{j=0}^n \|T^j\| \leq \sum_{j=0}^n \|T\|^j \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|T\|^j < \infty$,

a limitní přechod $n \rightarrow \infty$ vede na důvě (b). Pokud platí (b), že

$$\sum_{j=0}^n \|T^j y\| \leq \|y\| \sum_{j=0}^n \|T^j\| \leq \|y\| \sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| < \infty, \text{ odtud (c).}$$

Shledáme tedy $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$ a bude stačit ukázat, že podmínka (c) implikuje konvergenční řadu. (Jme však oděci na to, že máme tři různé podmínky: různé operátory mohou splňovat a), b) nebo c), viz dále.)

③ Ještě měi větší dokážeme, převedeme se, že operátor T , definovaný v (11), splňuje její předpoklady: $\mathcal{C}(\langle 0, a \rangle)$ je Banachův prostor a $T \in \mathcal{L}(\mathcal{C}(\langle 0, a \rangle))$. U (13b) jme navíc ukázali, že

$$\|T\|_{\mathcal{L}} \leq a \|f\|_{\infty}.$$

Odtud ihned dokážeme, že pro každé $f \in \mathcal{C}(\langle 0, b \rangle)$ existuje takové $a \in (0, b)$, že $\|T\| < 1$. Z konvergenční řady dokážeme

Existenci a jednoduše řešené rovnice (6), kde (5), na
řádkově uzavřeném intervalu $\langle 0, a \rangle$ tak, aby $a \|f\|_\infty < 1$.
 Toto je typický představitel tzv. věty o lokální existenci řešení
 diferenciálních rovnic.

Nejde o to, aby bylo možné najít řešení v daném, ale tento interval
 existence řešení závisí na velikosti parametru f .

Toto tvrzení nám zároveň bude sloužit i jako pomocník:
 ukážeme nyní, že Taylorův polynom (6) lze použít k
 odhadu na velikost a ; jinými slovy naše odhady přimají:

$$|T_1 y(x)| \leq \int_0^x |f(t)| |y(t)| dt \leq x \|f\|_\infty \|y\|_\infty \quad (\text{neděláme } \sup)$$

$$\begin{aligned} \text{dále} \quad |T^2 y(x)| &\leq \int_0^x |f(t)| |T_1 y(t)| dt \leq \|f\|_\infty^2 \|y\|_\infty \int_0^x t dt \\ &= \frac{x^2}{2} \|f\|_\infty^2 \|y\|_\infty, \end{aligned} \quad x \in \langle 0, a \rangle$$

odhad dále provedeme indukcí

$$|T^j y(x)| \leq \frac{x^j}{j!} \|f\|_\infty^j \|y\|_\infty.$$

At nyní provedeme sup a dále máme $\|T^j y\| \leq \frac{a^j}{j!} \|f\|_\infty^j \|y\|_\infty$
 $x \in \langle 0, a \rangle$

a tedy $\|T^j\| = \sup_{\|y\|_\infty \leq 1} \|T^j y\| \leq \frac{a^j}{j!} \|f\|_\infty^j$. Odhad:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| \leq \exp(a \|f\|_\infty) < \infty.$$

Podmínka (b) je tedy splněna a my jsme došli k závěru, že
 pokud doložíme větu 1, ukážeme jsme zároveň existenci a
 jednoduše řešené (klasického) řešení rovnice (5) pro libovolný (ale
 omezený) interval $\langle 0, a \rangle$, a pro libovolnou $f \in C(\langle 0, a \rangle)$.

Důkaz Věty 1.

Podle bodu (2) předchozí poznámky máčí ukázat, že vlastní řešení y je n. předpokladu (c).

Definujeme následující posloupnost prvků $y_n \in X$ (která „iterací-mí proces“).

$$y_0 \in X \text{ libovolný}$$

$$y_{n+1} := u + T y_n.$$

Máme $y_1 = u + T y_0$

$$y_2 = u + T y_1 = u + T u + T^2 y_0,$$

indukcí snadno plyne

$$y_n = \sum_{j=0}^{n-1} T^j u + T^n y_0. \quad (16)$$

Ukážeme, že posloupnost y_n má v X limitu. Protože X je Banachovské, a tedy úplné, máčí pro konvergenci y_n ukázat, že $\{y_n\}$ je Cauchyovská posloupnost. Zvolme tedy $\varepsilon > 0$, uvažme $n > m$ a počítáme:

$$y_n - y_m = \sum_{j=m}^{n-1} T^j u + T^n y_0 - T^m y_0,$$

$$\text{tedy} \quad \|y_n - y_m\| \leq \sum_{j=m}^{n-1} \|T^j u\| + \|T^n y_0\| + \|T^m y_0\|.$$

Protože platí podmínka (c), je první člen menší než ε pro dostatečně velká $n > m$. Stejně tak členy $\|T^n y_0\|, \|T^m y_0\|$ jsou (jako n -tý resp. m -tý člen konvergentní řady $\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j y_0\|$) menší než ε pro dostatečně velká n, m .

Posloupnost $\{y_n\}$ je tedy Cauchyovská v Banachovské prostoru X , proto je konvergentní v X , tedy existuje $y \in X$ takové, že

$y_n \xrightarrow{X} y$. Proti T je spoj. $y', k T y_n \xrightarrow{X} T y$, tedy

platí i

$$y_{n+1} = u + T y_n$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$y = u + T y$$

a y je řešením rovnice $y = u + T y$ (pro libovolné $u \in X$).
Ukáme, že toto řešení je jediné. Necht' tedy jsou dvě, y a z ,
tedy necht' platí

$$y = u + T y$$

$$z = u + T z$$

Odečtením těchto rovnic a označením $w = y - z$ získáme
vztah

$$w = T w.$$

Odkud všem indexů plyne $w = T w = T^2 w = \dots = T^j w \quad \forall j \in \mathbb{N}$.
Tedy $\|w\| = \|T^j w\| \quad \forall j \in \mathbb{N}$. Řada $\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j w\|$ je všem konvergentní
řada typu (c) tedy

$$\|w\| = \lim_{j \rightarrow \infty} \|T^j w\| = 0, \text{ odkud } w = 0,$$

a tedy $y = z$.

Úloha $y = u + T y$ má tedy $\forall u \in X$ právě jedno řešení $y \in X$.

Jinak řečeno: Víme: $\left. \begin{array}{l} \text{Id} - T \text{ lin} + \text{opj} \\ \forall u \in X \exists! y \in X, (\text{Id} - T)y = u \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Id} - T \text{ je ma} \\ \text{a prosté.}$

Zobrazení $u \mapsto y$ je tedy dobře definované zobrazení z X do X .

Označme jej $(\text{Id} - T)^{-1}$, tj. $y = (\text{Id} - T)^{-1} u, \forall u \in X$. Je line-
ární a prosté, nemáme nic a jeho spoj. vlasti.

Z (16) dostaneme

$$y_n = \sum_{j=0}^{n-1} T^j u + T^n y_0$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} T^j u + 0,$$

tedy máme pro všechna $u \in X$: $(\text{Id} - T)^{-1} u = \sum_{j=0}^{\infty} T^j u$, neboli
 $(\text{Id} - T)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} T^j$ ve smyslu rovnosti operátorů.

Konečně, označme

$$S_N := \sum_{j=0}^N T^j.$$

$$\text{Pak } S_N \circ (\text{Id} - T) = \sum_{i=0}^N T^i - \sum_{i=1}^{N+1} T^i = T^0 - T^{N+1} = \text{Id} - T^{N+1}$$

a podobně pro $(\text{Id} - T) \circ S_N$.

↓
0

□

Poznámka: Časem uvidíme, že platí: je-li operátor $T: X \rightarrow X$ lineární, omezený, prostý a na, pak jeho inverze T^{-1} (kdeá existuje) je také lineární a omezená, tj. spjitá.

To má sídlo do mostí úlohy kn. provedl stabilitu. Je-li totiž inverzní operátor (u našem případě $(\text{Id} - T)^{-1}$) spjitý, pak kn omezená, je pro

$$u_n \xrightarrow{X} u \Rightarrow \underbrace{(\text{Id} - T)^{-1} u_n}_y \xrightarrow{X} (\text{Id} - T)^{-1} u$$

jinak řečeno, „blízkým pravým stranám rovnice M_n “ odpovídá „blízká řešení“, či: malé změny na pravé straně rovnice způsobí malé změny řešení. A to právě je stabilita řešení.

17) Určete $y'' + y = x^2 y$
 $y(0) = 1$
 $y'(0) = 0$

Úloha má na libovolném $(0, a)$ jediné řešení (podle předchozího). Můžete ověřit, že funkce $y(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ je tímto řešením.


Díky předchozímu však také vím, že toto řešení je možné napsat formou iterací (tj. lze se k němu libovolně přiblížit). Určete $y_0 \equiv 0$ a napište prvních pár iterací. Ukaže se vám, že konverguje k $e^{-\frac{x^2}{2}}$! Můžete a toho Payne můžete najít pomocí formuly. ;)

Při $y_0 = 0$ dostáváme pro y_5 :

$$y_5 = \cos(x) - \frac{54975}{1024} \sin(x) x^3 - \frac{164925}{2048} x^2 \cos(x) + \frac{164925}{2048} \sin(x) x + \frac{165437}{6144} \cos(x) x^4 - \frac{154871}{46080} \cos(x) x^6 + \frac{32383}{3072} \sin(x) x^5 + \frac{126481}{645120} \cos(x) x^8 - \frac{143131}{161280} \sin(x) x^7 + \frac{12983}{362880} \sin(x) x^9 - \frac{18889}{3628800} \cos(x) x^{10} + \frac{1}{31104} \cos(x) x^{12} - \frac{7}{12960} \sin(x) x^{11}$$

Struktura této řady je zajímavá: obsahuje členy tvaru $a_k \cos x \cdot x^k + b_k \sin x \cdot x^k$

Rozdíl mezi y_5 a $\exp(-\frac{x^2}{2})$ ukazují tento obrázek:



2.2. Základní pojmy spektrální analýzy

Budeme studovat operátorovou rovnici pro normované X
 $(T - \lambda I)x = u$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $T \in \mathcal{L}(X)$, $u \in X$ (1)
 X Banachův

Motivací k tomu je předchozí paragraf.
Označme $T_\lambda := T - \lambda I$, pak $T_\lambda \in \mathcal{L}(X) \Leftrightarrow T \in \mathcal{L}(X)$.

Označme obraz hodnot (range) operátorem T_λ :

$R(T_\lambda) := \{y \in X, \exists x \in X, T_\lambda x = y\}$ ($= T_\lambda(X)$)

Otázky řešitelnosti rovnice (1) lze přeformulovat v řeči operátorem T_λ takto:

V řeči rovnice	V řeči operátorem
\exists řešení (1) pro libovolnou pravou stranu $u \in X$?	Je T_λ <u>na</u> , tj. je $R(T_\lambda) = X$?
Pokud řešení (1) pro dané $u \in X$ existuje, je <u>unicé</u> jednoznačné?	Je T_λ <u>prost</u> na X ?
Pokud $\forall u \in R(T_\lambda) \exists ! x \in X; T_\lambda x = u$, je toto řešení <u>stabilní</u> ? <small>\downarrow viz pozn. níže</small>	Je-li T_λ <u>prost</u> , je potom T_λ^{-1} <u>spj</u> na $R(T_\lambda)$?

Def: Pod stabilním řešením míníme (jednoznačné) situaci, kdy v rovnici $T_\lambda x = u$, která má jednoznačné unicé řešení pro $\forall u \in U(u_0)$ platí, u "malé množiny $u \in U(u_0)$ " mají na následek "malé množiny řešení". To přesně odpovídá situaci, kdy je inverzní

rozhavení T^{-1} splyí na $\mathcal{U}(U_0)$. Tato vlastnost je velmi důležitá při hledání přibližného řešení: při něm často aproximujeme pravou stranu u nějakou „jí blízkou pravou stranou“ \bar{u} a dokažme, že i řešení \bar{x} , které odpovídá pravé straně \bar{u} , bude blízké řešení x , odpovídajícímu pravé straně u . Proto nestabilitou operátorů T však nemůžeme být pyšní.

Podíváme se nejprve na situaci pro $\dim X = n \in \mathbb{N}$

✓ koněčné dimenze: $T \in \mathcal{L}(X) \Leftrightarrow \exists$ matice $M \in \mathbb{M}^{n \times n}$ taková, že

$$T(x) = M \cdot x \quad \forall x \in X$$

(v X volíme jednu pevnou bázi)

Obdobně platí T je profí $\Leftrightarrow T$ je na $\Leftrightarrow M$, reprezentující T , je regulární

$$T^{-1} \text{ je profí} \Leftrightarrow T^{-1} \text{ je na} \Leftrightarrow M^{-1} \text{ je regulární a}$$

reprezentuje T^{-1} (tj. T^{-1} je lin.)

Chceme v koněčné dimenzi je každý lineární operátor profí, je i $T^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

✓ koněčné dimenzi tedy platí „všedno nebo nic“, tzn. koněčné dimenzionální Fredholmova alternativa pro $T \in \mathcal{L}(X)$; $\dim X = n$.

Platí právě 1 a následující situací:

(a) T je profí, na a má spjlou inverzi

(b) T není profí, není na a nemá spjlou inverzi

V nekonečné dimenzi není obecně žádný všedno a rozhavením na:

Příklad: Definujme prostor l_2 - posloupností:

$$l_2 := \left\{ \{x_m\}_{m=1}^{\infty}, x_m \in \mathbb{C}; \sum_{m=1}^{\infty} |x_m|^2 < \infty \right\}$$

Je ukááno, že ℓ_2 s normou $\|(x_n)\|_{\ell_2}^2 := \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2$ je Banachův prostor (je dokonce Hilbertův - více na str. 28).

Na ℓ_2 definovalme dva lín. operátory posunu ("shift operátory")

$$A_1: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

$$A_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_2, x_3, x_4, \dots)$$

Evidentně $\|A_1 x\|_{\ell_2} = \|x\|_{\ell_2} \Rightarrow \|A_1\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|A_1 x\| = 1$

$$\|A_2 x\|_{\ell_2} \leq \|x\|_{\ell_2} \Rightarrow \|A_2\| \leq 1$$

tedy oba jsou omezené, tedy spjité, $A_1, A_2 \in \mathcal{L}(\ell_2)$.

- Důkaz: • A_1 je prost (všimněm problém při adit. různě prost) ale nemá ma (něc se nachází např. na $(1, 0, 0, 0, \dots)$)
- A_2 je ma, ale nemá prost (vornumpykta).

Nicméně, co se týče stability, tak i v nekonečné dimenzi platí tato hluboká věta:

Věta 1 $A \in \mathcal{L}(X)$, X Banachův; necht A je prost a ma.
Potom $A^{-1} \in \mathcal{L}(X)$, j. A^{-1} je spjité.

Důkaz: Věta je důsledkem tzv. věty o otevřeném zobrazení, důkaz lze nalézt např. ve skriptu

[Lukáš: Účebnice z funkcionální analýzy, 4.13 - 4.16]

☒

Born: Tímto se ukáá, že problém stability řešení je vyřešen: stačí metoda k ma. Avšak, pro lineární omezené (j. spjité) operátory tomu tak je. Ale např. pro lineární nespjité nebo pro nelineární operátory není situace tak jednoduchá.

Množímé skalární operátorem:

Bud' $T \in \mathcal{L}(X)$, X Banachův, $\lambda \in \mathbb{C}$, $T_\lambda := T - \lambda I \in \mathcal{L}(X)$. Pak v následující na $\lambda \in \mathbb{C}$ můžeme operátor T_λ mít různé vlastnosti a sledovat jeho postavy, zejména inverze a velikost $Q(T_\lambda)$. Následující tabulka shrnuje různé možnosti, přičemž dvě z nich nemohou nastat: λ_1 , která je vyřazena větou 1 (označeno "V1") a předchozí stav, a λ_2 , která je vyřazena lemmem 1, které reformuluje a doplňuje za chvilku (označeno "L1")

Tabulka je nutno chápat tak, že pro každý $\lambda \in \mathbb{C}$ můžeme definovat různé kategorie, do které můžeme přidat parametr $\lambda \in \mathbb{C}$. Tedy například když máme rok tabulky je nutno číst takto: " $\lambda \in \mathbb{C}$ je regulárním bodem T , pokud T_λ je invertibilní, T_λ^{-1} existuje a $Q(T_\lambda) = X$ ". Atd.

		T_λ "na"	T_λ nemá "na"	
		$Q(T_\lambda) = X$	$Q(T_\lambda) \neq X$ $\overline{Q(T_\lambda)} = X$	$\overline{Q(T_\lambda)} \neq X$
T_λ prostý	$\exists T_\lambda^{-1}$ a je invertibilní	λ je regulární bod T	 [L1]	$\lambda \in \mathcal{Z}_R(T)$
	$\exists T_\lambda^{-1}$ a nemá invertibilní	 [V1]	$\lambda \in \mathcal{Z}_C(T)$	
T_λ nemá prostý	max. T_λ^{-1}	$\lambda \in \mathcal{Z}_P(T)$		

Komentář:

- $\mathcal{Z}_c(T)$... tzv. kontinuuální spektrum operátoru T . Pokud $\lambda \in \mathcal{Z}_c(T)$, tak rovnice $T_\lambda y = u$ nemá řešení pro každou pravou stranu $u \in X$ (protože $\mathcal{R}(T_\lambda) \neq X$), ale platí, že ke každé pravé straně $u \in X$ a každému $\varepsilon > 0$ existuje $u_\varepsilon \in X$, $\|u_\varepsilon - u\|_X < \varepsilon$ a přitom existuje řešení rovnice $T_\lambda y = u_\varepsilon$ (to je důsledek toho, že $\overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} = X$). ... Někteří se jim říká "skorořešení".
Jároveň však T_λ je nestabilní (T_λ^{-1} je neexistující), takže menší dávkou dobrý výsledek se blíží k tomu, co se děje s řešeními, když trochu měníme pravou stranu u_ε .

- $\mathcal{Z}_r(T)$... tzv. residuální spektrum T . Protože $\mathcal{R}(T_\lambda) \neq X$, nejsou k dispozici řešení pro velkou část $u \in X$.

- $\mathcal{Z}_p(T)$... tzv. bodové spektrum T . T_λ nemá inverzi, tj.

$$\begin{aligned} & \exists x_1 \neq x_2, \quad T_\lambda x_1 = T_\lambda x_2 && x := x_1 - x_2 \neq 0 \\ \wedge & \exists x \neq 0 && T_\lambda x = 0 \\ & && (T - \lambda I)x = 0 \\ & && Tx = \lambda x. \end{aligned}$$

tedy $\lambda \in \mathcal{Z}_p(T) \Leftrightarrow \exists x \neq 0 \quad Tx = \lambda x \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} \lambda$ je vlastní číslo T
a $x \neq 0$ je odpovídající
vl. vektor.

Def. Spektrum operátoru $T \in \mathcal{L}(X)$ je $\mathcal{Z}(T) := \mathcal{Z}_c(T) \cup \mathcal{Z}_r(T) \cup \mathcal{Z}_p(T)$.

- Charakteristika:
- 1) $\lambda \in \mathcal{Z}(T) \Leftrightarrow T_\lambda$ nemá inverzi nebo nemá na.
 - 2) λ regulární $\Leftrightarrow T_\lambda$ invertovatelná (a pak má T_λ^{-1} spojité)
 - 3) Ne každé funkční spektrum T je reálným číslem.

Def: Spektrální polynom $p(T) := \sup \{ |\lambda|; \lambda \in \sigma(T) \}$

Poznámka: • Pokud je $\rho(T) < +\infty$, pak platí: $|\lambda| > \rho(T) \Rightarrow \lambda$ regulární

Je třeba ještě zmínit ano Lemma 1, plněné na str. 24:

Lemma 1 X Banachov, $A \in \mathcal{L}(X)$. Platí:
 $\left. \begin{array}{l} Q(A) \neq X, \overline{Q(A)} = X, \exists A^{-1}: Q(A) \rightarrow X \\ \text{(i) } A \text{ prostý} \end{array} \right\} \Rightarrow A^{-1} \text{ není } \mathcal{L}(X)$

① Necht A^{-1} je $\mathcal{L}(X)$ na $Q(A)$.

- $Q(A) \neq X \Rightarrow \exists y \in X \setminus Q(A)$
- $\overline{Q(A)} = X \Rightarrow \exists y_n \in Q(A); y_n \rightarrow y \notin X$.
- $y_n \in Q(A) \Rightarrow \exists x_n \in X, Ax_n = y_n \Rightarrow x_n = A^{-1}(y_n)$.
- $\left. \begin{array}{l} y_n \text{ konverguje} \\ \text{v } X \end{array} \right\} \Rightarrow y_n \text{ Cauchyovská} \Rightarrow x_n \text{ Cauchyovská} \Rightarrow \exists x \in X, \lim x_n = x$
(A^{-1} $\mathcal{L}(X)$)
- Potom ale $Ax = A(\lim x_n) = \lim Ax_n = \lim y_n = y$
 \downarrow A $\mathcal{L}(X)$ y_n

Protoe $\exists x \in X, Ax = y$, $y \notin Q(A)$
 což je proti \Rightarrow X

Poznámka: Jak vypadá důkaz na str. 24 v konečně dimenzi?

Víme (viz str. 22):

$T \in \mathcal{L}(X)$; $\dim X = m \in \mathbb{N}$ je reprezentován maticí $M \in \mathbb{M}^{m \times m}$.

Potom platí: T je prostý $\Leftrightarrow T$ je na $\Leftrightarrow M$ je regulární a reprezentuje T

T^{-1} je prostý $\Leftrightarrow T^{-1}$ je na $\Leftrightarrow M^{-1}$ je regulární a reprezentuje T^{-1}

Je třeba popsat situaci je navíc vždy: $T^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

Ve schématicky načycené tabulce ze str. 24:

	T_λ ma	T_λ nemá	
T_λ prostý	\bullet	 	
	X		
			\bullet

X nemá obecně mohl

||||| nemá mohl díky tomu, že pro dim $X = n$ je T_λ prostý $\Leftrightarrow T_\lambda$ ma

→ Tento celý sloupec popisuje situaci $\mathcal{R}(T_\lambda) \neq X, \overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} = X$. Ta však v konečné dimenzi také nemá sense, protože v kon. dim. platí $\mathcal{R}(T_\lambda) = \overline{\mathcal{R}(T_\lambda)}$.

V konečné dimenzi tedy nastanou pouze situace, označené \bullet

a tedy v konečné dimenzi máme:

- $\lambda \in \mathbb{C} \Rightarrow \lambda$ je buď regulární nebo má je to se. číslo
- $\rho(T) = \{ \lambda \in \mathbb{C}, \lambda \text{ je vlastní číslo } T \} = \{ \lambda \in \mathbb{C}; \lambda \text{ je se. č. } T \}$.

Následující věta ukazuje, že $\rho(T)$ je pro $T \in \mathcal{L}(X)$ vždy konečný.

Věta X Banachův, $T \in \mathcal{L}(X)$ ($\|T\| < \infty$). Potom:

$|\lambda| > \|T\| \Rightarrow$ (1) $\lambda \notin \rho(T)$, tj. λ je regulární

(2)

$$(T - \lambda I)^{-1} = T_\lambda^{-1} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{\lambda^{k+1}} \in \mathcal{L}(X)$$

Důkaz: • Z (1) ihned plyne

$$\rho(T) \subseteq \|T\|$$

• Žáda se (2) se navrhuje von Neumannova řada operátoru $T - \lambda I$.

(2) λ - si $|\lambda| > \|T\|$, pak jisté $\lambda \neq 0$. Položme $A := \frac{1}{\lambda} T$.

Podm $\|A\| = \frac{1}{|\lambda|} \|T\| < 1$ a ma A máme navíc ještě ze sh. 14:

To nám dá, že: ① $I - A$ je pro λ a ma $\Rightarrow T - \lambda I = (-\lambda)(I - A)$
je pro λ a ma
neta ze sh. 23
 $(T - \lambda I)^{-1}$ je $\frac{1}{-\lambda} (I - A)^{-1}$.

Odtud λ je regulární čísl.

② Veta ze sh. 14 dá i

$$(I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$$

$$(I - \frac{1}{\lambda} T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{\lambda^k} \quad | \cdot (-1)$$

$$(\frac{1}{\lambda} T - I)^{-1} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{\lambda^k} \quad | \cdot \frac{1}{\lambda} \quad (*)$$

$$\underbrace{(1^{-1}) \cdot (\frac{1}{\lambda} T - I)^{-1}}_{(T - \lambda I)^{-1}} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{\lambda^{k+1}} \quad \text{číslo.}$$

□

Pozn. V posledním kroku děláme pozor! Zaměření pohledu k $y = 3x$ je $y = \frac{1}{3}x$, tedy inverzní pohled má hodnotu koeficientu převrácenou. Vložíme $(*)$ kde tedy (alternativně) postupovat:

$$(\frac{1}{\lambda} T - I)^{-1} = \lambda (T - \lambda I)^{-1}, \text{ a pak je jasné pro násin rovnici (*) dělit } \lambda.$$

Ma také z kapitoly uvidíme jeden příklad.

② Uvažujme $l_2 := \{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x_n \in \mathbb{C}, \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^2 < \infty \}$ prostor všech komplexně hodnotných, které jsou kv. „sčítatelné a kvadrátům“. Platí (že ukázat), že l_2 se skalárním součinem $((x_n), (y_n))_{l_2} = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n \bar{y}_n$ (tedy

indukuje normu $\|(x_n)\|_{l_2} = \sqrt{\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^2}$) je úplný, a tedy Hilbertův

(ℓ_2 i Banachov) prostora.

Uvažujeme operátor

$$T: \ell_2 \rightarrow \ell_2$$

$$T: (x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, \dots).$$

Protože $\|Tx\|_{\ell_2} = \|x\|_{\ell_2}$, je $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|x\| = 1$.

Tedy $\rho(T) \leq \|T\| = 1$ a proto $|\lambda| > 1 \Rightarrow \lambda$ je regulární.
Celý spektrum T leží v jednotkovém kruhu v \mathbb{C} .

- $\lambda = 0$: Užitím věty (sh. 23), že T nemá na, je prostý. Zároveň je vidět, že řádový prvek z ℓ_2 se pomocí T neobrazí na $(a, 0, 0, 0, \dots)$, $a \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$. Může tedy řádovou posloupnost z $\mathcal{R}(T)$ dokonvergovat (např.) k prvku $(1, 0, 0, \dots)$. Proto $\overline{\mathcal{R}(T)} \neq \ell_2$, odkud plyne $0 \in \mathcal{B}_{\ell_2}(T)$ (plyne z lemma na sh. 24).

• $|\lambda| \leq 1, \lambda \neq 0$

- a) Ukážeme nejprve, že žádné z těchto λ není vlastním číslem T .
Pokud by tomu tak bylo, tak $\exists x \neq 0$

$$Tx = \lambda x$$

$$(0, x_1, x_2, \dots) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots)$$

$$\text{tj. (i) } \lambda x_1 = 0$$

$$\text{(ii) } \lambda x_k = x_{k-1} \quad \forall k = 2, 3, 4, \dots$$

Z (i) plyne $x_1 = 0$ (neboť $\lambda \neq 0$),

a (ii) pak indukční plyne $x_2 = x_3 = \dots = 0$

Tedy $x = 0$, což je však spor s tím, že by to měl být vlastní vektor T . \square

- b) Ukážeme že T_λ nemá na, speciálně, že žádné $x \in \ell_2$ se neobrazí na $(1, 0, 0, \dots)$. Necht' lokálně $x \in \ell_2$ existuje. Pak tedy

$$T_\lambda x = (1, 0, 0, \dots)$$

||

$$(-\lambda x_1, x_1 - \lambda x_2, x_2 - \lambda x_3, \dots)$$

tedy $1 = -\lambda x_1 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{\lambda}$

$$k=1,2,3 \dots \quad x_k - \lambda x_{k+1} = 0 \Rightarrow x_{k+1} = \frac{x_k}{\lambda}$$

$$\Rightarrow x = \left(-\frac{1}{\lambda}, -\frac{1}{\lambda^2}, -\frac{1}{\lambda^3}, \dots\right)$$

Itáknive jsme tedy našli x mášli, ale

$$\|x\|_{\ell_2}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{2k}} = \infty, \text{ nebo jde o geom. řadu}$$

A koeficientem $\frac{1}{\lambda^2}$,

pro který

$$|\lambda| \leq 1 \Rightarrow \left|\frac{1}{\lambda^2}\right| \geq 1.$$

Protože T_λ je lineární a $(1, 0, 0, \dots) \notin \mathcal{R}(T_\lambda)$, tak platí také $(a, 0, 0, \dots) \notin \mathcal{R}(T_\lambda) \quad \forall a \in \mathbb{C}, a \neq 0 \Rightarrow \overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} \neq \ell_2$.

Připomejme si tedy u posledním sloupci kalkulky ze str. 24, $\forall \lambda \neq 0, |\lambda| \leq 1$.

Protože všel současně nádné lokavé λ nemá vl. číslem, je $\lambda \in \mathcal{B}_p(T)$

pro všechna lokavá λ . (To by šlo také nenárodně ukázat tak, že bychom ukázali protože T_λ - kuste si.)

Závěr : Pro toto T platí $\mathcal{B}(T) = \mathcal{B}_p(T) = \{\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| \leq 1\}$.

Spektrum je tedy právě celý jednotkový kruh, je tedy nepočítelně mnoho prvků spektra (a přitom nádný p má vl. číslem).

Takový operátor je tedy „poměrně nebezpečný“, ale přitom regeneru- je nádné vl. vektory.

Přive jsme provedli spektrální analýzu uvedeného operátoru.

Cvičení: Druhá spektrální analýza:

a) $T: \ell_2 \rightarrow \ell_2$

$$(x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_2, \frac{x_3}{2}, \frac{x_4}{3}, \frac{x_5}{4}, \dots)$$

Řešení: $T \in \mathcal{L}(\ell_2)$

$$\mathcal{N}(T) = \mathcal{N}_p(T) = \{0\}, \quad \mathcal{R}(T) = \emptyset, \quad \mathcal{D}_c(T) = \emptyset.$$

Doplňující otázka: jolá je $\|T\|$?

b) $T: \ell_2 \rightarrow \ell_2$

$$(x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (0, x_1, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \frac{x_4}{4}, \dots)$$

Řešení: $T \in \mathcal{L}(\ell_2)$

$$\mathcal{N}(T) = \{0\}, \quad \mathcal{N}_p = \emptyset$$

Doplňující otázka: jolá je $\|T\|$ a je $0 \in \mathcal{D}_c(T)$ nebo $0 \in \mathcal{R}$?

≡